

STEVEN SPIELBERG DIGITAL YIDDISH LIBRARY

NO. 05180

DI NATUR ARUM UNZ UN MIR
ALEYN

Helene Khatskels

•



NATIONAL YIDDISH BOOK CENTER
AMHERST, MASSACHUSETTS

NATIONAL YIDDISH BOOK CENTER
AMHERST, MASSACHUSETTS
413 256-4900 | YIDDISH@BIKHER.ORG
WWW.YIDDISHBOOKCENTER.ORG



MAJOR FUNDING FOR THE
STEVEN SPIELBERG DIGITAL YIDDISH LIBRARY
WAS PROVIDED BY:

Lloyd E. Cotsen Trust
Arie & Ida Crown Memorial
The Seymour Grubman Family
David and Barbara B. Hirschhorn Foundation
Max Palevsky
Robert Price
Righteous Persons Foundation
Leif D. Rosenblatt
Sarah and Ben Torchinsky
Harry and Jeanette Weinberg Foundation
AND MEMBERS AND FRIENDS OF THE
National Yiddish Book Center



The *goldene pave*, or golden peacock, is a traditional symbol of Yiddish creativity. The inspiration for our colophon comes from a design by the noted artist Yechiel Hadani of Jerusalem, Israel.

The National Yiddish Book Center respects the copyright and intellectual property rights in our books. To the best of our knowledge, this title is either in the public domain or it is an orphan work for which no current copyright holder can be identified.

If you hold an active copyright to this work – or if you know who does – please contact us by phone at 413-256-4900 x153, or by email at digitallibrary@bikher.org

די נאטור ארום אונז און מיר אליין

א לערנבוך פאר פאָלקשולן

פֿון

העלענע כאצקעלם

א. ב. שטינמאן



פֿאַרלאַג „וואַסטאָק“, ג. מ. ב. ה., בערלין 2 C.

אן דער שפאנדויער בריקע 2

1922

Copyright 1922 by
Wostok (Der Osten) Verlag und Buchervertrieb G. m. b. H. Berlin C. 2
An der Spandauer Brücke 2

אינהאלט

זייט	
29	דער מאינגלעקל
30	די פאָעמקע
31	די מאליע
32	ברוקעס און שווארצע יאנדעס

אין נאָדלוואַלד.

33	די סאָסנע
37	ווער שעדיגט די סאָסנע?
37	דער וואַלד און זיין ראָלע אין דער נאטור.
41	דער וואַלד און דער מענש

וועגן אייניגע איינוואוינער פֿונם וואַלד.

43	די קוקאווע
44	די יאשמשערקע
46	די רינגלשלאנג
48	די צלמשלאנג
49	קריכיגע בעלי-חיים אָדער שרצים
50	די וואלדמוראשקע
53	די הויזשפין

אויפֿן פֿעלד.

55	קאַרן
60	ווייץ
60	גערשמן
60	האַבער
63	פֿלאַקס
64	שוועמלעך-פֿאראויטן אויף תבואה
65	שעדליכע קרייטער אויפֿן פֿעלד
67	די איינוואוינער פֿונם פֿעלד
69	דער רעגנוואָרעם

די דערוואכונג פֿון דער נאטור אין פֿרייהלינג.

1	דער באָדן און די געוויקסן
3	פֿארוואָס איז דער באָדן טונקל?
3	פֿארוואָס מיסטיגט מען די ערד?
3	פֿון וואָס באשטייען די געוויקסן?
6	פרובן פֿון געלערנטע
7	די בלעטערבוימער אין פֿרייהלינג
7	וויאזוי נייע דער זאפֿטשטראָם פֿון די
9	וואַרצלען צו די בלעטער?

אין בלעטערוואַלד.

9	דער נוסבוים
11	די אַלכע
12	די בעריאָוע
13	די הושענא אָדער די ווערבע
15	דער פאפֿלבוים
16	דער דעמב, אָדער דער אייכלבוים
18	ווער שעדיגט דעם דעמב
18	דער באטייט פֿון די בלעטער פֿאַר די גע- וויקסן
20	וועגן דער גרינער פֿאַרב פֿון די בלעטער
22	וואָס ארבעט זיך אויס פֿון דעם קוילנשטאַף אין די בלעטער?
22	די געוויקסן עטעמען
23	די בלעטער דעמפֿן אויס וואסער
24	ווי שפייזן זיך די חיות און ווי די געוויקסן?
25	וועגן לעבן פֿון די בלעטערבוימער אינם וואַלד
26	וועגן דעם צוזאמענלעבן פֿון די געוויקסן
28	אינם וואַלד

זייט
 118 . . . די וואָרצל אונטערן מיקראַסקאָפּ
 120 . . . דער שטאַם אונטערן מיקראַסקאָפּ
 אן אלגעמיינער איבערבליק איבער דער
 122 . . . נאטור ארום אונז . . .

דער מענטש.

124 . . . דער מענשליכער נוף און זיינע אָרגאַנען .

דער סקעלעט.

124 . . . די טיילן פֿון סקעלעט . . .
 ווי זיינען די ביינער געבויט און פֿון וואָס
 124 . . . באשטייען זיי?
 ווי זיינען די ביינער פֿונם סקעלעט פֿאַר-
 126 . . . אייגנט
 127 . . . דער שאַרבען . . .
 128 . . . דער רוקנזויל . . .
 129 . . . דער ברוסטקאסטן . . .
 129 . . . די ביינער פֿון די הענט . . .
 130 . . . די ביינער פֿון די פֿיס . . .

די מוסקולן.

130 . . . פֿון וואָס באשטייען די מוסקולן?
 131 . . . וויאזוי די מוסקולן באוועגן די ביינער .
 132 . . . ווי גייט די אַרבעט אינם מענשליכן נוף?

**די פֿאַרדייאונג און די אָרגאַנען
פֿון פֿאַרדייאונג.**

133 . . . די וויכטיגסטע שפּיזשמאָפֿן . . .
 135 . . . די ציינער . . .
 136 . . . די שפּייגלן . . .
 136 . . . די שלינגהייל און די עסראַר . . .
 137 . . . דער מאָגן . . .
 137 . . . די געדערם און די בויכנילן . . .
 138 . . . דער גייץ . . .

וועגן עמעמען און אַטעמאַרגאַנען.

וועגן קוילנזיערס אין דער אַרױסגע-
 139 . . . עטעמטער לופֿט . . .
 141 . . . דער נאַז און די לופֿטראַר . . .
 141 . . . די לונגען . . .

זייט
אויף דער לאַנקע.

70 . . . ווילדע תבואה . . .
 72 . . . די איבעריגע געוויקסן אויף דער לאַנקע .
 74 . . . וויקע . . .
 74 . . . קלעווער . . .
 וועגן צוזאַמענלעבן פֿון די געוויקסן אויף
 75 . . . דער לאַנקע . . .
 76 . . . משה־רבנוס קיעלע . . .
 77 . . . דער קראַט (די קורמע) . . .

לעבן וואסער און אין וואסער.

79 . . . פֿאַרנעכטליש . . .
 81 . . . אַיַר . . .
 81 . . . די וואסעררויז אָדער די וואסערליליע .
 83 . . . וואסערלינג . . .
 84 . . . די וואסערפעסט אָדער די עלאָדעע . . .
 84 . . . די וואסערגעוויקסן און די חיות . . .
 85 . . . דער מוק (דער קאָמאַר) . . .
 87 . . . די ליבעלע . . .
 88 . . . דער געלראנד . . .
 90 . . . דער ראַק . . .
 92 . . . דער וואסערשנעק . . .
 94 . . . דער שטראַממושל . . .
 95 . . . וועגן אקוואַריום . . .

ניטבלומיגע אָדער ספֿאַרנפֿלאַנצן.

96 . . . פּאַפּערעט . . .
 100 . . . מאַך . . .
 103 . . . שוועמלעך . . .
 105 . . . וואסערוואוסקס . . .
 106 . . . וועגן דעם מיקראַסקאָפּ
 מיקראַסקאָפּישע חיהלעך אָדער אינ-
 108 . . . פּוואַריעס . . .
 110 . . . באקטעריעס . . .

**די וויכטיגסטע טיילן פֿון א געוויקס
אונטערן מיקראַסקאָפּ.**

113 . . . די צעלע . . .
 115 . . . לעבעדיגע געוועבן . . .
 116 . . . די פֿלאַנצנצעלע . . .
 117 . . . דער בלאט אונטערן מיקראַסקאָפּ . . .

— VII —

זייט	זייט
151 ווי פֿארהיט מען די הויט?	ווי די בלוט ווערט גערייניגט אין די
	לונגען 142
די גערוונסיסמעס און די אָרגאנען	די אָטעמבאוועגונגען 142
פֿון די אויסערליכע הושים.	ווי פֿארהיט מען די לונגען? 142
152 דער מאַרד און די געווינ	די צירקולאציע פֿון דער בלוט און די
152 דער קאָפּמאַרד	אָרגאנען פֿון דער צירקולאציע.
154 דער רוקנמאַרד	די בלוט 143
154 די אויסערליכע געפֿילן אָרער חושים	די האַרץ און די אָרערן 145
154 די אויגן	די צירקולאציע פֿון דער בלוט 146
156 די אויערן	די אַרויסמיילונג און די אָרגאנען
158 די אַפּאַרטן פֿון די איבעריגע געפֿילן	פֿון אַרויסמיילונג.
*	
דאָקטער דזשענער און דער שכל פֿון	די גירן 149
158 שטעלן פֿאַקן	די הויט 149

די דערוואכונג פון דער נאטור אין פריהלינג.

שמיל און רוהיג ווערט די נאטור אין הארבסט. נאך שמילער ווערט זי ווינטער. אָבער די פֿלאַנצן און די חיות שטארבן ניט אויס. פאמעליך און שמיל גייט זייער לעבן ווייטער, אזוי שמיל, אז מען קען עס קוים מיטן אויג באנעמען.

א טייל חיות פֿאלט אריין אין א טיפֿן שלאָף און כאפט זיך אויף נאר אין די ערשמע ווארעמע פֿריהלינגטעג; אין דער וועלט פון די חיות, זיינען שלעפֿער אָן אויסנאם, אָבער פֿאר די געוויקסן איז דער ווינטער א צייט פֿון רוה און שלאָף.

אין פֿריהלינג ווערן די פֿלאַנצן ניט פונסניי געבוירן, זיי הערן נאר אויף צו רוהען, און עס הייבט זיך אָן פֿאַר זיי אַ רייכער און אַ ניכער לעבן. דערפֿאר איז דער פֿריהלינג אויך די בעסטע צייט זיך צו באקענען מיטן לעבן פֿון די געוויקסן.

דער באָדן און די געוויקסן.

גרוי, ברוינגרוי אָדער שוואַרץ איז די ערד, וואָס האָט זיך נאָרוואָס באפֿרייט פון אייז און שניי. איר האָט געוויס באמערקט, אז טונקל איז די ערד נאר פֿונאויבן. מע קען זיך אין דעם איבערצייגן בעת מען גראַבט א גרוב, א רינגע, ווען א היפשע קופע טונקעלע ערד איז שוין אויסגעגראבן, באווייזט זיך אַ געלער, אמאָל גאָר אַ ווייסער זאמד. ס'איז ניט גלייך אן אָרט, אמאָל דארף מען גראַבן טיף, אמאָל איז גענוג דורכצוגראַבן די ערד אויף א פֿערטל ארשין, און מען געפֿינט שוין העלע ערד. אין אנדערע ערטער ליגט די העלע ערד נאר פונאויבן.

די אויבערשמע שיכט פֿון דער ערד (אָפטמאָל איז דאָס טונקעלע ערד) הייסט דער באָדן, אונטערן באָדן ליגט דער אונטער גרונט; ער באשטייט פֿון זאמד, ליים, אָדער קאלך, און גאָר טיף — פֿון שטיינער.

אויפֿמערקזאמע באַאָבאכטונגען באווייזן, אז די געוויקסן שפרייטן אויס זייערע וואַרצלען אין באָדן און לאָזן זיי זעלמן אראָפֿ טיף אין אונטערגרונט. דער באָדן האָט דעם גרעסטן ווערט פֿארן לעבן פֿון די געוויקסן. אינם

באָדן פארזייט מען די זאָט, אין אים וואָרצלען זיי זיך, פֿון אים ציהען זיי יניקה.

די באָדנערד איז שטייג, מעליג, מען טאפט אָבער אין איר אָן אויך קליינע הארטע גרייפעלעך-שטיינדעלעך, אזוי ווי אין זאמד. די באָדנערד איז א געמיש פֿון זאמד, ליים, קאלך און פוילעכץ, וואָס נעמט זיך פֿון צעפֿוילטע געוויקסן (וואָרצלען, בלעטער) און חיות. אין דער וויסנשאפט הייסט די פוילעכץ הומוס. אָט זי ניט דאָס דער ערד די מונקעלע פֿארב. דער באָדן קען זיין פֿרוכפֿערדיג און ניט פֿרוכפֿערדיג. עס ווענדט זיך פֿון וואָס ער באשטייט.

א פֿרוכפֿערדיגער באָדן מוז זיין ווייך (פוכקע), די וואָרצלען זאָלן זיך קענען פֿריי צעשפרייטן; ער מוז זיין לופטיג, ווייל אָהן לופט קען ניט אויפֿגיין קיין זאָט און ניט וואקסן קיין געוויקסן; א פֿרוכפֿערדיגער באָדן מוז האבן אינמאָס פֿייכטקייט, אין טרוקענער ערד פֿארדארן די געוויקסן. צופֿיל נאסקייט ווידער שאדט זיי אויך. ער מוז זיין ווארעם און רייך מיט יניקה, וואָס די געוויקסן נויטיגן זיך אין איר און ציהען זי ארויס פֿון דער ערד מיט זייערע וואָרצלען.

א זאמד־יגער באָדן איז פוכקע און לופטיג, אָבער ער ווערט לייכט צעווייט פֿון ווינט, דערפֿאר קענען זיך די וואָרצלען אין אים ניט פֿארפֿעסטיגן; ער לאָזט דורך וואסער און דערפֿאר ווערט ער גיך טרוקן. צוליבדעם קענען וואקסן אויף א זאמדיגן באָדן נאר אזעלכע געוויקסן, וואס האָבן זעהר טיפֿע וואָרצלען, און אזוינע, וואס קענען זיך באגענוגענען מיט ווייניג פֿייכטקייט.

א ליימיגער באָדן ווערט ניט צעווייט פונם ווינט, אָבער דערפֿאר איז ער ניט לופטיג; ער לאָזט ניט דורך קיין וואסער, ער זאפט זיך אָן מיט פֿייכטקייט, און דאָס איבעריגע וואסער בלייבט שטיין פֿונאויבן. אין א רעגנצייט האָבן די געוויקסן אין אזא באָדן צופֿיל וואסער, און אין א טריקעניש ווערט ער אויסגעטריקנט און איז הארט, ווי א שטיין.

פֿרוכפֿערדיג איז אזא באָדן, וואָס באשטייט פון זאמד און ליים און האָט נאך דערצו אפולע הומוס; אזא באָדן רופט מען הומוס, ווען ער האָט ביו 20% פֿוילעכץ. אזא באָדן איז ווייך און לופטיג, אָבער ער ווערט ניט צעווייט פון ווינט; ער לאָזט דורך וואסער, אָבער זאפט עס אויך אריין אין זיך און דאמפֿט עס ניט אויס אזוי גיך, דערפֿאר איז ער אינמאָס פֿייכט. א הומוס־באָדן איז אויך ווארעם, ווייל מונקעלע ערד ווארעמט זיך גיכער אָן פֿון דער זון, ווי העלע.

ווי איז דער באָדן אין דער ענגט, אין וועלכער איר וואוינט? צו האָט איר באמערקט, וועלכע געוויקסן עס וואקסן אויף א זאמדיגן באָדן?

פֿאַרוואָס איז דער באַדן טונקל?

איצט, ווען מיר ווייסן שוין, אז די טונקעלע פֿאַרב געמט זיך פֿון הומוס, איז גרינג צו פֿאַרשטיין, פֿאַרוואָס דער אונטערגרונט איז העל. ער האָט אין זיך ניט קיין פּוילעכץ, ווייל אין די טיפֿערע שיכטן פֿון דער ערד קומען ניט צו אויפֿיל געוויקסן און חיות.

די געלע בלעמער, וועלכע וואלגערן זיך אונטער די פֿיס אין די טעג פֿון הארבסט, געפֿינען צום סוף זייער רוה אויף דער ערד און אין דער ערד. צעווייקטע פֿון רעגן און שניי, ווערן זיי צעפּוילט און צעמישן זיך מיט דער ערד, שאַפֿנדיג אויבארום דעם הומוס, און מאַכן פֿרוכפּערדיג די ערד. אין דער נאטור גייט קיין זאך ניט אינוועזן: זומער האָבן די וואַרצלען געצויגן יניקה. פֿון דער ערד און האָבן איר מאַגערער געמאכט. אראפֿפֿאלנדיג פֿון בוים, קערן די בלעמער טיילווייז אום דער מוטער־ערד די יניקה, וואָס דער בוים האָט פֿון איר געצויגן.

פֿאַרוואָס מיסטיגט מען די ערד?

אין וואלד אָדער אויף ווילדע לאַנקעס ווערט די ערד ניט מאַגער, ווייל דורך די צעפּוילטע בלעמער, וואַרצלען און אנדערע זאַכן באקומט זי צוריק דאָס, וואָס זי האט פֿריהער אפּגעגעבן.

אנדערס איז אויפֿן פֿעלד און אין גאַרטן: אלץ, וואס וואקסט אויס, געמט דער מענש אראָפֿ. פֿאַרן זייען און פֿלאנצן אין הארבסט און אין פֿריהלינג צעגראָבט ער און צעאקערט טיף די ערד, מיטן גראבלע און מיט דער בראַנעווע געמט ער ארויס די פֿאַראַיאַריגע וואַרצלען אזוי, אז זיי באווייזן ניט צעפּוילט צו ווערן אין דער ערד. אויבארום ווערט די ערד מיט יעדער גערעמעניש אלץ אַרעמער און ארעמער מיט יניקה פֿאַר נייע געוויקסן. צוליבדעם זוכט דער מענש מיטלען, כדי דעם באַדן פונדאָסניי פֿעט און רייך צו מאַכן. דאָס בעסטע מיטל דערצו איז מיסט פֿון בהמות, ווייל זי קומט דאָך פֿון די געוויקסן, וואָס די בהמות עסן און פֿאַרדייען. די מיסט צעמישט זיך מיט דער ערד און ווערט גיך צעפּוילט.

צו האָט איר באמערקט, ווען מען מיסטיגט די פעלדער? צו האָט איר באמערקט, אז מיסט ווארעמט? פֿאַרוואָס?

פֿון וואָס באשטייען די געוויקסן?

די פראקטיק פֿון לאַנגע יארן באווייזט דעם ערדארבעטער, אז מיסט איז א גוטער מיטל כדי פֿרוכפּערדיג צו מאַכן דעם באַדן. געלערנטע האָבן

דאָס געוואָלט טיפער פֿארשטיין. זיי האָבן זיך דערוואוסט, פֿון וועלכע שטאָפֿן די געוויקסן זיינען אויפגעבויעט און האָבן אויסגעפֿאָרשט, וועלכע שטאָפֿן די געוויקסן נעמען פֿון דער ערד.

זיך דערוויסן, פֿון וואָס א געוויקס באשטייט, איז ניט קיין גרינגע ארבעט, דערצו פֿאָדערט זיך פֿיל געדולד און פינקטליכקייט. אלע פרובן האָבן באוויזן, אז אלע געוויקסן האָבן אין זיך אפולע וואסער. דאָס זעהט מען גלייך אָהן עקספערימענטן; ווען מיר רירן אָן פֿרישע פלאנצן, פֿילן מיר כמעט אלעמאָל, אז זיי זיינען פֿייכט. אלע פֿלאנצן גויטיגן זיך אין וואסער, אפילו אפגעשניטענע געוויקסן קענען נאך אויך לעבן, ווען מען שטעלט זיי אריין אין וואסער.

פֿרישע פֿלאנצן ווענט מען אָפּ, דערנאָך טריקנט מען זיי אויס און מען ווענט זיי ווידער אָפּ; דער אונטערשייד אין געוויכט באווייזט, אז ביי דער גרעסטער צאָל פֿלאנצן פֿארנעמט דאָס וואסער א העל פֿט און אָפּטמאָל נאָך א גרעסערן טייל פֿון זייער געוויכט; ביי זאפטיגע פֿרוכט פֿארנעמט דאָס וואסער דריי פֿערטל פֿון זייער געוויכט, נאך גרעסער איז די געוויכט פֿון וואסער אין די וואסערגעוויקסן.

וואָס בלייבט אָבער אין געוויקס נאָכן אויסטריקענען? ס'איז ניט שווער צו איבערצייגן זיך, אז דאָס איז קויל. ניטווילנדיג מאכט מען אין יעדער הויז טעגליך א פרוב, וועלכער באווייזט דאס דייטליך: ווען מען הייצט דעם אויוון אָדער די פֿליטע, לייגט מען אריין האָלץ, פֿון די האָלץ ווערט קוילן. קויל איז אן איינפֿאכער גרונט שטאָף, ווי, למשל, גאלד, זילבער, אייוון. אזעלכע איינפֿאכע שטאָפֿן, וועלכע זיינען ניט צוזאמענגעשטעלט פֿון אנדערע שטאָפֿן, און וועלכע מען קען אויף קיין זאך ניט צעלייגן, רופן זיך עלעמענטן. ריינע קויל איז אן אַלעמענט און הייסט אין דער וויסנשאפט קוילנשטאָף. האָלצקוילן און בכלל פֿלאנצנקוילן זיינען כמעט ריינע קוילנשטאָף, אָבער זיי האבן אין זיך נאָך עפעס. אזויארום האבן מיר צוויי וויכטיגע שטאָפֿן, פֿון וועלכע די פֿלאנצן באשטייען — וואסער און קוילנשטאָף. פֿריהער האבן מיר ארויסגעטריבן דאָס וואסער און געפונען קוילנשטאָף, איצט דארף מען באווייזן דעם קוילנשטאָף, וועט מען קענען זעהן, וואָס עס בלייבט נאך איבער, און ווי גרויס איז דער טייל, וואָס יעדער פֿון די שטאָפֿן פֿארנעמט. דעם קוילנשטאָף קען מען באווייזן דורכן פֿארברענען, מען דארף נאָר אז עס זאָל צוקומען גענוג לופט צום פֿייער. ווען דער קויל ווערט פֿארברענט, בלייבט אש. מיט גרויס מיה און געדולד האָט זיך די געלערנטע איינגעגעבן אויסצופֿאָרשן די אש און ארויסצוגעפֿינען, אז די אש באשטייט פֿון שוועבל, פֿאָספֿאָר, אייוון, קאליום, קאלציום, מאגנעזיום און אמאָל נאָך פֿון אנדערע שטאָפֿן. די געוויכט פֿון

די אש אין פֿאַרגלייך מיט דער געוויכט פֿון דעם קויל באווייזט, אז אָס די שטאָפֿן פֿאַרנעמען אַ קליינעם אָרט אין גאַנצן געוויקס.

פֿון די אלע זעקס עלעמענטן, וועלכע מיר האָבן אויבן אָנגעוויזן, איז אונז אלעמען גוט באוואוסט גאר אייזן. שוועבל איז אונז אויך אביסל באקאנט צוליב די שוועבעלעך. אבער די איבעריגע עלעמענטן זיינען אונז פֿרעמד, ווייל אין אַ ריינער געשטאַלט קומען זיי זעלמן פֿאַר אין דער נאַטור, זיי זיינען כמעט אלעמאַל צעמישט מיט אנדערע שטאַפֿן, און דערפֿאַר איז זיי שווער צו קענען. גאַר אפילו דאָס אייזן און דאס שוועבל, וואס איז אונז יאָ באוואוסט, וועלן מיר אויך מיטן אויג ניט דערקענען אין די אש. בעת אייזן שטאַף פֿאַראייניגט זיך מיטן אנדערן, בייט ער אָפֿטמאַל זיין אויסזעהן אוי, אז מען קען אים ניט דערקענען. אן איינפֿאַכער ביישפּיל. צעלאָזם צוקער אָדער זאלץ אין אַ גלאָז וואסער, ווער וועט אייך מיטן אויג דערקענען אין דעם קלארן וואסער צוקער אדער זאלץ?

בעת דאס געוויקס איז פֿאַרברענט געוואָרן ביז קויל און דער קויל ביז אש, איז געגאַנגען אַ רויך. דאס האָבן זיך פֿון דעם געוויקס אויסגעשיידט די גאַזן. דורך זעהר שווערע עקספּערימענטן האָט זיך איינגעזעבן צו דערוויסן זיך, אז אין די געוויקסן געפֿינט זיך דער גאז שטיקשטאָף אָדער אַזאָט; וואסער באשטייט ווידער פֿון צוויי שטאַפֿן: זייער שטאַף און וואסער-שטאַף.

אויארום זיינען געלערנטע געקומען צו אזא רעוולוטאט: אלע געוויקסן באשטייען פֿון צעהן איינפֿאַכע שטאַפֿן (עלעמענטן) — זייער שטאַף, וואסערשטאַף, אַזאָט, קוילנשטאַף, אייזן, קאליום, קאל-ציום, מאנגעזיום, פֿאַספֿאָר און שוועבל. די לעצטע זעקס שטאַפֿן זיינען דער מינעראלישער טייל פֿון געוויקסן.

וויבאר מען האָט אויסגעפֿאַרשט, פֿון וועלכע שטאַפֿן די געוויקסן זיינען אויפֿגעבויט, האָט מען געמוזט זוכן אן ענטפֿער אויף גאַך אַ ווייטערדיגע פֿראגע: אַוואו געמט דאס געוויקס די שטאַפֿן, פֿון וועלכע עס באשטייט? די געוויקסן קענען געמען שטאַפֿן גאר פֿון דער לופֿט און פֿון דער ערד. די מינעראלישע טיילן זיינען אבער אין דער לופֿט ניטאָ. דעריבער איז קלאָר, אַז די געוויקסן באקומען זיי גאַר פֿון דער ערד.

ווען דער באָדן איז אָרעם מיט מינעראלישע שטאַפֿן, וועלכע זיינען גויטיג פֿאַר די פֿלאַנצן, ברענגט מען זיי אריין אין באָדן קינסטליך, דאָס הייסט, מען מיסטיגט דעם באָדן מיט מינעראלישע שטאַפֿן, וואס ווערן צו-געגרייט אויף ספעציעלע פֿאַבריקן.

פרובן פֿון געלערנטע.


מיר האבן צעלייגט דאס געוויקס און ארויסגעפֿונען, פֿון וועלכע שטאָפֿן עס באשטייט. אָבער דאָס איז נאָך ווייניג. מען מוז זיך נאָך איבערצייגן, אויב די שטאָפֿן, וועלכע מען געפֿינט אין די אש, זיינען טאקע דורכום נויטיג פֿאר די געוויקסן.

אין דעם קען מען זיך איבערצייגן, ווען מען פרובירט האַדעווען פֿלאַנצן אין וואסער, וואו מען צעלאָזט די נויטיגע שטאָפֿן. די פֿלאַנצן וואקסן אויס גוט, ווען סײַזינען דאָ אלע שטאָפֿן און שטארבן אפּ אָדער אנטוויקלען זיך שוואַך, ווען איינער פֿון די שטאָפֿן פֿעלט.

עס איז זעהר אינטערעסאנט צו מאַכן אַליין דעם עקספּערימענט. די שטאָפֿן קען מען באקומען אין אפטייק; מיר נעמען ניט קיין ריינע פֿאָספֿאָר, שוועבל, אייזן, מאַנגעזיום, קאלציום און קאליום; מען באקומט אין אפטייק אַזויגע זאלצן, וואָס די שטאָפֿן גייען אין זיי אריין פאראייניגטע מיט אנדערע. אויף א ליטר ריינע וואסער דארף מען נעמען 1 גראם סעליטרעקאלך, 0,25 גראם כלאָרקאליום; 0,25 גראם שוועבלזויערע מאַנגעזיום; 0,25 גראם פֿאָספֿאָרויערע קאליום און עטליכע טראָפּנס צעלאָגענע אייזנבלאָריד. כדי דער אפטייקער זאל אייך גוט פארשטיין ניט אים אזא רעצעפט:

1 גראם $Ca(NO_3)_2$; 0,25 גראם KCl;
0,25 גראם $MgSO_4$; 0,25 גראם KH_2PO_4 ;
עטליכע טראָפּנס $FeCl_3$.

דאָס וואסער מיט די צעמישטע און צעלאָגענע זאלצן גיסט אריין אין א הויכער גלעזערנער פֿלי, דעקט זי צו מיט א שטיקל מערלע אָדער טול און לייגט אוועק דורכגעוואקסענע קערנער פֿון מאַיס (קוקורוזע), גריקע, בעבלעך, ארבעס אדער אנדערע געוויקסן; די וואַרצלען וועלן זיך אראָפֿלאָזן אין וואסער, און דאס געוויקס וועט וואקסן, שטעלט עס נאָר אוועק אויף א זוניגן פֿענסטער. כדי דאָס געוויקס זאָל זיך בעסער האלטן, קען מען עס ארייגשמעלן אין א דורכגעלעכערטן קאָריק; אויב די לעכל איז צו גרויס, וויקלט מען דאָס געוויקס ארום מיט וואסער. די גלאָז וויקלט מען ארום מיט טונקעלע פאפיר, די ווענטלעך זאָלן ניט פארגינגט ווערן. אין גלאָז דארף מען פֿון צייט צו צייט אריינ-בלאָזן לופֿט און צוניסן וואסער.



דאָס וואקסן פֿון קוקורוזע אין א גערפֿליסיקייט.
(פֿון „פראַקטישע שטיילע רעאליענבוך“ פֿון B. G. Teubner אין לייפּזיג)

האָדעווענדיג אין איין צייט איינע און דיועלביגע געוויקסן אין וואסער מיט אלע שטאַפֿן און אין וואסער, אין וועלכע איינער פֿון די שטאַפֿן פֿעלט, זעהט מען, וואָס פֿאַר אַ באַמייט יעדער שטאַפֿ האָט פֿאַר די געוויקסן פֿונאוואַנען די געוויקסן געמען קוילנשטאַף, וועלן מיר זעהן שפעטער.

די בלעטערבוימער אין פֿריהלינג.

אונזערע בלעטערבוימער (דער נוסבוים, די הושענא, די בעריאָזע, די אָלכע און א.נ.) כאַפֿן זיך אויף פֿריה פֿון ווינטערשלאָף. ווינאָר די איינגע-פֿראָרענע ערד וואַרעמט זיך אָן פֿון דער זון און זאָפּט זיך אָן מיט וואַסער פֿון דעם צענאָנגענעם אייז און שניי, הייבן אָן צו אַרבעטן די וואַרצלען. מיר האָבן שוין געזעהן, וועלכע שטאַפֿן די געוויקסן באַקומען פֿון דער ערד. דער וואַרצל איז דער איינציגער אָרגאַן, מיט וועלכן די געוויקסן קענען די וויכטיגע שטאַפֿן אויפֿנעמען. ווי רייך די ערד זאָל מיט אַסדי שטאַפֿן ניט זיין, קענען די געוויקסן זיך ניט אַנטוויקלען, אויב די שטאַפֿן זיינען ניט צעלאָזן אין וואַסער; די וואַרצלען ציהען אַריין גאָר שיטערע שפייז, אין אַ טרוקענעם באָדן קענען די געוויקסן ניט לעבן. דער פֿריהלינג איז אַ גונסטענע צייט פֿאַרן אויפֿלעבן, ווייל די ערד איז אָנגעטרונקען מיט וואַסער. וואָס דינער און צארטער די וואַרצלען זיינען, אַלץ גרינגער געמען זיי אין זיך אַריין די שיטערע שפייז.


ס'איז אייך אפשר אויסגעקומען צו זעהן, ווי מען פֿאַרפֿלאַנצט בוימער. קוקט זיך איין, ווי פֿאַרויכטיג דער סעדער באַגייט זיך מיט די דינינקע וואַרצלעך פֿון בוים (אַנדערע זיינען ניט דיקער פֿאַר אַ האָר); די אלטע דיקע וואַרצלען זיינען באַדעקט מיט קאָרע, אויף זיי האַלט זיך דער בוים, אָבער זיי נעמען שוין קיין שפייז אין זיך ניט אַריין, דאָס איז די אַרבעט פֿון די דינסטע האָרוואַרצלען.

אויב מען זעצט ביי אייך איבער אין פֿריהלינג וואַזאָנעס אין גרעסערע טעפֿלעך מיט פֿרישער ערד, קוקט זיך איין אויף די דינע וואַרצלעך און באַגייט זיך מיט זיי פֿאַרויכטיג, רייסט זיי ניט אָפֿ.

פֿון די וואַרצלען הייבט זיך דער שטראָם (די וואַסער מיט די צעלאָזענע שפייז) צום שטאַם. דורך דעם שטאַם רערן צו די צווייגן און די קנאָספֿן, וואָס האָבן איבערגעווינטערט אויפֿן בוים אונטער האַרטע לעדערדיגע שופֿן. די קנאָספֿן ווערן אָנגעקוואַלן, די שופֿן רוקן זיך פֿונאַנדער, און עס באַווייזן זיך יונגע צארטע בלעטעלעך.

די בעריאָזע איז אין פֿריהלינג אזוי רייך מיט זאָפֿט, אז ער טריפֿט אַראָפֿ

פֿון די צווייגן (פֿון די שפיצן זייערע). די יונגע בלעטער זיינען קלעפֿיג און ווען מען ענגערט אױס א לעכל אין שטאם, גיסט זיך זאפֿט. ברעכט אָפֿ א דינעם צווייגל, נעמט אראָפֿ די קאָרע, וועט איר זעהן, ווי זאפֿטיג די האָלץ איז. ווען מען האקט אין פֿריהלינג אפֿ א בוים, גיסן זיך טרערן פֿון שטאם. דאָס איז „דער געוויין פֿון די געוויקסן אין פֿריהלינג“.



ווענבלאָט.

פֿון „קרעפֿלין, לייטפֿארן ס. ד. באַטאנישן אונטערריכט“

B. G. Teubner, Leipzig-Berlin פֿאַרלאַג

וויאזוי גייט דער זאפטשטראם פֿון די וואַרצלען צו די בלעטער?

לאָמיר נעמען א יונגן צווייגעלע פֿון א בעריאָזע, פֿון א טאָפּאַל אָדער פֿון א הושענא און אריינשמעלן אין וואסער; דאָס וואסער וועט זיך אויפֿ-הייבן צו די בלעטער און זיי וועלן גרינען ווייטער.

לאָמיר נעמען נאָך א צווייגעלע פֿון דעמועלביגן בוים, פֿאַרזוכטיג מיט א שאַרפֿן מעסער אויסשניידן א שמאַלן רינג קאָרע ארום און ארום און אריינשמעלן אין וואסער אזוי, אז דאָס וואסער זאָל זיין נידעריגער פֿאַרן רינג. דער צווייגעלע וועט ניט פֿאַרטריקנט ווערן. דאָס איז א באַזוויי, אז די זאפט פֿון די וואַרצלען גייט ניט דורך די קאָרע. אויב מען זאָל אין א דריטן צווייגעלע מאכן טיפּער דעם רינג און אויסשניידן די יונגע ווייכע רינגען האַלץ, וועלן די בלעטער פֿאַרטריקנט ווערן. דאָס באַזווייזט, אז דער זאפט-שטראָם גייט דורך די האַלץ.

אין שטאַם זיינען דא רערן, וואָס דער זאפט גייט דורך זיי, אָבער די רערן זיינען אזוי דין, אז מען קען זיי אין בוים מיטן אויג (אָהן א זעהר שטאַרקער פֿאַרגרעסערנלאָז) ניט זעהן. דייטליך זעהן די רערן קען מען אין א געוויקס, וואָס רופט זיך וועגבלאַט; ער וואקסט אומעטום אויף לאַנקעס, וועגן, אין גאָרטן לעבן פלאַנקן. זיינע גרויסע בלעטער זיינען צו-זאַמענגעקליבן אין א גרויסע ראָזעטקע. רייסט אפ א בלאט, וועט איר זעהן לאנגע שטאַרקע פעדים. דאָס זיינען די רערן.

אין בלעטער וואלד.

דער נוסבוים.

דער נוסבוים דערגרייכט ניט קיין גרויסע הויך. אָפּטמאָל האָט ער די וואוקס פֿון א גרויסן קוסט; מען קען אים טרעפֿן אויפֿן אפֿהאַנג פֿון א באַרג, אויף פֿעלדוועגן און נאָך עפֿטער אויפֿן ראַנד פֿון וואלד אונטערן שאַטן פֿון גרויסע בויםער.

זיינע לאנגע צווייגן זיינען בייגעוודיג, מען פֿלעכט פֿון זיי קערב, די האַלץ איז ווייך און לאָזט זיך גוט שניצן.

דער נוסבוים בליהט זעהר פֿריה. די בליהונג, לענגליכע קנאָספֿן מיט האַרטע שופֿן, האָט זיך אַנטוויקלט סוף זומער און האָט איבערגעוויינטערט אויף די צווייגן. „קעצעלעך“ אָדער „אויעררינגלעך“ רופט מען זיי. ווינאָר די זון נעמט וואַרעמען אין פֿעווראל און אין מאַרץ, ציהען זיך די אויעררינגלעך אויס, הענגען אַראָפּ פֿון די צווייגן, ווי שלענגעלעך, און שאַקלען זיך פֿון קלענסטן ווינטל.

יעדער אויעררינגל איז א געבלים און באשטייט פֿון אפֿולע קליינע בלימעלעך. איטליכע בלום באשטייט פֿון א ברוינעם שופ, פֿון צוויי צארטע בלעמעלעך און אכט שטויבפֿעדריס מיט שטויבבייטעלעך. וואו איז אָבער דער פעסטל, פֿון וועלכן עס דארף זיך אנטוויקלען די פֿרוכט? אין דעם געבלים זוכט אים ניט. די בלומען האָבן נאָר שטויבפֿעדריס, דאָס זיינען „מעגליכע בלומען“. דער פעסטל געפֿינט זיך אין אנדערע בלומען, וועלכע זיינען אויך צוזאמענגענומען אין א געבלים. אויף דיזעלביגע צווייגן קען מען באמערקן קליינע קנאָספֿן מיט ברוינע שופן, וואָס פֿון זיי קוקן ארויס רויטע הערעלעך. בעת מיר נעמען פֿונאנדער די שופן, געפֿינען מיר דארטן „ווייבליכע בלומען“ אָדער פעסטלבלומען. דאָס זיינען קליינע בלעמעלעך מיט צוויי קיילעכדיגע פעסטלעך; איטלעכער פעסטל האָט צוויי „מילער“, דאָס זיינען לענגליכע רויטע פֿעדיס. זיי קוקן דאָס ארויס פֿון די שופן און ציהען צו אונזער אויפֿמערקזאמקייט. די פעסטלעך בלייבן באהאלטן אין די שופן, און די הערעלעך נעמען אויף די בלומענשטויב, וואָס דער ווינט פֿארטראָגט פֿון די שטויבבלומען.

די בלומען האָבן ניט קיין האַנג און ניט קיין ריח, זיי ציהען ניט צו קיין אינזעקטן, וואָס זיינען נאָך בכלל ניטאָ אין די פֿריהע און קאלטע טעג פֿון פֿריהלינג. דער ווינט כאפט אונטער דעם טרוקענעם בלומענשטויב און טראָגט אים לייכט פֿונאנדער. קיין בלעמער זיינען נאָך אויף די צווייגן ניטאָ, און צוליבדעם קען זיך דער שטויב בעסער פֿארשפּרייטן. אפֿולע גייט אינוועזן, אָבער די מעגליכע בלומען שאפֿן אויפֿיל שטויב, אז עס קלעקט צו באשטויבן אלע פעסטלבלומען. נאָכדעם, ווי דער שטויב ווערט פֿארשאטן, פֿאלן די מעגליכע „קעצעלעך“ אראָפּ.


די באשטויבטע פעסטלעך אנטוויקלען זיך פאמעליך ווייטער, און ערשט אין 5—6 מאָנאט ארום ווערן פֿארטיג די ניס מיט דער געשמאקער יאָרדע און דעם האַרטן האַלציגן שאַלעכץ.

סוף אפֿריל לאָזן זיך פֿונאנדער די גרויסע רונדליכע אָדער האַרצעפֿארמיגע בלעמער; זיי זיינען לייכט באהאָרט, ביי די ברעגעס געצייגט; די ערשטע צייט האָבן זיי שוצבלעמעלעך, וואָס פֿאלן שפעטער אראָפּ. די גרויסע בלעמער זיינען זעהר וויכטיג פֿארן נוסבוים. מיט זיי נעמט ער אויף די שטראלן פֿון דער זון, וואָס דרינגען קוים דורך צווישן די בלעמער פֿון די איבעריגע העכערע און גרעסערע בוימער פֿון וואַלד.

אזויגע געוויקסן, ווי דער נוסבוים, הייסן איינגעשלעכטיגע, ווייל זיי האָבן באזונדערע שטויבבלומען און פעסטלבלומען. זיי הייסן אויך אייגהוויזיגע, ווייל ביידע מינים זיינען אויף איין בוים.

די אַלבע.

פֿאַרבייט ניט דעם נוסבוים מיט דער אַלבע, זיי זיינען ענליך, וואקסן אָפט נאָענט איינער פֿון דעם אנדערן. די אַלבע וואקסט אויך ניט הויך, אמאָל ווי א בויס, אמאָל ווי א קוסט. איר קאָרע איז טונקל, אויף אלטע



די אַלבע

פֿון „קרעמלין, ליידפֿאין פֿ. ד. באַטאנישן אונטערריכט“

B. G. Teubner, Leipzig-Berlin פֿאַרלאַג

בוימער כמעט שוואַרץ. אירע בלעטער האָבן דיגעלביגע פֿאַרמע, זיינען אָבער קלענער, טונקעלער און האַרטער, ווי ביי דעם נוסבוים. זי בליהט אויך פֿריה אין פֿרייהלינג, האַט אויך צווייערליי בלומען, מעגליכע און ווייבליכע (שטויבבלומען און פעסטלבלומען).

ברעכט אָפּ אין יאָנוואַר אָדער אין פעוואַרל צווייגן פֿון אן אַלבע מיט


“קעצעלעך”, און שמעלט זיי אריין אין וואסער. ווען די שופן פון די “קעצעלעך”, וועלן זיך עפענען, גיט א טרייסל די צווייגן, וועט איר זעהן, ווי ארום די בלימעלעך וועט זיך אויפהייבן אזוי ווי א געלער רויך, דאָס איז דער בלומענשטויב.

דער ווינט איז דאָ אויך דער איינציגער באשטויבער. די פֿרוכט איז א קליינע שווארצע שישקעלע, וואָס ווינטערט איבער אויפֿן בוים; אין מאָרט שיט זיך ארויס די זאָט און פֿארזיט זיך אין דער ערד. די אָלכע האָט ליב א פֿייכטן באָדן, מיר טרעפֿן זי אין וואַלד צווישן אנדערע בוימער, אָבער אָפֿט־מאָל וואַקסט זי זיך פֿונאַנדער אויף פֿייכטע, גינדעריגע ערטער לעבן וואַסער. איר האָלץ איז ברוינליך, שפּאַלט זיך גרינג, איז אָבער זעהר פֿעסט, פֿוילט גיט אפֿילו אין וואַסער; דעם מענשן איז זי צוליבדעם זעהר נוצליך.

די בעריאָזע.

די בעריאָזע וואַקסט אָפֿטמאָל צווישן אנדערע בוימער אין וואַלד. ס'טרעפֿן זיך אָבער אויך גאַנצע בעריאָזעווע וועלדער, גרויסע און געדיכטע. די מענשן שעצן זעהר איר שיינעם און שטארקן האָלץ, וואָס גיט פֿיל היץ. בעריאָזע רעכנט זיך פֿאַר דאָס בעסטע ברענהאָלץ.

די בעריאָזע דערקענט מען צוליב איר ווייסער קאָרע; דער שטאַם איז הויך און שלאַנק; די לאַנגע און בייגעוודיגע צווייגן לאָזן זיך אַראָפּ צו דער ערד; די דרייקאַנטיגע בלעטער זיינען צוגעשפיצט און ביי די ברעגעס געציינט; אין פֿרייהלינג זיינען זיי קלעפֿיג, ווייל אויף זיי געפינט זיך א מין שמעקעדיגע פֿעד. זי האָט אויך צווייערליי בלומען, ווי דער נוסבוים: שטויב־קעצעלעך און פֿרוכטקעצעלעך. די שטויב־קעצעלעך ווייגן זיך אויף די צווייגן, ביזוואַנען דער ווינט צעווייט דעם שטויב, דערנאָך



די בעריאָזע


פֿון „קרעמלין, לייטפֿאַרן פֿ. ד. באַטאַנישן אונטעררייכט“.

פֿאַרלאַג B. G. Teubner, Leipzig-Berlin

פאלן זיי פֿון בוים אראָפּ. דער ווינט באשטויבט די פעסטבלומען, פֿון זיי אנטוויקלען זיך קליינע ניסעלעך מיט פליגעלעך. דער ווינט כאפט אונטער די לייכטע ניסעלעך, צעטראָגט זיי איבערן וואלד און פֿארזייט זיי.

די הושענא, אדער די ווערבע.

אָפטמאָל טרעפֿן מיר די הושענא אין שכנות מיט דער אָלכע און דעם נוסבוים. דער וואסערברעג איז איר ליבסטער אָרט. זי וואקסט גיך, און ביי די ערגסטע באדינגונגען. שמעלט אריין אין פֿריהלינג אָן אָפגעשניטענעם צווייג אין וואסער און איר וועט זעהן, ווי גיך זיי וועלן זיך נעמען וואָרצלען; זיי וואקסן אויך און לאָזן ארויס וואָרצלען, אַז מען פארזעצט זיי אין נאָסן זאמד. די מעגשן נוצן דאָס אויס. זיי פארפלאנצן הושענאבויםער אויף די וועגן, וואו זיי וואקסן זיך גיך פֿונאנדער, און פֿון די אָפגענע וועגן ווערן שטאַנדדיגע אלעס. נאָך



בליהונגען פֿון דער הושענא

פֿון „פֿראַנקע־שטיילס, רעאליענבור, באנד 1, אויסג. A.
B. G. Tenbner, Leipzig-Berlin פֿאַרלאַג

מער פֿאַרפֿלאַנצט מען זיי אויף זאמדיגע שיטיגע ברעגעס; זיי צעוואַרצלען זיך אין שיטיגן זאמד און פֿאַרפֿעסטיגן דעם ברעג. דאָס שוואַכע האַלץ פֿונד דעם הושענאבויס איז ניט דויערהאַפֿטיג. דער שטאם ווערט גיך צעפֿוילט, אָבער דער וואַרצל ניט יונגע שפּראַצונגען, וואָס וואַקסן זיך פֿונאנדער געדיכט ארום דעם אלטן שטאם.

די הושענא געהערט צו די בוימער, וואס בליהען פריה. שוין אין מאָרט, בעת די בלעטער זיינען נאָך פֿאַרבאָרגן אין די קנאָספּן, באווייזן זיך אויף אירע גלאטע צווייגן גרויע סאַמעטענע קעצעלעך; שפעטער אין אפריל ווערן זיי געל, די שופן אויפֿן נעכלים עפֿענען זיך, און די שטויבבלומען געלן זיך דאָס פֿונווייטן. איטלעכע בלום באשטייט פֿון אַ קליינעם באהאַרטן שופ מיט צוויי שטויבפֿעדעס. די בלומען שמעקן, זיי האָבן האַנג און ציהען צו צו זיך אינוועקטן, דערהויפּט בינען. זוכט ניט אויף דעמוזעלביגן בוים קיין פעסטלבלומען, אייער מיה וועט זיין אומזיסט. די פעסטלבלומען זיינען אויך צוזאמענגענומען אין קעצעלעך, אבער אנדערע. זיי זיינען גרויגריין און וואַקסן אויף אנדערע בוימער. יעדע פעסטלבלום באשטייט אויך פֿון א שופעלע מיט א לענגליכן פעסטל, זי האָט אויך שמעקעדיגע האַנג. די קלעפֿיגע שטויב ווערט ניט צעווייט פֿון ווינט. בינען און אנדערע אינוועקטן, וואָס לאָבן זיך מיטן זיסן האַנג, טראָגן אריבער די שטויב פֿון די מעגליכע בלומען אויף די ווייבליכע און העלפֿן מיט, זיי זאָלן באשטויבט ווערן.

נאָך דער באשטויבונג פֿאלן די שטויבקעצעלעך אראָפּ. די פֿרוכט ווערט פֿאַרטיג אין מאי. פֿון פעסטל ווערט א קאַפּסל, זי עפֿנט זיך און פֿון איר שיט זיך ארויס זאָט, גאר קליינע שוואַצע קערנדלעך, איינגעוויקלטע אין פּוך. דער ווינט כאַפּט זיי אונטער און צעטראַגט די זאָט אין אלע זייטן.

די בלעטער, וואס זיינען לענגליך ווי אַן איי, לאָזן זיך פֿונאנדער שפעטער פֿאַר די קעצעלעך, פֿונאנהייב זיינען זיי געדיכט באהאַרט, שפעטער בלייבט די באהאַרונג נאָר אויף דער אָונטערשטער זייט, דערפֿאַר איז דער בלאט פֿונאונטן ווייסליך. לעבן איטלעכן בלאט געפֿינען זיך צוויי קליינע בלעטעלעך.

די הושענא האָט זעהר פֿיל קרובים, וואָס אונטערשיידן זיך פֿון איר מיט זייערע בלעטער. ס'איז דאָ צעהנדליגער מינים הושענאגעוויקסן, קוסטעס און בוימער. איין מין מיט זעהר דינע און בייגעוודיגע צווייגן רופֿט זיך אַן די קאַרבהושענא, ווייל פֿון אירע צווייגן פֿלעכט מען קערב.

לעבן וואסער טרעפֿן זיך הושענאבוימער מיט וואונדערליך אויסגע- בויגענע, אַפּטמאָל כמעט לינגדיגע שטאמען.

ביי דעם גרעסמן טייל מינים זיינען די בלעטער שמאָלע, לאנגע און בלישמשעדיגע.
אלע הושענאבומער זיינען איינגעשלעכטיגע און צווייהוויזיגע געוויקסן.

דער פאָפּלבוים.

דער פאָפּלבוים, אָדער דער טאָפּאָל, איז אויך א צווייהוויזיגער געוויקס, ווי די הושענא, ער בליהט אויך פריה, זיינע בלומען האָבן ניט קיין האָניג און ווערן באשטויבט דורכן ווינט.

דער טאָפּאָל איז זעהר א פארשפרייטער בוים. אין אונזערע קאנטן טרעפט זיך אָפּט דער שמעקעדיגער טאָפּאָל מיט גרויסע דרייקאנטיגע בלעטער. מען פֿארפלאנצט דעם טאָפּאָל אויף וועגן און אין פארקן. די קנאָספן און יונגע בלעטער זיינען קלעפיג צוליבן שמעקעדיגן פעך.

א מעכטיגער בוים איז דער „זילבערנער טאָפּאָל“. ער הייסט אזוי צו ליבדעם, וואָס זיינע בלעטער זיינען פֿונאונטן ווייס ווי זילבער. ביי אונז טרעפט מען אים נאָר אין פארקן.


זעהר פארשפרייט אין אונזערע וועלדער איז די אפושע (אָסיגע). זי האָט א גלאטע גרויע קארע; אירע רונדליכע הארטע און געצייגטע בלעטער האָבן לאנגע, שמאָלע (פֿון די זייטן צוגעפלאצטע) שמילן, דערפֿאר זיינען זיי זעהר באוועגליך, הייבן אָן צו ציטערן ביי דעם קלענסטן ווינטל און דרייען זיך אלעמאָל אין דער זייט, אין וועלכער דער ווינט ווייט.

ביי אלע מינים פאפּלבוים איז דער שמיל פֿון בלאט פֿון די זייטן אביסל פלאציג, און די בלעטער דרייען זיך אין אלע זייטן. דאָס איז א גוטער שוץ קעגן א שמורעמווינט. דער גאנצער בוים מיט זיינע מעכטיגע באבלעטערטע צווייגן שטייט אנטקעגן דעם ווינט, ווי א גרויסע וואנט; וואָלט די וואנט געווען אומבאוועגליך, וואָלט איר א שטארקער ווינט געקענט צעשמערן. אָבער די באוועגליכע בלעטער הייבן זיך אָן צו דרייען אין דער ריכטונג, אין וועלכער דער ווינט ווייט און לאָזן אים דורך. דעריבער בלייבט דער בוים גאנץ, ניט געשעדיגט פֿון שמורעם. ס'איז זעהר אינטערעסאנט צו באטראכטן די שפיל פֿון די בלעטער מיטן ווינט ביי א טאָפּאָל, דער-הויפט ביי אן אָסיגע.

וועלכע בויםער בליהען נאך אזוי פריה? וואסערע בליהונג האָבן זיי? אויב איר וועט האָבן די מעגליכקייט, קוקט זיך איין אויף די בלומען פֿון פֿארשיידענע קעצעלעך דורך א פֿארגרעסערנלאָז. פֿארגלייכט פֿארשיידענע פֿריהבליהערס און געפֿינט ארויס, אין וואָס זיי זיינען ענליך. וואָספֿאר א באַטייט האָט עס, וואָס ביי די פֿריהבליהערס לאָזן זיך די בלומען פֿונאנדער פֿריהער פֿאר די בלעטער, וואָס די שטויבבלומען שאפֿן פֿיל שטויב, און די שטויב איז טרוקן און שטייג?

דער דעמב, אדער דער אייכלבוים.

דער דעמב איז דער מעכטיגסטער בלעטערבוים פֿון אונזערע וועלדער. קוקט זיך צו צו אים אין די ערשטע מעג פֿון פֿריהלינג, ווען ער שטייט נאָך נאקעם. (ער באבלעטערט זיך שפעטער, ווי אנדערע בויער.) אין זיין גלייכן שטאם פֿילט איר א געוואלטיגע קראפֿט. די גראָבע געדרייטע צווייגן



דער דעמב

פֿון „קרעסעלין, איינשרונג 5. ד. באַטאנישן אונטעררייכט“

פֿאַרלאַג: B. G. Teubner, Leipzig-Berlin

זייגען ברייט פֿונאנדערנעשפרייט; די האַרטע גרוישווארצע קאָרע איז שופּיג, צעריסן. דאָס פּלאַצט זי, ווייל דער בוים וואַקסט פֿונאינווייניג. אימלעכן יאָר קומט צו א רינג האַלץ ארום און ארום, ווערט די „העמדל“ צו ענג פאַר דעם „גוף“ און מוז פּלאַצן. דער דעמב דערגרייכט ביז 35—40 מעטער אינדערהייד, איבער 2 מעטער אין דיאמעטער און קען לעבן ביז 2000 יאָר. דער אייכלבוים האַלט זיך אויף א זעהר מעכטיגן וואַרצל, וואָס לאָזט זיך אראָפּ שיף אין אונטערגרונט און צעצווייגט זיך אויף אפֿולע גרויסע און קליינע וואַרצלען, וועלכע צעשפרייטן זיך ווייט אין אלע זייטן. צוליבדעם

קען דער דעמב אויסהאלטן דעם גרעסטן שמורעם. זיינע גלאנצונגע בלעטער זיינען הארט, לעדערארטיג, זיי האָבן די פֿאַרמע פֿון אן איי מיט טיף איינ-געשניטענע ראַנדן. מען דערקענט זיי פֿונווייטן נאָך זייערע גרויסע רונדליכע צאָקן ביי די ברענעס. דורכן מיטן פֿון בלאט ציהט זיך א גראָבער אָדער, וואָס צעצווייגט זיך אין ביידע זייטן. די אָדערן גיבן צו דעם בלאט האַפֿטיקייט; זיי זיינען קליינע רערן, וואָס דורך זיי צעניסט זיך איבערן בלאט די זאָפֿט, וועלכע הייבט זיך אויף פֿון וואָרצל דורכן שטאם. געלע און פֿארדארמע בלייבן אַפֿטמאָל די בלעטער דעם גאנצן ווינטער אויפן בוים.

אין א רעגן פֿילט מען זיך אונטערן דעמב מיט זיינע ברייטע באבלעטערטע צווייגן, ווי אונטער א דאך. פֿאַלנדיג אויף זיינע בלעטער, צעקלאַפֿן זיך די רעגנטראָפֿנס אין גרעסטן גוס אויף טוויזנטער קלענערע טראָפֿנס; זיי רינען איבער די בלעטער און טריפֿן פֿון בלאט צו בלאט ביד וואנען זיי פֿאלן אראָפֿ אויף דער ערד, ווייט פֿון שטאם, אונטער די שפיצן פֿון די ברייט פֿונאנדערגעלאָזענע צווייגן. אונטער דער אַרד געפינען זיך אין דעם אָרט די דינסטע וואָרצלען, וואָס זייגן אריין דאס רעגנוואסער. אויב איר וועט זיך מיט אַטדער ערשיינונג פֿאראינטערעסירן, וועט איר דאָס זעלביגע באמערקן ביי אַפֿולע בויער מיט גרויסע "קרוינען", (אזוי רופֿט מען די גאנצע מאסע ברייט פֿונאנדערגעשפרייטע צווייגן); דאָס רעגנוואסער טריפֿט אראָפֿ ארום און ארום ווייט פֿון שטאם, און ווען מיר זאָלן אויסגראָבן דעם בוים, וועלן מיר זעהן, אז די ברייט צעצווייגטע וואָרצלען לאָזן פֿונאנדער דווקא אין אַטדעם אָרט, זייערע דינסטע זיינפֿעדיס. אזוי פֿירן צו די בלעטער דאָס רעגנוואסער צו אַטדי טיילן פֿון וואָרצל, וועלכע גויטיגן זיך מער פֿאַר אלץ אין פֿייכטקייט.

דער דעמב בליהט שפעטער ווי די בעריאָזע און דער טאַפֿאַל, נאָכדעם ערשט ווי זיינע בלעטער שפראַצן שוין ארויס. זיין בליהונג איז אַן איינגע-שלעכטיגע און ווערט באשטויבט דורכן ווינט. זיינע גרוינליכע בלומען זיינען גיט קיין קענטיגע און האבן קיין שום גערוד גיט. די קעצעלעך הענגען אראָפֿ פֿון די צווייגן, ווי לאנגע קייטעלעך. יעדער בלימל באשטייט פֿון עטליכע בלעטעלעך מיט א קליינעם בינטל שטויבפֿעדיס. די שטויב איז טרוקן און שיטיג.

די פעסטבלומען זיצן איינציגווייז אָדער מערווייז אויף די שפיצן פֿון קורצע צווייגעלעך. זיי זעהען אויס ווי קנאַספֿן מיט אַפֿולע קליינע שופֿן. פֿון דער קנאַספֿ קוקט ארויס א רויטליכע דריילופֿיגע מיילכעלע.

די פֿרוכט פֿון דעמב איז אונז אַלעמען גוט באקאנט. דאָס איז דער לענגליכער אייכלנוס (חורנוס) מיט א שיסעלע. די שיסעלע ווערט פֿון די פֿאַרהאַלצטע פעסטלשופֿן. אין האַרבסט פֿאלן די ניס אראָפֿ פֿון בוים

און פֿאַרוויינען זיך אליין אין וואַלד. צעשפאלט דעם שְׁאַלעכץ, וועט איר זעהן, ווי דער גרויסער קערנדל צעפאלט זיך אויף צוויי העלפֿטן (די זאָמטיילן). און צווישן זיי וועט איר געפֿינען דעם קליינעם שפּראַצער. פֿאַרזעצט דעם נוס אין פֿייכטע ערד, וועט איר האָבן דעם פֿאַרגעניגן צו זעהן, ווי דער שְׁאַלעכץ וועט פֿלאַצן, און ווי דער נוס וועט דורכוואַקסן. דעמבעס וואַקסן שיטער, אָפֿט געמישט מיט אנדערע בוימער, ווייל זיי, די ריזן, פֿאָדערן צופֿיל שפּייז און ליכט. אין ענגשאַפט קומען זיי אום. זיי נויטיגן זיך אין א פֿייכטן און פֿרוכפּערדיגן באָדן, טרעפֿן זיך דאָס רוב אויף נידעריגע ערטער, אָפֿט אויף אועלכע, וואָס ווערן אין פֿריהלינג פֿאַרפֿלייזט פֿון וואַסער.

אמאָל פֿלעגן מענשן פֿאַרגעמערן דעם דעמב. אונטער זיין ברייטן גרינעם דאָך פֿלעגן זיי אָפֿטאָן וויכטיגע און פֿייערליכע מעשים — שליסן אָפּמאכן, משפּטן, וכדומה. דאָ פֿלעגן זיך אן עצה האַלטן די עלטסטע פֿון פֿאָלק. דא פֿלעגט מען פֿראווען חתונות.

נאָך איצטער פֿלאַנצט מען איין דעמבעס לכבוד גרויסע מענשן אָדער גרויסע געשעהענישן אין לעבן פֿון פֿאָלק. דער דעמב ווערט געברויכט אין אזויגע פֿאלן ווי א לעבעדיגער דענקמאָל.

דעמבאָווע האַלץ איז פֿעסט, גיט פֿיל היץ און פֿוילט ניט. פֿון דעמבאָווע קלעצער בויט מען אויך הייזער; אזויווי דעמבאָווע קלעצער פֿוילן גיט אין וואַסער, בויט מען פֿון זיי בריקן; פֿון דעמבאָווע האַלץ מאַכט מען די טייַערסטע מעבל. אין דער קאָרע פֿונם דעמב געפינט זיך א באַזונדערער שטאָף — "גאַרבוִיערס"; מען באַקומט די גאַרבוִיערס, בעת מען פֿאַרווייקט די צע-מאָלענע דעמבאָווע קאָרע אין וואַסער. מען באַנוצט זיך דערמיט, בעת מען אַרבעט אויס פֿון רויהע פֿעל לעדער.


ווער שעדיגט דעם דעמב? אויפן מעכטיגן בוים לעבן אפולע קליינע באשעפֿענישן, וואָס שפּייזן זיך מיט זיינע האַלץ און בלעטער און זיינען בפות אים צו שעדיגן און אַפֿילו אומצוברענגען, אויב זיי פֿאַרמערן זיך שטאַרק.

די גאַלוועספּ. סוף זומער באַווייזן זיך אויף די אייכלבלעטער רויטליכע קיילעכדיגע געוואַקסן, בראַדעוואַקסן, אין פֿריהלינג, בעת די בלעטער זיינען נאָך געלעגן אין די קנאָספּן, האָט א קליינער אינזעקט מיט דינע פֿליגלען דורכגעשטאָכן דעם בלאַט און אַריינגעלייגט אין אים אייעלעך. פֿון די אייעלעך גייען אַרויס קליינע בלינדע לאַרוועס, וואָס שפּייזן זיך מיטן בלאַט; אויפֿן אָרט, וואו א לאַרוו ליגט, ווערט א האַרטער קיילעכדיגער געוואַקס, דער גאַלעפֿעלע; אין האַרבסט ווערט פֿון דעם לאַרוו א פֿאַרטיגער אינזעקט, די שוואַרצע גאַלוועספּ, וואָס ענבערט זיך דורך א לעכל און פֿליהט אַרויס.

דער גאלעפל האָט אין זיך פֿיל גארבוזיערס, וואס איז ביטער ווי גאַל. פראבירט דורכשניידן אזא „עפעלע“ מיט א מעסער, וועט דער מעסער גלייך שווארץ ווערן. אמדי שוואַרצע פֿאַרב איז טינט. פֿון אייזנרָאָסט מיט גארבוזיערס פֿון גאלעפעלעך באקומט זיך טינט.

דער מאַיזשוק, וואָס איז אונז אלעמען אווי גוט באקאנט, מאכט אָן דעם דעמב דעם גרעסטן שאדן. זיינע לאַרוועס צעפֿרעסן אין דער ערד די דינע וואַרצלען, און דער זשוק אליין פֿרעסט אָפּ די בלעמער.

דער הירשזשוק לעבט אויך אויפן דעמב. דאָס איז דער גרעסטער זשוק אין אונזערע לענדער. דער מאַנעלע האָט לאנגע מוילצוואַנגען, ווי הערנער; ביי דער ווייבעלע זיינען די מוילצווענגעלעך קלענער. זיי לייגן זייערע אייער אין שטאם פֿון דעמב. די לאַרוו אנטוויקלט זיך פֿינף יאָר און פֿרעסט די האַלץ. דער זשוק אליין איז שוין ניט אזוי שעדליך, ער שפּייזט זיך מיט די זאפּט, וואָס רינט אַרויס פֿון שטאם און פֿון די צווייגן. נאָך שעדליכער זיינען אַפֿולע קליינע פֿלאַמערלעך, וואָס לייגן זייערע אייער אויפֿן דעמב; פֿון די אייער קומען אַרויס טויזנטער רויפֿן. וואָס פֿרעסן אָפּ גאָר די בלעטער, און מאַכן אים נאָקעט אינמיטן זומער. נאָך געפֿערליכער פֿאַר אלע איבעריגע איז אָבער אַ קליינער גרויער פֿלאַמערל. דער „סאַלדאַמנ-שפּינער“, זיינע האַריגע רויפֿן ליגן באהאלטן אזויווי אין אַ שפּינגעוועבס, זיי פֿאַרמערן זיך מוראדיג ניד. אינאַונט קריכן זיי אַרויס און קלעטערן.



דער הירשזשוק.

ווי סאָלדאמן, איינע נאָך דער אנרערער צום שפיץ פֿון בוים און פרעסן די בלעטער.

דער באטייט פֿון די בלעטער פֿאר די געוויקסן.

ווען אינועקטן פֿרעסן אינגאנצן אָפּ די בלעטער פֿון א בוים, מוז דער בוים פֿאַרדאַרן. אין הארבסט, בעת די בלעטער פֿאלן אראָפּ פֿון די בויםער, הערן די בויםער אויף צו וואקסן, זייער לעבן שמעלט זיך כמעט ווי אינגאנצן אָפּ.

ווייזט אויס, אז די בלעטער שפילן א גרויסע ראָלע אין דעם לעבן פֿון די געוויקסן.

פֿאַרן אראָפּפֿאלן סוף זומער און אין הארבסט ווערן די בלעטער רייט און געל; געלע בלעטער זיינען שוין טויטע בלעטער; פֿאַרקערט, לעבעדיגע בלעטער זיינען גרין. דער גרינער פֿאַרב פֿון די בלעטער האָט, ווייזט אויס, אויך א גרויסן באטייט.

לאָמיר זיך דערמאָנען, פֿון וועלכע שטאָפּן די פֿלאנצן זיינען אויפגעבויט. פֿון מינעראַלן, וואסער און קוילנשטאָף. די מינעראלישע שטאָפּן און דאָס וואסער ציהען זיי פֿון דער ערד מיט די וואַרצלען; מען האט געקענט מיינען, אז דעם קוילנשטאָף נעמען זיי אויך פֿון דער ערד. אָבער די פרובן, וואָס מען האָט געמאכט מיט פֿאַרשיידענע פֿלאנצן, באווייזן, אז דאָס איז ניט אַזוי. מיר האָבן דאך פֿריהער אויפֿגעהאָדעוועט פֿאַרשיידענע געוויקסן אין וואסער מיט מינעראלישע שטאָפּן, אין וועלכע סאיז קיין קוילנשטאָף ניט געווען. אויב אַזוי, מוז מען זאָגן, אַז די פֿלאנצן נעמען דעם קוילנשטאָף פֿון דער לופֿט און נעמען עס טאקע מיט זייערע גרינע בלעטער. כדי צו זיין זיכער, אז דאָס איז ריכטיג, מוז מען מאכן אַן עקספּערימענט.

דער עקספּערימענט איז ניט קיין גרינגער און פֿאָדערט פֿיל געדולד און פֿאַרזיכטיקייט, ווי אלע פרובן מיט געוויקסן. דער פרוב גיט זיך גוט איין, ווען מען מאכט אים אויף וואסערגעוויקסן. שפעטער וועלן מיר פֿאַרשטיין, פֿאַרוואָס מיר מאכן דעם עקספּערימענט דווקא מיט וואסערגעוויקסן.

בעסער פֿאַר אלץ איז צוגעפֿאַסט דערצו די גלאָדע אָדער די וואסער־פעסט. זי האט לאנגע צווייגן מיט צארטע, כמעט דורכזיכטיגע בלעטעלעך און שוויימט ארום אין שטילע וואסערן.

אזא צווייגעלע לייגט מען אריין אין א גלעזערנע כלי מיט וואסער, מען דעקט עס צו מיט א גלעזערנע לייקע, איבערן רערל פֿון דער לייקע קערט מען איבער א פֿראָבירגלעזל מיט וואסער אַזוי, אז דאָס וואסער זאָל זיך

ניט אויסניסן. (ווי דאָס צו טאָן, דאָס וואסער זאָל זיך ניט אויסניסן, דארפֿט איר אליין פארשטיין). די כלי שמעלט מען ארויף אויף א זוניגן פענסטער. אויף די בלעמעלעך פֿון דער עלאדעע וועלן זיך באַלד באווייזן בלעזעלעך פֿון א גאז. זיי וועלן פערלען אין גלאָז און זיך אויפהייבן אין פראַביר-בלעזל, און אין גלעזל וועט ווערן ווייניגער וואסער. אויב איר וועט האָבן געדולד צו ווארטן עטליכע טעג, וועט איר זיך דערווארטן ביז דאָס גלעזל וועט זיך אינגאנצן פֿון וואסער אויסליידיגן. הויבט אויף פֿאַרויכטיג אונטערן וואסער די גלעזל פֿון לייקע, פארשטאַפט איר מיטן פֿינגער, נאָך בעסער מיט א שטיקל גלאָז, אלץ אָבער אונטערן וואסער; נעמט ארויס די פֿאַר-מאכטע גלעזל פֿון וואסער און שמעקט פֿלינק אריין אין גלעזל א דינעם גליהענדיגן שפענדל אָדער א גליהענדיגע שוועבעלע; דער שפענדל אָדער די שוועבעלע וועט זיך אנצינדן מיט א העלן פייער. דער גאז איז זייער-שטאַף. אים האָט ארויסגעלאָזן פֿון זיך דער געוויקס.

דאָס פערלען פֿון די בלעזעלעך און די אַנזאמלונג פֿון זייערשטאַף אין פראַבירגלעזל קומט פֿאַר לעבעדיגער, בעת מען גיסט צו און כלי וואסער, וואָס האָט אין זיך פֿיל קוילנזויערן גאז.

קוילנזויערער גאז באשטייט פֿון זייערשטאַף און קוילנשטאַף, דאָס גע-וויקס נעמט אריין דעם קוילנזויערן גאז אין זיך אינווייניג. דער גאז צעלייגט זיך אויף זייערשטאַף און קוילנשטאַף. דער זייערשטאַף גייט ארויס, דער קוילנשטאַף בלייבט אין געוויקס; פֿון אַמדעם שטאַף, צוזאמען מיט די איבעריגע, בויען זיך טאקע אויף די געוויקסן.

די בלעטער נעמען אין זיך אריין דעם קוילנזויערן גאז פֿון דער לופֿט דורך די קליינע לעכעלעך (מען רופֿט זיי פֿאַרן); זיי געפֿינען זיך אין די בלעטער, דערהויפֿט פֿון דער אונטערשטער זייט. אויף אזא אופן שאפֿן די בלעטער דעם קוילנשטאַף, דעם וויכטיגסטן בוימאטעריאל, און אין דעם באשטייט זייער גרויסער באשטייט פֿאַרן לעבן פֿון געוויקסן.

פֿאַרוואָס מאכן מיר דעם פֿרוב מיט וואסערגעוויקסן? מיר האָבן געוואַלט זעהן, ווי די בלעטער לאָזן ארויס זייערשטאַף. אין דער לופֿט קען מען קיין גאז ניט זעהן, אין וואסער אָבער זעהן זיך די בלעזעלעך גאנץ דייטליך. ביי בלעטער פֿון געוויקסן, וועלכע לעבן אין דער לופֿט, וואלט אונטערן וואסער דער פראַצעס ניט געקענט פארקומען גאַראַמאל. דערפֿאַר האָבן מיר גענומען א וואסערגעוויקסן.

וועגן דער גרינער פֿארב פֿון די בלעטער.

דער עקספערימענט מיטן אָנזאמלען זויערשטאַף גיט זיך איין נאָר דאן, בעת מיר מאכן אים אויפֿן זון. אינדערפֿינסטער קלייבט זיך קיין זויערשטאַף גיט צוזאמען, ס'קומט גיט פֿאַר קיין צעלייגונג פֿון קוילנזויערן גאז, און דעם געוויקס קומט גיט צו קיין קוילנשטאַף. געוויקסן, וואָס וואקסן אינדערפֿינסטער, האָבן בלייכע געלבליכע בלעטער, זיי ציהען זיך גיך אויס אינדערפֿינסטער, ווינען שוואַך און שטארבן אָפּ, אויב מען זאָל זיי גיט ארויסשטעלן אין דער רעכטער צייט אויפֿן זון. אויפֿן זון ווערן די בלעטער גרין, און דאָס גאנצע געוויקס אנטוויקלט זיך נאָרמאל ווייטער. אין דעם קען זיך יעדער גרינג אליין איבערצייגן. פֿאַרזעצט בעבלעך אָדער אַרבעס אין דריי טעפלעך. איינעם שטעלט אוועק אויפֿן זון; די צוויי איבעריגע אינדערפֿינסטער. זיי וועלן זיך גיך אויסציהען אינדערהיך, אָבער זיי וועלן זיין שוואַך און בלייך. לאָמיר פרובן איינעם פֿון די בלייכע אַרבעס ארויסשטעלן אויפֿן זון און דעם אנדערן לאָזן אינדערפֿינסטער. דאָס געוויקס, וואָס מיר וועלן ארויסשטעלן אויפֿן זון, וועט ווערן גרין און וועט ווייטער גוט וואקסן; דער צווייטער וועט אינגיכן פֿאַרדארט ווערן.

אזויארום זעהען מיר (1) אז די געוויקסן קענען לעבן און וואקסן נאָר אין דער ליכטיקייט, (אין דער ליכטיקייט פֿון דער זון); (2). אויפֿן זון ווערט געשאפֿן אין די בלעטער א גרינער שטאַף (כל אָר אַפֿיל), וואָס איז זעהר וויכטיג פֿאַר די געוויקסן. נאָר גריגע בלעטער אין דער ליכטיקייט צעלייגן דעם קוילנזויערן גאז און שאפֿן קוילנשטאַף פֿאַר דער גאנצן געוויקס. דורך די בלעטער קלייבט צוזאמען יעדער בוים וואַרעמקייט און ליכטיקייט פֿון דער זון. בעת דאָס האַלץ ברענט, גיט עס אוועק צוריק די אָנגעזאמלטע וואַרעמקייט און ליכטיקייט. יעדער בוים האָט אין זייגע האַלץ א קוואַל פֿון ליכטיקייט און וואַרעמקייט.

וואָס אַרבעט זיך אויס פֿון דעם קוילנשטאַף אין די בלעטער.

בעת מיר הערן וועגן קוילנשטאַף, שטעלן מיר זיך גלייך פֿאַר שוואַרצע קויל. אין די לעבעדיגע פֿלאנצן איז דער קוילנשטאַף פֿאַראייניגט מיט אנדערע שטאַפֿן און האָט אויסערליך קיין שום ענליכקייט גיט מיט שוואַרצע קויל. פֿון דעם קוילנשטאַף אַרבעט זיך אויס אין די געוויקסן קראַכמעל (זעהר פֿיל קראַכמעל איז צ. ב. דאָ אין קארטאָפֿל). צוקער אַרבעט זיך אויך אויס אין געוויקסן; אפֿולע צוקער איז דאָ אין ווייסע בוריקעס, מערן, יאָגדעס, בערגעס און אנדערע. אין אנדערע געוויקסן אַרבעטן זיך אויס פֿון דעם

קוילנשטאָף פֿארשיידענע מינים פֿעמסן. פֿיל פֿעמס איז דאָ אין די קערנער פֿון וונבלומען (סעמעטשקעס), אין גיס, אין די זאָמען פֿון פֿלאַקס, און אין אנדערע. ס׳וואַלט אָבער געווען אינטערעסאַנט צו זעהן, אויב אין א לעבעדיגן בלאַט שאַפֿט זיך קראַכמעל. מיטן אויג קען מען די קראַכמעל ניט זעהן. ס׳איז אָבער דאָ אַ מיטל זיך אין דעם צו איבערצייגן. ווען מען באַשפּריצט קראַכמעל מיט עטליכע טראַפּנס יאָד, ווערט די קראַכמעל בלוי. (יאָד איז אייך געוויס באַקאַנט, מען באַקומט עס אין אַפּטייק). פֿאַר אונזער פֿרוב איז גוט זיך צו באַנוצן מיט יאָד, צעלאָזענע אין עטער. אויב מיר זאָלן נעמען אַ בלאַט פֿון אַ נאַסטורציע און באַשפּריצן זיין אונטערשטע זייט מיט עטליכע טראַפּנס יאָד, וועט זיך דער בלאַט פֿאַרפֿאַרבן טונקלבלוי, כמעט שוואַרץ.

אויב מען זאָל באַשפּריצן דעם בלאַט אינדערפֿריה פֿאַרן זונאוּפֿגאַנג, אָדער נאַכדעם ווי מיר האָבן די פֿלאַנצונג געהאַלטן אַ צייט אינדערפֿינסטער, וועט זיך דער בלאַט ניט פֿאַרפֿאַרבן; די קראַכמעל שאַפֿט זיך אין בלאַט נאָר אין דער ליכטיקייט.

אויב מען זאָל מאַכן די יאָדפֿראַכע מיט דעמועלביגן בלאַט בייטאַג און אויפֿמאַרן אינדערפֿריה פֿאַרן זונאוּפֿגאַנג, וועלן מיר בייטאַג געפֿינען קראַכמעל און באַגינען ניט. נאָר די אָדערן פֿון בלאַט וועלן זיך לייכט פֿאַרפֿאַרבן. די קראַכמעל שאַפֿט זיך אין די בלעטער, בלייבט אָבער ניט אין זיי און גייט אַראָפּ דורך די אָדערן (די רערן) אין די איבעריגע טיילן פֿון דעם געוויקס.

געוויקסן עטעמען.

דער מענש און די תיות עטעמען, ד. ה. אז פֿון דער אַריינגעטעמעטער לופֿט נוצן זיי אויס דעם זויערשטאָף און עטעמען אַרויס לופֿט, וואָס אין איר געפֿינט זיך אַפֿולע קוילנזויערער גאַז. אָהן דעם זויערשטאָף קענען זיי ניט לעבן; פֿאַרקערט, דער קוילנזויערער גאַז איז פֿאַר זיי שעדליך. ביי די געדוויקסן איז דאָס אנדערס. דער קוילנזויערער גאַז איז פֿאַר זיי ניט שעדליך, נאָכמער, ער איז פֿאַר זיי נויטיג, ווייל זיי באַקומען פֿון אים זייער וויכטיגסטע שפּייז: דעם קוילנשטאָף. אָבער אין דערזעלביגער צייט נויטיגן זיי זיך אויך אין זויערשטאָף, פֿונקט ווי אלע לעבעדיגע באַשעפֿענישן. דאָס קען מען באַווייזן דורך אַ פֿרוב.

נעמט אַ וואַזאַנטפֿעל מיט אַ געוויקס, שמעלט אים אַריין אין אַ גרעסערער גלעזערנער כּלי, פֿאַרמאַכט גוט, עס זאָל ניט צוקומען קיין פֿרישע לופֿט, און שמעלט עס אוועק אין אַ גאָר פֿינסטערן אַרט. אין 24 שעה אַרום פֿראָכירט

אראָפּלאָזן אין דער כלי א ברענענדיגן שפענדל, ער וועט פֿארלאָשן ווערן. אין דער כלי האָט זיך אָנגעזאמלט קוילנוויערער גאז, וואָס דער געוויקס האָט ארויסגעטעמט.

אין דער ליכטיקייט קען מען דאָס ניט באמערקן. די געוויקסן באקומען מער זויערשטאָף, איידער דער מעגש און די חיות. זיי באקומען דעם לייזן זויערשטאָף, וואָס איז דאָ אין דער לופֿט, און דעם זויערשטאָף, וואָס זיי קריגן ארויס פֿון דעם קוילנוויערן גאז; אויף אזא אופן האָט דער געוויקס מער זויערשטאָף, ווי ער באדארף, און לאָזט דאָס איבעריגע ארויס, ווי מיר האָבן דאָס פֿריהער געזעהן ביי דער גלאָדעץ. צוליבדעם איז אויך ניט קענטיג, אז דער געוויקס עטעמט. אינדערפֿינסטער אבער באקומט ער ניט קיין זויערשטאָף פֿון דעם קוילנוויערן גאז, און דערפֿאַר ווערט קענטיג, ווי ער עטעמט.

דעריבער איז בעסער ארויסצוטראָגן ביינאכט די לעבעדיגע פֿלאנצן פֿון שלאָפֿציער, כדי אין דער לופֿט זאָל זיך ניט אנקלייבן צופֿיל קוילנוויערער גאז.

קענטיג איז דאָס עטעמען אויך ביי די ניטגריגע טיילן פֿון די געוויקסן (דערהויפט בעת דער בליהונג), ווייל זיי צעלייגן ניט קיין קוילנוויערן גאז אפֿילו אין דער ליכטיקייט.

די בלעטער דעמפֿן אויס וואסער.

מיט די ווארצלען ציהען אריין די געוויקסן אפֿולע וואסער פֿון באָדן. דורך די רערן הויבט זיך אויף דאָס וואסער צו די בלעטער; פֿון די זאפטן, וואס דער וואסערשטראָם ברענגט, און דעם קוילנשטאָף ארבעטן זיך אויס פארשידענע בוימאטעריאלן. דאָס איבעריגע וואסער ווערט אינדערלופֿטן אויסגעדעמפֿט. וואָס ווארעמער די לופֿט איז, אלץ גיכער ווערט דאָס וואסער אויסגעדעמפֿט. לאָמיר נעמען צוויי גלייכע פראבירגלעזלעך און אנגיסן זיי מיט וואסער ביז א גלייכער הייד. אין איין גלעזל וועלען מיר אריינשמעלן א לעבעדיגן צווייגל מיט בלעטער; אין עטליכע טעג ארום וועט א טייל וואסער אויסגעדעמפֿט ווערן אין ביידע גלעזלעך, אָבער מער אין דער גלעזל, וואו דאָס צווייגעלע שטייט. דאָס האָבן די בלעטער אויסגעדעמפֿט דאָס איבעריגע וואסער.

וואָס גרעסער און צארטער די בלעטער זיינען, אלץ מער וואסער ווערט אויסגעדעמפֿט. די וואָרצלען טרייבן צו פֿרישע וואסער. גוט איז, ווען די וואָרצלען קענען צושמעלן אזויפֿיל וואסער, וויפֿיל עס ווערט אויסגעדעמפֿט; אויב ניט, ליידט דערפֿון דער געוויקס, ער ווערט אויסגעטריקנט.

די פֿאַרמע און די גרויס פֿון די בלעטער בייט זיך ביי פֿאַרשיידענע געוויקסן. פֿלאַנצן, וואָס וואַקסן אויף אַ פֿייכטן באָדן און אין שאַטן, האָבן גרויסע און צארטע בלעטער, כדי אויסצודעמפֿן דאָס איבעריגע וואַסער. פֿאַרקערט, פֿלאַנצן, וואָס וואַקסן אויף אַ טרוקענעם באָדן, אויף אָפֿענע זוניגע ערטער, האָבן שמאַלע, געשניטענע, אָדער האַרטע, לעדעראַרטיגע בלעטער. ביי אַנדערע געוויקסן זיינען די בלעטער געדיכט באַהאַרט אָדער זיי זיינען אזוי ווי מיט אַ וואַקס באַדעקט. אזוינע בלעטער דעמפֿן אויס ווייניג וואַסער. נאָך ביי אַנדערע געוויקסן, למשל, ביי אַ בעבל, בייטן די בלעטער זייער לאַנג, בעת זיי ווערן שטאַרק באַשיינט פֿון דער זון. די צוויי זייטיגע בלעטער שמעלן זיך ווערטיקאַל, און אויף אזא אַופן פֿאַלן אויף זיי ווייניגער שטראַלן.

(זוכט אויף געוויקסן, ביי וועלכע די בלעטער זיינען געשיצט פֿון אויסדעמפֿונג.)

ווען דאָס וואַסער וואָלט אָבער גאָרניט אויסגעדעמפֿט געוואָרן, וואָלט דאָס ווידער שעדליך געווען פֿאַר די פֿלאַנצן. אויפֿן אָרט פֿון די אויסגע- דעמפֿטע וואַסער קומט אַ נייער שטראָם מיט נייער יניקה, און אויף אזא אַופן שטעלט זיך ניט אַפּ די באַוועגונג און דאָס לעבן.

נאָסע בלעטער דעמפֿן אויס ווייניגער וואַסער. דאָס קען פֿאַרהאַלטן די נויטיגע אויסדעמפֿונג און ווירקן שעדליך אויף די פֿלאַנצן. אויב איר וועט קוקן אויף די פֿלאַנצן מיט אַן אויפֿמערקזאַמע אויג, וועט איר באַמערקן, אז דאָס רעגנוואַסער פֿאַרהאַלט זיך ניט לאַנג אויף די בלעטער; עס רינט אַראָפּ אויף דער ערד צו די וואַרצלען. ביי די גרויסע בלעטערבוימער טריפֿט עס אַראָפּ פֿון די בלעטער צו די דינע זייגוואַרצלען, וואָס געפֿינען זיך אונטער די שפיצן פֿון די ברייטע צווייגן.

קוקט זיך צו צו די בלעטער פֿון פֿאַרשיידענע געוויקסן נאָך אַ רעגן און באַמערקט, ווי און וואו דאָס וואַסער רינט אַראָפּ.

ווי שפייזן זיך די תיות און ווי די געוויקסן?

אַלע תיות פֿון קליין ביז גרויס שפייזן זיך מיט פֿלאַנצן, אָדער מיט די פֿלייש פֿון אַנדערע תיות, וואָס זיינען קלענער אָדער שוואַכער פֿון זיי. אָבער סזיינען ניטא אַזעלכע תיות, וואָס זאָלן זיך שפייזן מיט נאָז, וואָס געפֿינען זיך אין דער לופֿט, אָדער מיט מינעראַלן, וואָס געפֿינען זיך אין דער ערד. מיט איין וואָרט, היות קענען זיך שפייזן נאָר מיט לעבעדיגע באַ- שעפֿענישן, אזוינע ווי זיי אליין. די געוויקסן אָבער נעמען זייער שפייזן פֿון

דער לופט און פֿון דער ערד, זיי שפייזן זיך מיט גאזן און מינעראלן. פֿון די גאזן און מינעראלן ווערן אין די פֿלאנצן אויסגעארבעט נייע שמאָפֿן, וואס מיט זיי קענען זיך שוין שפייזן אלע איבעריגע לעבעדיגע באשעפֿענישן. איצט איז שוין גרינג צו פֿארשטיין, אז די געוויקסן ארבעטן אויס שפייז פֿאר אלע חיות; און אויב סױוואָלסן ניט געווען קיין פֿלאנצן, וואָלסן אויך קיין חיות ניט געקענט זיין. די פֿלאנצן און די חיות הייסן "די אָרגאַנישע וועלט", די מינעראלן און די גאזן—די "ניט אָרגאַנישע", די חיות געפֿינען שפייז נאָר אין דער אָרגאַנישער וועלט, די פֿלאנצן בויען איבער די ניטאָרגאַנישע וועלט, און שאפֿן פֿון ניטאָרגאַנישע שמאָפֿן — אָרגאַנישע.

דאָס לעבן פֿון די בלעטערבויער אין וואלד.

מיר האָבן זיך געהענטער באקענט מיט א גוסבוים אן אָלבע, א בערי-אָוע, א הושענא, א דעמב. פֿון ערשטן בליק ווארפֿט זיך אין די אויגן, מיט וואָס זיי אונטערשיידן זיך אייגע פֿון די אנדערע. לאמיר איצטער זעהן, אין וואָס זיי זייגען ענליך אייגע צו די אנדערע. זיי האָבן אלע א האַלציגן שטאם. אויף א גלאט אָפגעזעגטן שטאם זעהען מיר אינמיטן דאָס האַרץ, ארום און ארום די האַלץ און פֿון אויסן די קאָרע. אין דער האַלץ זייגען דייטליך קענטיג רינגען. וואָס עלטער דער בוים איז, אלץ מער רינגען האָט ער. די רינגען איז גרינג צו אונטערשיידן, ווייל די זומעררינגען זייגען העל און די האַרבסטרינגען טונקל. אין דער ערד האָבן די בויער מעכטיגע וואָרצלען, וואָס זייגען צעצווייגט אין דער טיף און אין דער ברייט. די בלעטער זייגען גרין נאָר זומער, אין האַרבסט ווערן זיי געל און פֿאלן אראָפֿ פֿון בוים. די וואָרצלען הערן אויף צו ציהען זאפֿט פֿון דער ערד און דאָס לעבן שטעלט זיך אָפֿ אויפֿן גאנצן ווינטער. וואַרעמקייט, פֿייכטקייט און ליכטיקייט וועקן ווידער אויף די בויער אין פֿרייהלינג צום לעבן. פֿון די וואָרצלען הויבט זיך די זאפֿט הורף די פֿעדימערן פֿון שטאם, עס עפֿענען זיך די קנאָספֿן און ברייטן זיך אויס די בלעטער. דאן הייבט זיך אָן אַ ענערגישע ארבעט. צוויי שטראָמען באוועגן זיך אין בוים פֿונאַונטן אויפֿ-אויבן (פֿון די וואָרצלען צו די בלעטער) און פֿונאויבן אויפֿאונטן (פֿון די בלעטער צו די וואָרצלען). אין פֿרייהלינג איז באַזונדערס שטארק דער ערשטער שטראָם, דער בוים בוים זייגע נייע בלעטער. דאן קען מען צאפֿן

זאפט פֿון דעם שטאם פֿון א בעריאזע, און עס גיסן זיך "טרערן", פֿון אָפּנע- האקטע בוימער. שפעטער ווערט דער שטראָם שטילער, און די ארבעט גייט גלייכמעסיגער.

די בלעטער צעלייגן אויפֿן זון דעם קוילנוויערן גאז, דער קוילנשטאָף פֿאַראייניגט זיך מיט די צעלאָזענע מינעראלישע שטאָפֿן, און עס שאַפֿן זיך ווידער נייע שטאָפֿן, ווי קראַכמעל, צוקער און אנדערע; די נייע שטאָפֿן לאָזן זיך אַראָפּ פֿון די בלעטער אין שטאם אריין און צעטראָגן זיך איבערן גאַנצן בוים, און עס בויען זיך נייע טיילן. דער שטאם ווערט גרעכער.

מיר האבן שוין געזעהן, אז דער אונטערשמער שטראָם גייט דורך די רערן פֿון די יונגע האַלצרינגען. דורכוואגען אָבער גייט דער אויבערשמער שטראָם? ער גייט דורך די רערן פֿון דעם אינווייניגסטן טייל פֿון דער קאָרע — דורך דעם לוב אָדער באַס. אין דעם קען מען זיך איבער- צייגן דורך א פֿרוב, וואָס דארף לאנג געדויערן, ווי אלע פֿרובן מיט פֿלאנצן.

אויף א צווייט פֿון א טאָפּאַל, בעריאָזע אָדער אן אנדער בוים שניידט מען אויס ארום און ארום א רינג קאָרע מיט לוב, אָדער מען שנירט דעם צווייט שטיף ארום. דער צווייט ווערט גרעכער אין דעם אָרט, וואָס געפֿינט זיך איבערן רינג; דאָס קלייבן זיך דאָ אן די שטאָפֿן, וואָס האָבן ניט קיין וועג זיך אַראָפּצולאָזן נידעריגער.

ווען מען מאכט דעמועלביגן פֿרוב מיט א צווייט פֿון א הושענא, באווייזן זיך אפֿילו ווארצלען איבערן רינג.

אלע בלעטערבוימער גויטיגן זיך אין פֿיל ליכטיקייט, ווייל נאָר אין ליכטיקייט קען ווערן אויפֿגעבויט זייער מעכטיגער גוף. זייערע ברייטע בלעטער דעמפֿן אויס פֿיל וואסער, דערפֿאַר גויטיגן זיי זיך אויך אין א פֿייכטן באָדן. כמעט אלע וואלדבוימער זיינען פֿריהבליהער. זיי האָבן ניט קיין קענטיגע איינגעשלעכטיגע בלומען; די מעגליכע בלומען זיינען זעהר רייך מיט שטויב. דער ווינט איז דער באשטויבער. דאָס גאָהענטע צוזאמענוואקסן העלפט מיט דער באשטויבונג.

וועלכע בוימער האָבן אַ צווייגעשלעכטיגע בליהונג? וועלכע ווערן באשטויבט דורך אינועקטן? מיט וואָס ציהט צו די ליפע די אינועקטן? מיט וואָס די הושענא?

די פֿרוכט ווערט אויך כמעט ביי אלע וואלדבוימער פֿארשפרייט דורכן ווינט. אויב ניט וואָלט די זאָט אומגעקומען אין דער גרויסער ענגשאפט.

מיט וואָס איז די זאָט פֿון דער הושענא, פֿון דער בעריאָזע, פֿון דער ליפע צוגעפּאַסט צו פֿליהען אינגערלעכטן?

וועגן דעם צוזאמענלעבן פֿון די געוויקסן אין וואלד.

די בלעטערבוימער זיינען ענליך איינער צו דעם אנדערן און גויסן זיך אין זייערע לעבנבאדינגונגען, דערפֿאר וואקסן זיי אויך אזוי אָפֿט אלע צוזאמען.

וואקסנדיג צוזאמען, שאפֿן זיי גיכער די באדינגונגען, וואָס זיינען זיי גויסיג. ערשטנס, ווערן זיי דערפֿאר גיכער באשטויבט און גיבן מער פֿרוכט; צווייטנס, שאפֿן זיי א וואנט, וואָס פֿארשטעלט זיי און שיצט פֿון שטארקע ווינטן. דערהויפֿט איז דאָס וויכטיג פֿאר בוימלעך, וואָס זיינען נאָך צו שוואַך, כדי בייצושטיין א גרויסן שטורעמווינט; דריטנס, פֿארשטעלן זיי מיט זייערע געדיכטע קרוינען דעם באָדן פֿון דער זון, ער ווערט צוליבדעם ניט אזוי גיך אויסגעטריקנט, ווי דאָס אָפֿענע פֿעלד; און דער וואלד גויסטיג זיך דאָך אזוי אין פֿייכטקייט.

מיר זעהען, אז אין וואלד איז דאָס לעבן פֿון אימלעכן איינציגן בוים ענג פֿארבונדן און אָפֿעהנגיג פֿון דעם לעבן פֿון אלע איבעריגע. דער וואלד איז א גאנצע לעבנגעמיינשאַפֿט. דאָ לעבן צוזאמען אפֿולע גלידער; די בוימער זיינען די שטארקסטע, אָבער גיט די איינציגע. אין וואלד זיינען דאָ נאָך אנדערע געוויקסן, גרויסע און קליינע. חיות, פֿויגל און אינוועקטן שפּילן אויך א גרויסע ראָלע אין דעם אלגעמיינעם לעבן פֿון וואלד.

די בוימער באהערשן דעם געביט. זייערע גרויסע וואָרצלען פֿארנעמען דעם גרעסטן טייל פֿון וואלדבאָדן, זייערע הויכע שטאמען טראָגן ארויס די בלעטער צו דער זון. מיט זייערע לעבנדיגע בלעטער מאכן די בוימער פֿרוכפֿערדיג דעם באָדן. וויאזוי?

אין וואלד איז בייטאג די לופֿט קילער, ווי אויפֿן פֿעלד. דערפֿאר אָבער ווערט זי ניט אזוי גיך אפֿגעקילט אינאָונט; צוליבדעם איז די גאנצע טעמפעראטור גלייכמעסיגער, און די פֿלאנצן ליידן ניט אזויפיל פֿון אן אומגערעכטן איבערגאנג פֿון ווארעמקייט צו קעלט.

א פֿרוכפֿערדיגער באָדן מיט אפֿולע פֿוילעכין, פֿייכטקייט און שוין פֿון גרויסע ווינטן און קעלט, דאָס זיינען אליץ גומע באדינגונגען פֿאר אלע פֿלאנצן, אָבער די הויכע בוימער פֿארשטעלן די ליכטיקייט, דערפֿאר ווענדט זיך דאס לעבן פֿון אלע איבעריגע פֿלאנצן אָן דער געדיכטעניש פֿון וואלד. אין געדיכטע שאַטנדיגע וועלדער איז דאָ ווייניג קליינע געוויקסן, שימערע ליכטיגע וועלדער (דעמבאָוע למשל) זיינען רייך מיט אונטערוואלד-פֿלאנצן.

אין ליכטיגע וועלדער זעהען מיר אזוי ווי דריי עטאזשן: גרויסע בוימער, אונטער זיי גייעריגע בוימלעך און קוסטעס, ווי למשל: דער נוסבוים, און

נאך גידעריגער אין אונטערסטען עטאזש — גרעזער און יאגדעס, און אין שאטן — מאך און שוועמלעך.

די קליינע געוויקסן אין וואלד זיינען פֿארוואַרנט מיט שפייו און פֿייכטקייט, האָבן אָבער ווייניג ליכטיקייט. צופֿאסנדיג זיך צום לעבן אין שאַטן, אנטױקלען זיי גרויסע און דינע בלעטער. אויף אזא ברייטן בלאט וועט גיכער ארויפֿפֿאלן א שטראל. דורך אזא גרויסן און דינעם בלאט וועט אויך גיכער אויסגעדעמפֿט ווערן דאָס איבעריגע וואסער. פרובט אָפֿרייסן אוויגע געוויקסן, און איר וועט זעהן, ווי גיך זיי וועלן פֿארטריקנט ווערן אויפֿן זון.

אנדערע פֿון די געוויקסן אילן זיך אָפֿצובליהען פֿריה, איידער די גרויסע בוימער לאָזן נאָך פֿונאנדער זייערע בלעטער. דאן געניסן זיי גענוג שטראלן פֿון דער זון. דערמאָנט זיך וועגן דער פֿיאלקע, דער ווינטרויזעלע, דעם ערסטלינג (די שליסלבלום) און אנדערע פֿריהיגע בלומען. לאָמיר זיך באקענען מיט עטליכע שאַטנגעוויקסן פֿון וואלד.

די מאיבלום אָדער דער מאיגלעקל.

דער מאיגלעקל איז א שמענדיגער איינוואוינער פֿון שאַטנדיגע פֿייכטע וועלדער. זיין נאָמען ווייזט שוין אָן די צייט פֿון זיין בליהונג. אין דער ערד האָט די מאיבלום א לאנגן ווייסליכן וואַרצלשטאם מיט שופיגע בלעמעלעך. דער וואַרצלשטאם צעצווייגט זיך, ער לאָזט ארויס לאנגע אָפֿלויפֿער מיט גרויסע פֿארשפיצטע קנאָספֿן. מיטן שפיין שפֿארט דורך די קנאָספֿ אין פֿריהלינג די ערד און באווייזט זיך אויף דער ווייסער וועלט. פֿון קנאָספֿ אנטוויקלען זיך צוויי אָדער דריי גרויסע האַרמע בלעטער. די יונגע בלעטער זיינען פֿארדעקט די ערשטע צייט מיט קליינע רויטליכע שונצלעטער. די גרויסע בלעטער זיינען צוואמעגעדרייט ווי טוטלען, איין בלאט כאפט ארום מיט זיין שמיל דעם אנדערן. שפעטער באווייזט זיך דער בלומענשטיל מיט ווייסע שמעקעדיגע גלעקעלעך.

די פֿרוכט איז א רויטע יאגדע. די יאגדע און אלע איבעריגע טיילן פֿון געוויקס זיינען גיפֿטיג.

די שיינע שמעקעדיגע בלומען זיינען זעהר באליבט און אלעמען נוס באקאנט. אין גרויסע שמעט פֿארקויפֿט מען אין מאי אויף די נאסן בוקעטן מאיגלעקעלעך. זעהט אָבער אליין צו געפֿינען אין וואלד דעם מאיגלעקל און פרובט זיך אליין ענטפֿערן אויף אויגע פֿראגן: וואָספֿאַר א באַטייט קענען האָבן פֿארן מאיגלעקל זיינע גרויסע בלעטער? פֿאַרוואָס קען דער מאיגלעקל אזוי פֿריה בליהען? ווי קומט דאָס, אז די מאיבלומען וואקסן ניט איינציגווייז, נאָר אפֿולע צוואמען? ווי קען מען זיך איבערצייגן, אז זיי זיינען פֿאַרבונדן איינע מיט דער אנדערער. צו איז דער מאיגלעקל אן איינציגער געוויקס, אָדער א פֿיליאַריגער? באטראכט אויפֿמערקֿ

ואם די בלום? פֿון וועלכע טיילן באשטייט זי? וואָספֿאַר א באטייט קען האָבן פֿאַר די בלום דער וואונדערליכער ריח? ווי ווערן באשטויבט די בלומען?

די פֿאָזעמקע.

ווער האָט ניט געקליבן קיין פֿאָזעמקעס אין וואלד? אויב איר האָט דאָס פֿיל מאָל געטאָן, האָט איר, קען זיין, באמערקט, אז די פֿאָזעמקע האָט ליב זונענשיין. און גיכער ווי אומעמוס געפֿינט מען זי אויפֿן ראנד פֿון וואלד. זי בליהט סוף אפריל און אין מאי. מיר דערקענען גלייך אירע ווייסע בלימעלעך מיט א געלן קנעפעלעע איגמיטן. זי האָט אין דער ערד א וואָרצלשטאם, וואָס לאָזט ארויס אויף דער ערד א בינטל שיינע, דרייאַיגע, געצייגטע בלעטער. אין בוים פֿון די בלעטער וואקסן אויס לאנגע פֿעדים, אָפּלויפֿער, מיט א



די פֿאָזעמקע.

פֿון „קרעפלעין, לייטס. פֿ. ד. באָטאַנ. אונטערריכט.“ פֿאַרלאַ: B. G. Teubner אין לייפּציג.


קנאָספּ אויפֿן שפיץ; די אָפּלויפֿער וואקסן אינדערלענג, לינגדיג אויף דער ערד; פֿון קנאָספּ אנטוויקלט זיך א ראָזעטקע בלעטער און דערנאָך וואָרצלען; דער נייער געוויקס פֿאַרעכטטיגט זיך אין דער ערד און הייבט אָן צו לעבן זעלבשטענדיג, און דער אָפּלויפֿער שטאַרבט אָפּ. אויפֿן אנדערן זומער וועט די נייע פֿאָזעמקע בליהען און געבן פֿרוכט.

יעדע פאָזעמקע לאָזט ארויס פֿון זיך 5 ביז 10 אפּלויפֿער א זומער. אזוי וואקסט אויס א גאנצע קאָלאָניע פאָזעמקעס. איר וועט זעלמן טרעפֿן אַן איינציגע פאָזעמקע.

לאָמיר זיך ווידער אומקערן צו דער בלום. זי האָט אפּולע שטויבפֿעדים און פעסטלעך, זיי זיצן דאָס אויפֿן קנעפעלע אינמיטן בלום. דאָס איז דער פֿרוכטבאָדן אָדער דער פֿרוכטגעזעס. די ווייסע בלעמעלעך פֿון קרענצל פֿאלן אראָפּ, די גרינע שיסעלע בלייבט. פֿון די פעסטלעך ווערן קליינע געלע קערנדלעך-ניסעלעך, וועלכע זיצן אויפֿן אויסגעוואקסענעם זאָפּמינן פֿרוכטגעזעס. דאָס, וואָס מיר רופֿן אָן די יאגדע, איז איינגטליך דער פֿונאגדערנעוואקסענער פֿרוכטגעזעס. די אמתע פֿרוכט זיינען די קערנדלעך. אויף דער געשמאקער שמעקעדיגער יאגדע זיינען דא פֿיל בעלנים — דער מענש און די פֿויגלעך. די פֿויגלעך העלפֿן דערביי דער פאָזעמקע זיך פֿארשפּרייטן. זיי עסן אויף די געשמאקע יאגדע, פֿארדייען אָבער ניט די קערנדלעך (די אמתע פֿרוכט), ווארפֿן זיי ארויס און פֿארזייען אזויארום די פאָזעמקע.

די גרעסטע ראָלע אין דער פֿארמערונג פֿון דער פאָזעמקע שפּילן אָבער די אָפּלויפֿער.

ווי מיינט איר, פֿונאוואנען נעמט זיך דער גאמען פאָזעמקע, ערדיאגדע? צו האָט איר געווען, ווי עס וואקסן טרעסקאפֿקעס? צו דערקענט איר אין זיי די באשיידענע וואלדפאָזעמקע? אין וואָס איז דער אונטערשייד? מערקט זיך אויפֿן ביישפּיל פֿון דער פאָזעמקע די אינטערעסאנטע דערשיינונג אין לעבן פֿון די געוויקסן. זיי פֿערמערן זיך אויף עטליכע אויפֿנים: דורך פֿרוכט (דאָס איז די געשלעכטליכע פֿארמערונג), דורך אפּלויפֿער, דורך די צווייגן און קנאָספֿן פֿון ווארצלשמאָס (ביי דעם מאינגעל); דורך אָפּזעצער (מען זעצט אריין אין דער ערד יונגע צוויי געלעך), דורכן צוואוקס פֿון די וואָרצלען (ווען מען האקט אָפּ דעם שטאם). דאָס איז גוט קענטיג ביי א ליפע.



די מאליונע.

(a) די בליהונג אין לענגשניט

(b) די פֿרוכט אין לענגשניט

פֿון קרעפעלין „ליטפֿ. פֿ. ד. באַטאַנ. אונטערריכט“ פֿאַרלאַג B. G. Teubner אין ליפּציג.


די מאליונע.

מאלינעס וואקסן אין פֿייכטעוועלדער אויף נירעריגע קוסמעס. די יונגע צווייגן זיינען באזעצט מיט קליינע שמעכ־לקעס. די בלעטער זיינען צונויפֿגעשמעלט פֿון עטליכע קלענערע. זיי האבן די פֿאַרמע פֿון אן איי, ביי די ברענעס

זיינען זיי געצייגט, דער ווייכער בלאטפלאך איז געקנייטשט צווישן די אָדערן, פֿונאונטן איז ער ווי מיט א ווייסן פֿילץ באַדעקט.
די מאלינע בליהט אין יון מיט קליינע ווייסע בלומען. די פֿרוכט באשטייט פֿון אפֿולע קליינע זאפֿטיגע יאגדעלעך מיט א הארטן קערנדל אין יעדער פֿון זיי. אזוי ווי ביי דער פֿאָזעמקע, העלפֿן דאָ די פֿויגלעך פֿאַר שפּרייטן דעם געוויקס, ווייל זיי ווארפֿן ארויס די האַרטע קערנדלעך.
פֿון מאלינעס מאכט מען די געשמאקסטע איינגעמאכטסן און זאפֿטן. מען באנוצט זיי אויך ווי א רפואה קעגן פֿאַרקילונג.

ברוקנעס און שווארצע יאגדעס.

ברוקנעס און שווארצע יאגדעס זיינען אויך מיטגלידער פֿון דער גרויסער לעבננעמיינשאפֿט, דעם וואלד. אָפֿטמאָל וואקסן זיי נאָהענט איינע לעבן די אנדערע. זיי וואקסן זיך געדיכט פֿונאנדער אין ליכטיגע וועלדער. ביידע געוויקסן זיינען קליינע קוסטעס. די ברוקנע איז פֿאַר אונז שוין דער מיט אינטערעסאנט, וואָס זי איז כמעט דער איינציגער בלעטערגעוויקס אין אונזערע לענדער, וועלכער פֿאַרלירט ניט אום ווינטער זיינע גרינע בלעטער; פֿרוכט אָפֿשארן דעם שניי, וועט איר געפֿינען די ברוקנע מיט אירע קליינע הארטע און גלאנציגע בלעטער. זיי זיינען אזוי ווי מיט לאַק באַדעקט. אזא



שווארצע יאגדע

ברוקנע

פֿון „קענעלינס לייטס. פֿ. ד. ביאָלאָג. אינטערריכט“ פֿאַרל. B. G. Teubner אין לייפּציג.

בלאט דעמפֿט אויס ווייניג וואסער און קען אויסשטיין דעם גרעסטן פֿראַסמ. אַמדי רויטע יאגדע איז אייך געוויס גוט באקאנט.

די שווארצע יאגדע האָט דינע בלעטער, זי פֿאַרלירט זיי אין האַרבסט. דער דינער שטאם איז גרין און ניט אָפֿלויפֿער. זי גווייניג זיך אין פֿייכט קייט. די צווייגלעך און דער שטאם האבן קליינע רינגעס, וואָס דורך זיי רינט אַראָפֿ די רענגוואסער פֿון די בלעטער צום וואָרצל. ביידע געוויקסן בליהען אין מאי, און די בלומען האָבן די פֿאַרמע פֿון ראָזליכע גלעקעלעך.

אפֿולע וואַלדפֿויגל שפּיין זיך מיט די געשמאקע יאגדעס און העלפֿן זיי פֿאַרשפּרייטן (וויאזוי?). דער מעגש איז אויך א גרויסער בעלן אויף די יאגדעס.

דא זיינען אָנגעוויזן גאָר ווייניג געוויקסן, וועלכע וואקסן אין שאַמן פֿון וואַלד. זייער צאָל איז אָבער זעהר גרויס און איז ניט גלייך אין יעדער געגנט.

וועלכע געוויקסן איז אייך אויסגעקומען אָנצוטערעפֿן אין די וועלדער פֿון אייער געגנט? צו זיינען דאָס געווען בוימלעך, קוסטעס, אָדער גראַזיגע געוויקסן? איר האָט אפשר באַמערקט וועלכענישאיז אינטערעסאנטע דערשיינונגען אין זייער לעבן: אין דעם שטייגער, וויאזוי זיי פֿאַרמערן זיך, באַשטייבן זיך, פֿאַרהיטן זיך פֿון איבעריגע פֿייכטקייט און ציהען זיך צו דער זון? די נאטור איז אזוי רייך און פֿאַרשידן אין יעדער לאַנד, אז יעדער אויפֿמערקזאָמער באַאָבאַכטער קען באַמערקן א נייע און אינטערעסאנטע דערשיינונג און דורכדעם רייכער מאַכן דעם אוצר פֿון מענשליכן וויסן.

אין נאָדלוואַלד.

די סאָסנע.

שמיל איז אין א סאָסנאָון וואַלד, און ווייך טרעט דער פֿוס אויף די אַראָפֿגעפֿאַלענע נאָדלען, אויפֿן גרינגעס מאַך. די אלטע סאָסנעס שטייען, ווי גלייכע, ריזיגע זיילן; זייער קאָרע איז רויטליכברוין, אויפֿן אונטערשטן טייל פֿון שטאם איז זי טונקל, האַרט, צעפֿלאַצט, שופּיג. אויבן איז זי העל, און עס שײַלן זיך פֿון איר אָפֿ דינע רויטליכע הייטעלעך. די צווייגן זיינען שטאַרק און הויך. ערגעץ ווייט און הויך אויפֿן בלויען הימל זעהט זיך זייער שיינער געפֿלעכט. בעת א ווינט, וויגן זיך שמיל די הויכע זיילן, אָבער די סאָסנע שטייט פֿעסט, דער גרעסטער שטורעמווינט קען זי ניט אנידערוואַרפֿן. מיף אין אונטערגרונט אַנקערט זיך איין איר לאַנגער הויפטוואַרצל און ברייט

פֿארשפרייט זי ארום זיך אין באָרן די גרויסע צאָל וויטיגע וואָרצלען, שטארקע און גראַבע, ווי קאָנאָטן.

אויף ווי האַלט זיך דער מעכטיגער בוים, ער דערגרייכט ביז 30—40 מעטער אין דער הויך, ביז 3—4 מעטער אין אַרומגעס.


אנשטאָט בלעטער האָט די סאָסנע לאַנגע, האַרע, גרינע נאָדלען. ווי זיצן פֿאַרווייז אויף די צווייגן און לעבן 2—3 יאר. די אלטע נאָדלען פֿאלן אַראָפּ ביסלעכווייז דעם נאַנצן יאָר, ניט נאָר אין האַרבסט, ווי ביי די בלעטערבויםער. דערפֿאַר איז די סאָסנע אייביג גרין. אירע נאָדלען זיינען באַדעקט מיט אַ האַרער הייטל און שטאַרבן ניט אָפּ פֿון קעלט אין די גרעסטע פֿרעסט. אלע פֿריהלינג באַנייט זיך די סאָסנע מיט פֿרישע נאָדלען, ווי אַנטוויקלען זיך אויפֿן שפיץ פֿון אירע צווייגן. די יונגע נאָדלען זיינען פֿונאַנדהייב באַדעקט מיט דינע ברוינליכע שופן און מיט זילבערווייסע בלעטלעך. אזוי ווי ווייסע ליכטלעך, ווייזן אויס די שפּראַצן אויף די צווייגן אין פֿריהלינג. שפּעטער פֿאלן די שופן און די שוצבלעטער אַראָפּ.

אין אַ סאָסנאָווין וואַלד פֿילט זיך אַלעמאָל אַ באַזונדערער געשמאַקער און שטאַרקער ריח, אַ סאָסנעריח. דער שטאַם און די נאָדלען זיינען רייך מיט קלאָרע קלעפּיגע פֿער, וואָס רינט אַרויס דורך די קלענסטע שפּעלטלעך אין קאָרע. די טראָפּנס האַלטן זיך אויפֿן שטאַם און אויף די צווייגן, ווי פֿאַרגליווערטע טרערן.

אויף דער ערד אונטער די בויםער וואַלדערן זיך קליינע ברוינע סעסקעס מיט האַלציגע שופן. דאָס איז די פֿרוכט פֿון דער סאָסנע. אין בוים פֿון איטלעכן שופּ ליגן צוויי זאָמען, יעדער מיט אַ דינעם פֿליגל אָדער זעגל. פֿון דעם קליינעם קערנדל וואַקסט דאָס אויס דער מעכטיגער בוים.

אַ סאָסנע וואַקסט פּאַמעליך, און יונגע בויםער, וואָס האָבן אין דער הויך 3—4 מעטער, זיינען שוין אלט עטליכע צעהנדליג יאָר. אירע צווייגן וואַקסן רינגענווייז אַרום שטאַם, איטלעכן יאָר קומט צו אַ נייער רינג; וויפֿל רינגען, אזויפֿיל יאָר איז אלט די סאָסנע; די אונטערשטע צווייגן זיינען לאַנג, די אויבערשטע קירצער; וואָס העכער די סאָסנע וואַקסט אויס, אַלץ ווייניגער קומט צו די זון צו די אונטערשטע צווייגן, הייבן זיי אָן צו דאַרן, שטאַרבן אָפּ און פֿאלן אַראָפּ פֿון שטאַם. מיטדערצייט בלייבט פֿון די אונטערשטע צווייגן קיין זכר ניט, די סאָסנע ציהט זיך אויס, ווי אַ גלייכער זייל, און די ברייטע קרוין אינדערהייך באַדט זיך אין שיין פֿון דער זון.

סאָסנעס, וועלכע וואַקסן אויפֿן ראַנד פֿון וואַלד אָדער אויפֿן פֿרייען פֿעלד, האָבן אַן אַנדער אויסזעהן. די אונטערשטע צווייגן באַקומען אויך גענוג ליכטיקייט, זיי שטאַרבן ניט אָפּ און ציהען זיך אויס אינדערברייט. (אַפּטמאָל באַמערקט זיך נאָך, אז די צווייגן זיינען גרעסער און מעכטיגער)



די סאָסנע.

פֿון „קרעסעלין, לייטפֿ. פֿ. ד. באַשאַנ. אונטערריכט“, פֿאַרל. B. G. Teubner אין לייפּציג.

אין דרום־זייט. מיט וואָס דערקלערט זיך דאָס?) אזוינע אלטע סאָסנעס, מיט גרעסערע צווייגן צו דרום געווענדט, זיינען וועגווייזער פֿאַר מענשן אין די געדיכטע וועלדער פֿון ווייטן צפון. אין מאי הייבט אָן די סאָסנע צו בליהען. זי האָט אויך צוויי מינים בליהונג, ווייבליכע און מענליכע, ביידע מינים אויף איין בוים. זי איז, הייסט דאָס, איינהויזיג. דער ווינט איז דאָ אויך דער באשטויבער. די בליהונג איז זעהר איינפֿאַך. די שטויבבלומען זיינען צוזאמענגעקליבן אין קליינע סעסקעס. זיי זיינען זעהר רייך מיט שטויב. דער ווינט צעווייט דעם שטויב אין אלע זייטן (אין פֿאַלק זאָגט מען: «עס רעגנט מיט שוועבל») און פֿאַרטראַגט אים אויך אויף די ווייבליכע סעסקעס, די זאָטקנאָספן זיינען גיט באהאלטן אין קיין שויד, זיי ליגן צו צוויי נאקעמע אין בוים פֿון יעדער שופ אין דער סעסקע.

נאָך דער באפֿרוכפֿערונג, פֿאַרקלעפן זיך די שופן פֿון דער סעסקע מיט פעך און פֿאַרמאכן זיך; פֿריהער איז זי גרין און ווייך, דערנאָך ווערט זי בריוון און האַלציג. די זאָט ווערט פֿאַרטיג אויפֿן צווייטן יאָר, אָבער די סעסקע עפֿנט אירע אויסגעטריקנטע שופן אין די ערשטע טעג פֿון פֿריהלינג אויפֿן


דרימן יאָר. דאן שימן זיך ארויס און פֿארזייען זיך די קליינע באפֿליגלטע זאָמען. דער ווינט כאפט זיי אונטער און פֿארטראָגט זיי אין אלע ווייטן; טויזנטער זאָמען קומען אום; אפֿולע צעפיקן פֿויגלעך, עסן אויף וועווערקעס, אָבער נאָך טויזנטער גייען אויף. און אזוי פֿארשפּרייטן זיך סאָסנאווע וועלדער איבער דעם ברייטן פֿלאַך פֿון דער ערד.

די סאָסנע באגענונגט זיך מיטן אָרעמסטן באָדן, זיי פֿארשפּרייט זיך אפֿילו אויף א שייטיגן זאמד. דערמאָנט זיך וועגן אירע וואָרצלען, וועט איר פֿארשטיין, וויאזוי זיי קען זיך האלטן אין אַזא באָדן. אירע נאָדלען דעמפֿן אויס ווייניג וואסער און פֿארהאלטן גיט קיין רעגנטראָפנס, וועלכע טריפֿן אראָפֿ אויף דער ערד צו די וויגוואָרצלען. די נאָדלען, וואָס פֿאלן אראָפֿ פֿון די בוימער, ווערן צעפֿוילט און שאפֿן הומוס; אזוי מיסטיגט דער סאָסנאווער וואלד אליין דעם באָדן און מאכט אים פֿרוכפֿערדיג.

א יונגער סאָסנאווער וואלד איז אזוי געדיכט און ציהט פֿון באָדן אזוי־פֿיל יניקה, אז קיין אנדערע פֿלאנצן קענען דאָ גיט וואקסן. שפעטער, אז דער וואלד ווערט עלטער, ווערט ער שימערער, א טייל בוימער שטארבט אָפֿ אין דער ענגשאפט, און דעמאָלט הייבט זיך אָן א גייער לעבן. אויף דער ערד באווייזט זיך גראָו, מאָך; עס וואקסן אויס קוסמעס און גידעריגע בוימער, א נוסכיים, אָן אסינע און אנדערע. פֿריהער באווייזן זיי זיך אויפֿן ראנד פֿון וואלד, דערנאָך פֿארקלייבן זיי זיך טיפֿער, און צוזאמען מיט זיי פֿארשפּרייטן זיך אלערליי געוויקסן, וואָס וואקסן אין שאַטן.

די סאָסנע האָט פֿארן מענשן דעם גרעסטן באַטייט. פֿון אירע הויכע שטאמען מאכט מען מאסטן אויף שיפֿן. סאָסנע האלץ איז אויך אן אויס־געצייכנטער מאטעריאל פֿאר מעבל, צום הייצן און בויען. פֿון יונגע סאָסנעס מאכט מען פֿאָקפּאפּיר און טאקטור (פּאפּירהאַלץ). פֿון די פעך נאקומט מען קאליפֿאָניע, טערפענטין, סמאָלע. די קאָרע באנוצט מען צו גארבן לעדער.

ווער שעדיגט די סאָסנע? אויף דער קאָרע באוועצט זיך דער זשוק, דער דרוקער, זיינע לאַרוועס פֿרעסן דאָס האַלץ. נאָכמער שאָדן מאכט אָן אין סאָסנאוון וואלד דער סאָסנע שפּיגלער. דאָס איז א רויטליכער פֿלאטערל מיט א רויטן באנד און א ווייסן פֿלעק אויף די פֿאָדערשטע פֿליגלען; זיין געפֿלעקטע אשגרויע רויפֿ איז געדיכט באוואקסן מיט רויטליכע האָר; זי ווינטערט איבער אויף דער ערד אין מאָך; אין פֿריהלינג קריכט זי ארויף אויפֿן שטאם און פֿרעסט אָפֿ די נאָדלען. פֿיל בוימער קומען אום פֿון איר. מען פֿארהיט דעם בויס דערמיט, וואָס מען טוט אָן אויפֿן שטאם קלעפּיגע רינגען, און די רויפֿ בלייבט אין זיי שמעקן, בעת זיי קריכט אין פֿריהלינג אויפֿן שטאם.




דער סאָסנעשפינער.

פֿון „מינהאלדס טריבלדער“, פֿאַרל. C. C. Meinhold & Söhne אין דרעודען.

דעם מענשן איז שווער בייצוקומען די קליינע, שעדליכע באשעפֿענישן, איבערהויפט די, וואָס באזעצן זיך הויך אויף די צווייגן. פֿלעדערמיז, פֿויגל און אינזעקטן (ליבעלעס, לויפֿזשוקעס) עסן אויף די רויפֿן מאַסנווייז און פֿאַרהיטן אויף אזאָ אופֿן דעם וואַלד.


די יאָדלע (ענלע)

אין א יאָדלאָוו וואַלד איז נאָך שטילער און טונקלער, ווי אין א סאָסנאָוו. די יאָדלע קען ניט וואַקסן אויף קיין זאמדיגן באַדן. איר הויפט וואַרצל איז קורץ, די זייטיגע וואַרצלען צעשפּרייטן זיך אין אויבערשטן שיכט פֿון באַדן. אין א שיטיגן גרונט קען זי זיך דערפֿאַר ניט אינוואַרצלען. מיט אזויגע וואַרצלען איז איר אויך שווער אויסצוהאַלטן א גרויסן שמורעמווינט. ער רייסט זי אויס מיט די וואַרצלען און וואַרפֿט זי אַנידער אויף דער ערד. וואונדערליך שיינן איז די פֿאַרמע פֿון דער יאָדלע. ווי א הויכע גרינע פּיראַמידע, הייבט זי זיך אויף פֿון דער ערד. דער שאַרפֿער שפיץ און די אויבערשטע צווייגן, וואָס ווערן אויבן אלץ קירצער, פֿאַרשטעלן ניט די זון פֿון די גרויסע אונטערשטע צווייגן. דערפֿאַר בלייבן זיי וואַקסן אפֿילו ביי די עלטסטע בוימער, לאָזן זיך אַראָפֿ ביי צו דער ערד, פֿאַרשטעלן זי אַרום



די ענלע.

- (1) א צווייג מיט שטויבנעבלימען.
- (2) דער שפיץ פֿון א צווייגעלע מיט א סעסקעלע פֿון פֿרוכטבליהונג; פֿון אויבן, קערנדלעך מיט פֿליגעלעך און אָהן א פֿליגל.
- (3) א פֿארטיגע סעסקע
- (4) (און איבער איר) א שופעלע פֿון א סעסקע, ווי זי ווייזט אויס פֿונאויסן און פֿונאינווייניג מיט א פֿאַר נעפֿליגלטע קערנדלעך און מיט ערטער פֿאַר קערנדלעך.



דער ווייכנאָדלער.

- (1) א צווייגל מיט איין פֿארלענגערטן און מיט אפֿולע פֿארקירצטע שפּראַצן און מיט א שפּראַץ, וואס איז דורכגעוואקסן דורך א סעסקע (a).
(2) א צווייג מיט שטויב (♂) און פֿרוכטגעבלימען (♀).
(3) א פֿארטיגע סעסקע.

און ארום און לאָזן ניט צו קיין שטראלן צום באַדן, דערפֿאר איז ער אַלעמאָל פֿייכט און הייל, ווייל דאָ איז שוין צו פֿינסטער אפֿילו פֿאר געוויקסן, וואָס ליבן שאַטן. דער יאָדלאָווער וואַלד איז אויך זעהר אַרעם מיט קליינע בוימלעך און קוסטעס.

די יאָדלע האָט קורצע גאָדלען, וואָס זיצן איינציגווייז אויף די צווייגן. אירע סעסקעס זיינען לענגער און די העלברוינע שופן ווייכער, ווי ביי דער סאָסנאווער סעסקע. זיי ווערן פֿארטיג אין איין זומער, ווינטערן איבער אויפֿן בוים און פֿארזייען זייער געפֿליגלמע זאָט אין מאָרט.

פֿון די איבעריגע גאָדלבויםער זיינען באַוואוסט דער ווייכנאָדלער אָדער דער לעַרַכבוים און דער איידעלער טענענבוים.

דער לעַרַכבוים איז דער איינציגער גאָדלבוים, וואָס ווינטער פֿארלירט ער זיינע גאָדלען. זיין האָלץ איז שטארק און דויערהאַפֿטיג, ווי דעמבאָווע, דעריבער בוים מען פֿון אים שיפֿן. פֿון זיין פעך באַקומט זיך דער בעסטער מערפענטין.

דער איידעלער טענענבוים איז זעהר ענליך צו דער יאָדלע, זיינע גאָדלען זיינען פֿונאַונטן ווייסליך.

דאָס האָלץ פֿון א יאָדלע און א טענענבוים איז ניט איבעריגס שטארק און פֿוילט גיך, עס שפּאַלט זיך אָבער זעהר גרינג. מען מאַכט פֿון אים פּאַפּיר, גאָך מער ווערט פּאַרניצט ווי ברענהאַלץ. דאָס האָלץ פֿון דעם איידעלן טענענבוים האָט א גוטן אָפּקלאנג (רעזאָנאַנס), דערפֿאר מאַכט מען פֿון אים מוזיקאַלישע אינסטרומענטן. (פּידלען א. א. וו.)

גאָדלוועלדער זיינען שטילער, ווי בלעטערוועלדער. אין א בלעטער-וואַלד איז דאָ מער פֿויגלעך. דאָ האָבן זיי מער באַהעלטענישן זיך צו געסטלען, דאָ געפֿינען זיי מער שפּייז, ווייל אויף אפֿולע פֿון די קלענערע בוימער און קוסטעס וואַקסן יאָגדעס; אין פֿרייהלינג פֿאַרהילכן די פֿויגלעך מיט זייער זינגען דעם גאַנצן בלעטערוואַלד. אין אַ סאָסנאַוון וואַלד איז שטילער, און גאָר שטיל איז אין א יאָדלאָוון וואַלד, וואו קיין אונטערוואַלד איז כמעט ווי גאָר ניטאָ.

מיט וועלכע וועלדער איז רייך די געגנט, וואו איר וואוינט? צו איז אייך אויסגעקומען צו זיין ווינטער אין וואַלד? צו האָט איר ווען געקליבן סעסקעס און געפרובט ארויסנעמען די זאָט?

דער וואַלד און זיין ראָלע אין דער נאַטור.

די וועלדער שפּילן די גרעסטע ראָלע אין לעבן פֿון דער גאַנצער נאַטור. לכתחילה איז דאָס ניט קענטיג, אבער אויפֿמערקזאַמע און לאַנגיאָריגע באַ-

אַבאכטונגען האָבן דאָס באוויזן. דערהויפּט פֿילט זיך דער גרויסער באטייט פֿון די וועלדער בעת מען פֿאַרגלייכט א וואלדיגע לאנד מיט ניט קיין וואלדיגער, אָדער בעת מען זעהט, ווי עס ביים זיך א לאנד, בשעת מען האקט אויס אירע וועלדער.

לאָמיר פרובן זיך קלאָרמאכן דעם באטייט פֿון וואלד אין דער נאטור.

די בוימער ציהען אריין אין זיך גרויסע מאסן קוילנויערן גאז פֿון דער לופט און לאָזן ארויס גרויסע מאסן זויערשטאָף. דערמאָנט זיך וועגן דער ווירקונג פֿון ביידע גאזן און שאצט אליין אָפּ דעם באטייט פֿון דער דאָזיגער דערשיינונג.

דער גרעסטער שטורעמווינט האלט זיך אָפּ ביים וואלד, ווי ביי א גרויסער וואנט, זיין צעשמערנדיגער כוח ווערט דעריבער אין א וואלדיגער געגנט שוואכער, ווי אין אן אָפֿענער.

דער וואלד מאכט פֿייכט די לופט. פֿון דער טיפֿעניש פֿון דער ערד ציהען די וואַרצלען דאָס וואסער און דעמפֿן עס אויס אינדערלופטן דורך די בלעטער. אין וואלדיגע געגנטן ליידט מען דערפֿאַר ניט אויפֿיל אין א טריקעניש.

דער וואלד האלט איין די פֿייכטקייט פֿון באָדן. די פֿייכטע ערד ווערט ניט אויסגעטריקנט, ווייל די בלעטער פֿאַרשמעלן די שטראלן פֿון דער זון. אין א גוסרעגן צעקלאפֿן זיך די רעגנטראָפֿנס, טריפֿן אראָפּ פֿאַמעליך פֿון די בלעטער, און די ערד זויגט זיך אָן מיט זיי. אין אן אָפֿענער ניטוואלדיגער געגנט גיסט זיך אראָפּ דאָס רעגנוואסער אין די נידעריגע ערטער. און די ערד באווייזט ניט איינצוזאפֿן דאס וואסער.

אין וואלדיגע געגנטן ווערט די ערד אין פֿרייהלינג ניט אזוי שטארק פֿאַרפֿלייצט פֿון טייכן און שטראמען; אייז און שניי צעגייען אין שאָטן פֿון די וועלדער פֿאַמעליך און גיסן זיך ביסלעכווייז אין די טייכן אריין; זומער ווידער ווערן די טייכן אין א וואלדיגער געגנט ניט אזוי שטארק אויס־געטריקנט, ווייל דער וואלד שפייזט זיי מיט וואסער דורך זיינע שטילע טייכלעך און קוואלן. וואלדיגע געגנטן זייגען אויך רייכער מיט תּוֹת און פֿויגל.

דער וואלד און דער מענש.

אמאָל איז די ערד געווען באדעקט אויף טויזנטער מיילן מיט געדיכטע וועלדער. דעם מענשן איז אָבער ענג געוואָרן, און ער האָט זיך גענומען אויסהאקן דעם וואלד. אויף די אויסגעהאקטע ערטער האָט מען אויסגעבויט

שמעט, פארווייט פֿעלדער און סעדער. אין אפֿולע ערטער האָט מען אָבער געהאקט דעם וואלד אָהן אויסרעכענונג, אפֿילו בעת עס האָט זיך גאָרניט געפֿאָדערט. דאָס האָט געהאט פֿאַר דעם מענשן די טרויעריגסטע רעזולטאטן. די טייכן האָבן אנגעהייבן פֿלאַך צו ווערן, אין פֿריהלינג האָבן די געוויסערן אָנגעהייבן פֿאַרפֿלייצן די פֿעלדער און צעשמערן די ארבעט פֿון מענשן. פֿרוכפערדיגע ערטער זיינען אָרעם געוואָרן צוליב זומערדיגע טרויערנישן. וואָס ווייטער איז אלץ געוואָרן ווייניגער האָלץ צום הייצן, בויען א. א. וו. דאן איז דער מענש צום שכל געקומען און האָט אנגעהייבן שאַנעווען און הייטן דעם וואלד.

עס האָט זיך אנטוויקלט א גאנצע וויסנשאַפֿט, ווי צו פֿאַרהייטן וועלדער און ווי זיי צו פֿאַרמערן.

אין באַזונדערע וואלדשולן און וואלדסטאַנציעס קלייבט מען צוזאַמען זאָט פֿון פֿאַרשיידענע בוימער, מען פֿאַרווייט זיי אויף צעאקערטע ערד. ווען זיי גייען אויף און דערגרייכן א געוויסע הויך און שטאַרקייט, זעצט מען זיי איבער אין וואלד. דערביי פֿרובט מען אויס, פֿון וואָספֿאַר א זאָט עס גייען אויף בעסערע בוימער, אויף וואָספֿאַר א באַדן און ביי וועלכע באדינגונגען.

קינסטליך פֿאַרווייטע וועלדער דערקענט מען נאָך די גלייכע שורות פֿון די בוימער.

אָבער נאָכמער פֿאַרלאָזט מען זיך אויף די נאַטירליכע זייער, אויפֿן ווינט און אויף די בוימער אליין; דער מענש העלפֿט נאר צו דער נאַטור. ער האקט אויס די אלטע בוימער, עס זאָל בלייבן מערער אָרט פֿאַר די יונגע, ער לאָזט איבער בוימער, וואָס קענען געבן גוטע זאָט. אזא בויס ווערט מיטדערצייט די מוטער פֿון א נאַנצן יונגן וואלד.


ווען דער יונגער וואלד וואקסט אונטער, ווערן ווידער אויסגעהאקט אלטע בוימער, כדי יונגע זאָלן באַקומען מער אָרט אין באַדן און ליכטיקייט, אָבער מען טוט דאָס פֿאַרויכטיג, די יונגע זאָלן גיט בלייבן אָהן א שוץ. בעת דער יונגער וואלד ווערט נאָך שטאַרקער, האקט מען ווידער אויס אלטע בוימער, און אזוי ווערט דער אלטער וואלד פֿאַרבישן דורך א יונגן. דורך אזא פֿלאַנמעסיגן אויסהאַקן געווינט דער מענש אינצווייען: ער שאַפֿט זיך דעם גוטיגן האָלצ־מאַטעריאַל און העלפֿט דעם וואָקס פֿון גייע יונגע וועלדער.

מען נעמט אויך אָן ענערגישע מיטלען צו פֿאַרהייטן די בוימער פֿון שעדליכע אינזעקטן. מען טוט אָן אויף די שטאַמען אין פֿריהלינג קלעפֿיגע רינגען, מיט פֿייער און רויך הרגעט מען אויס די שעדליכע פֿלאַמערלעך; מען האקט אויס די געפֿעלערטע בוימער און מען פֿאַרברענט זייער צעווערימטע קאָרע. מען שיצט אלע פֿויגל און חיות, וואָס שפייזן זיך מיט די שעדליכע

אינוקמן. דערמאנט זיך וועגן דעם לעבן פֿון א פיקהאָלץ, וועגן דער פֿלעדערמוז.

די קוקאווקע.

די קוקאווקע פֿארהיט דעם וואלד, זי איז ויין בעסטער פֿריינט. איר איינציגע שפייז זיינען אינוקמן, דערהויפט די האָריגע פֿרעסערס, די רויפן פֿון דעם סאָסנעשפינער און פֿון אנדערע שעדליכע פֿלאַמערלעך. זייערע שטעכעדיגע האַר שרעקן אָפּ אפֿולע פֿויגלעך, פֿאר דער קוקאווקע איז דאָס אָבער קיין בראַק ניט. זי ווערט ניט מיט, ארומפֿליהענדיג דעם לאנגן פֿריהלינג און זומערטאָג פֿון איין בוים צום אנדערן; מיט איר שפיציגן, אַ ביסל אַייגנעכויגענעם שנאָבל, נעמט זי אראָפּ די רויפן פֿון די צווייגן און די בלעטער.



די קוקאווקע.

ווער ווייס ניט וועגן דער קוקאווקע? וועמען איז ניט אויסגעקומען צו הערן, ווי זי רופֿט אין פֿריהלינג: קרֿקו, קרֿקו. זי קערט זיך אום פֿון די וואַרעמע לענדער אין אנהייב מאי. זי איז גרויס, ווי א טויב. אירע פֿעדערן זיינען ווייס און גרוי, אין שוואַרצע שטרייפֿן. די פֿינגער פֿון די פֿיס זיינען זעהר באַוועגליך. איינעם פֿון די דריי פֿאָדערשטע פֿינגער קען זי א קער טאָן אויפֿהינגן און אויף אזא אַופֿן בעסער ארומכאפֿן א צווייג. זוכנדיג שפייז, קומט איר אויס שטענדיג ארומצופֿליהען און צו בייטן

דעם אָרט; דערמיט, קען זיין, דערקלערט זיך, וואָס זי לעבט און פֿירט זיך גאָר אנדערס, ווי די איבעריגע פֿויגל אין וואַלד. די קוקאווקע בויט ניט קיין נעסט און בריהט ניט אויס אליין אירע אייער. זי זויגט זיי אין פֿרעמדע נעסטן. אירע אייער זיינען זעהר קליין און האָבן ניט קיין שמענדיגע פֿאַרב; דערפֿאַר דערקענט זיי ניט די פֿרעמדע פֿויגעלע, בעת זי געפֿינט זיי אין איר נעסט, און בריהט זיי אויס צוזאַמען מיט אירע אייגענע; באַמערקט אבער די פֿויגעלע א פֿרעמדע איי, פֿאַרלאָזט זי איר אלטן נעסט.

די קוקאווקע לייגט ביז 20 אייער; אנדערע פֿויגל לייגן ניט אזויפיל, ווייל זיי האָבן ניט די מעגליכקייט אויסצוהאַדעווען און אָנצוקאַרמענען אזויפיל קינדער. די קוקאווקע איז אָבער פֿריי פֿון אַזאַ זאַרג. אָפֿט לייגט זי איר איי אין די נעסטן פֿון גאָר קליינע פֿויגעלעך. אויב דער נעסט איז צו קליין, און זי קען זיך ניט זעצן אין אים, לייגט זי די איי אויפֿן גראַז און טראָגט עס מיטן שנאָבל אין נעסט אריין. ווען די יונגע קוקאווקע פֿיקט זיך אויס פֿון איי, ווערט זי גלייך קענטיג צווישן אירע צופֿעליגע שוועסטער אין נעסט, אָבער די פֿרעמדע פֿויגעלע האָדעוועט און קאַרמעט זי מיט דערזעלביגע צערמליכקייט, ווי אירע אייגענע קינדער.

די קליינע קוקאווקע איז א גרויסע פֿרעסערקע, פֿאַרנעמט א ברייטן אָרט און וואַרפט אָפֿטמאָל אַרויס פֿון נעסט די איבעריגע פֿויגעלעך. בעת עס וואַקסן אויס ביי איר די פֿליגעלען, פֿאַרלאָזט זי דעם נעסט און הויבט אָן צו לעבן אזוי ווי אירע עלטערן. וועלכע וואַלדפֿויגל זיינען אייך נאָך באַקאַנט? דערמאָנט זיך וועגן דעם מייזאָדלער, וועגן דער סאָווע און זייער לעבן אין וואַלד.

די יאַשמשערקע אָדער די עגדעש.

אויפֿן באָדן פֿון וואַלד אין גראַז און אין מאַך טרעפֿן זיך קריכיגע חיות, יאַשמשערקעס און שלאַנגען. אזויווי איין מין שלאַנגען פֿון אונזערע געגנטן איז גיפֿטיג, שרעקט זיך דער מענטש און האַסט אלע קריכיגע חיות. אינדער־אַמתן אָבער, איז דאָס רוב פֿון זיי ניט גיפֿטיג און ניט שעדליך. אזוי, למשל, האָט די קליינע פֿלינקע יאַשמשערקע א גרויסן באַטייט פֿאַרן וואַלד, ווייל זי שפּייזט זיך מיט פֿלאַמערלעך, זשוקעס, לאַרוועס, שנעקעס, וואָס שעדיגן אזוי שטאַרק די בוימער. זעהן קען מען זי אויפֿן ראַנד פֿון וואַלד אין א זונטיגן טאָג. זי ליגט אויף דער ערד און באַדט זיך אין די שטראַלן פֿון דער זון. די זון איז איר לעבן, אויפֿן זון איז זי מונטער, רירעוודיג; אין א קילן גיטוויניגן טאָג ווערט זי שלאַף, באַזעגט זיך ווייניג. ביי א מענטש, א מילכ־זייניגע חיה, א פֿויגל, איז די בלוט און דער גאַנצער קערפֿער אינווייניג

שמענדיג ווארעם אפילו ווינטער, און זיי זיינען צוגעדעקט מיט האָר אָדער פֿעדערן, כדי די הויט זאל זיך ניט אָפקילן. ביי דער יאשמשערקע אָבער דער-ווארעמט זיך די בלוט און דער גאנצער גוף אינווייניג גאָר ווייניג פֿון זיך אליין. אלץ ווענדט זיך פֿון דער זון. ווארעמט די זון, דערווארעמט זיך ביי דער היהעלע די בלוט און הויבט אָן גיכער צו פֿליסן, די יאשמשערקע ווערט לעבעדיגער. ווארעמט די זון ניט, קילט זי זיך אָפּ און ווערט שלאָף, ניט באוועגליך. דערמאָנט זיך, אז דיועלביגע דערשיינונג האָבן מיר שוין געקענט באמערקן ביי א פֿראַש. דערפֿאר איז דער גוף ביי דער יאשמשערקע אויך ניט צוגעדעקט מיט קיין ווארעמען פעלצל, ניערט מיט א שופיער הויט, וואָס זי בייט עטליכע מאָל דורכן זומער.

ווינטער ליגט זי א פֿאַרגליווערטע אין דער ערד און אין פֿריהלינג כאפט זי זיך אויף. זי לייגט קליינע אייער מיט א לעדערדיגן שאַלעכץ אין דער ערד און זאָרט שוין מער ניט וועגן זיי; ווען די ערד דערווארעמט זיך, בריהען זיך די אייער אליין אויס. וויגאָר די יונגע יאשמשערקעס גייען פֿון איי ארויס, הויבן זיי אָן צו לעבן זעלבשמענדיג, ווי זייער מוטער.

די יאשמשערקע האָט א לענגליכן גוף, פֿונאויבן איז ער פלאציג. די שופיער הויט האָט א ברויגליכע פֿאַרב מיט טונקלע שטרייפֿן אויפֿן רוקן און אויף די זייטן. אין פֿריהלינג איז ביי דעם מאנעלע דער רוקן גרינגליך. די פֿאַרב איז צוגעפאסט צו דער פֿאַרב פֿון דער ערד און פֿון גראָו. דאָס איז א שוצפֿאַרב. מיט איר פֿאַרב און מיט איר פֿלינגן אנטלויפֿן ראטעוועט זי זיך פֿון אירע שונאים, פֿון רויבפֿויגל, שלאנגען און אנדערע.


זי שפייזט זיך מיט אינועקטן, זי באמערקט זיי נאָר, בעת זיי באוועגן זיך. זי שלינגט אראפ אינגאנצן זשוקעס, פֿלאטערלעך און שנעקעס, ווייל מיט אירע קליינע און שוואכע צייגער אויף די מוילבייגער און אויפֿן גומען קען זי מער ניט ווי פֿאַרהאלטן און צעקוועטשן איר רויב, אבער ניט צעקייען. דער לאנגער צונג איז אויפֿן שפיץ געשפּאַלטן, מיט אים דערטאפט זי אלץ דינג ארום זיך, דאָס איז איר טאָפּ אָרגאַן. מיט אים טרינקט זי, באַנעצנדיג אים מיט טוי אָדער איינטונקענדיג אין וואסער. זי האָט ניט קיין אויער-מושלען, אָבער זי הערט גוט, אויפֿן קאָפּ זעהען זיך די הייטלעך, מיט וועלכע די אויערן זיינען פֿאַרצויגן. אירע קורצע און שוואכע פֿיס זיינען אזוי גערשמעלט, אז זיי קומען ארויס אביסל אָנאזייט; אויף אזויגע פֿיס קען זיך ניט האלטן דער גוף, און מיט זיי איז שווער צו לויפֿן. דער בויך ליגט ביי דער יאשמשערקע אויף דער ערד, זי שארט זיך אָן מיטן בויך, מיט די פֿיס און מיטן עק אָן דער ערד און באוועגט זיך פלינג, קרימענדיג און שלענגלענדיג דעם גאנצן גוף.

מערקוויירדיג איז איר לאנגער עק. בעת מען כאפט אָן די יאשמשערקע

פֿארן עק, און זי פֿילט זיך אין געפֿאר, ברעכט זיך דער עק אָפּ, און זי
אנטלויפֿט, אָבער דער עק וואקסט דערנאך ווידער אָפּ.
די יאשמשערקע איז זעהר א קלוגע תּיהעלע. ווען מען זאָל זי אנכאפֿן
א לעבעדיגע און האלטן אין א טעראריום (א קעסטל מיט גלעזערנע
אָדער דראַטענע ווענט, אויסגעבעט מיט ערד און מאַך) געוואוינט זי זיך
צו צום מענשן, קוקט אויף אים מיט אירע גלאנציגע אויגן און עסט פֿון
זיין האנט אינועקמן און ווערים.

די רינגשלאנג אָדער רינגנאָטער.

די רינגשלאנג טרעפט מען אין פֿייכטע וועלדער, אָפטמאָל אויפֿן ברעג
פֿון וואסער, וואו זי באהאלט זיך אין א געפֿאר. זי שווימט זעהר גוט.
צונויפֿגעדרייט אין א רינג (דערפֿון נעמט זיך איר נאָמען) ליגט זי
פֿויל און ווארעמט זיך אויפֿן זון. אויך ביי איר דערווארעמט זיך די בלוט,



די רינגשלאנג און די צלמשלאנג.

פֿון „פראנקע־שמייל, רעאליענכוכ“, בד. I, אויסג. A, פֿארלאג B. G. Teubner איז לייפֿציג און בערלין.

ווי ביי דער יאשמשערקע, אויב די לופט ארום איז ווארעם. זי נויטיגט זיך אויך ניט אין קיין ווארעמען צודעק. זי האָט א הארטע שופיגע הויט, וואָס זומער בייט זי זיך. זי באַפרייט זיך פֿון דער אלטער הויט, זיך רייבנדיג אָן שטיינער און קאָרע פֿון בוימער. ס'איז אייך אפשר אויסגעקומען צו געפֿינען אין וואַלד א הויט פֿון א שלאַנג?

די פֿארב פֿון איר גוף איז ניט אלעמאָל גלייך. עס טרעפֿן זיך ריינג שלאַנגען מיט א גרויער, בלויליכער, שוואַרצער אָדער געפֿלעקטער הויט, אָבער איטלעכן מאָל, איז איר פֿארב אזוי, אז זי לאָזט זיך ניט שטארק אָפֿטיילן פֿון דער ארומיגער סביבה. לויט איין סימן איז זי אָבער גרינג צו דערקענען: זי האָט צוויי האַלבקיילעכדיגע געלע פֿלעקן פֿון ביידע זייטן האַלו. ווען מען לערנט זיך אויס צו דערקענען זי, פֿארשפּאַרט מען זיך צו דערשרעקן, בעת מען דערזעהט זי אומגעריכטערהייט אויף דער ערד אָדער אין וואַסער, זי איז ניט גיפֿטיג און ניט שעדליך.

אירע קליינע ציינער זיינען מערניט ווי פֿאַנגציניער. איר צונג האָט צוויי שמאלע שפיצן, וואָס זי האַלט זיי ארויסגעשטעקט פֿון מויל. דאָס איז איר טאפֿאָרגאָן און ניט קיין גיפֿטיגע שמעכערס, ווי דאָס מיינען אומוויסנדיגע מענשן.

אירע אויגן האָבן ניט קיין לעפלען, זיי זיינען באַצויגן מיט א דורכזיכטיגע הייטל, שמענדיג אָפֿן, אויסגעשטעלט און ניט באַוועגליך. זייער קוק שרעקט אָפֿ מענשן און חיות.

זי לויערט אויס פֿרעש, יאשמשערקעס, פֿיש אין וואַסער, עפֿנט אויף ברייט די מויל און שלינגט זיי אראָפֿ לעבעדיגע, דערביי שפּרייטן זיך פֿונד-אנדער די באַוועגליכע מוילביינער. נאָך אזא מאָלצייט ליגט זי ניטבאַוועגליך און פֿאַסט עטליכע טעג: ס'איז דאָך ניט גרינג צו פֿאַרדייען אזא גרויסן ביסן.


קיין פֿיס האָט זי ניט און דאָך באַוועגט זי זיך גאַנץ גיך. זי שפּאַרט זיך אָן מיטן שופּיגן גוף אָן דער ערד און רוקט זיך פֿאַרויס, שלענגלענדיג זיך.

ווינטער ליגט זי א פֿאַרנליווערטע אין דער ערד און כאַפט זיך אויף אין פֿריהלינג. ווי די יאשמשערקע לייגט זי אירע אייער מיטן לעדערדיגן שאַלעכץ אין דער ערד, און זיי בריהען זיך אליין אויס.

אין א טעראַריום געוואוינען זיי זיך צום מענשן ניט צו. זיי עסן ווייניג און באַהאַלמענערהייט, בעת מען זעהט זיי ניט.

די צלמשלאנג אָדער די קרייצאַטער.

די צלמשלאנג איז גיפטיג. זי איז געפערליך פֿאַר מענשן און חיות. מען געפֿינט זי אין זומפֿיגע וועלדער, אויף פֿעלדער און לאַנקעס. די פֿאַרב פֿון איר הויט בייט זיך אין פֿאַרשידענע ערטער. דערפֿאַר איז שווער אנצער ווייזן ריכטיגע סימנים, וואָס נאָך זיי זאָל מען זי קענען גרינג דערקענען. דאָך דאַרף מען געדענקען אזויגע סימנים: דער קאָפּ איז פּלאַציג, דריי־קאַנטיג און טיילט זיך דייטליך אָפּ פֿון האַלו; דער עק איז קורץ און דער נאַנצער גוף איז אומגעלומפערטער, ווי ביי דער רינגשלאנג; אויפֿן רוקן האָט זי אַ טונקלע זיגזאָניגע ליניע, אויפֿן קאָפּ אַ טונקלען צייכן: (X אָדער H). איר ליבסטע שפּייז זיינען מייז. זי שלינגט זיי אַראָפּ אינגאַנצן, און עס געדויערט לאנג, ביזזיאָנען זי פֿאַרדייט זיי; פֿאַרן אַראָפּשלינגען אָבער טויט זי זיי מיט איר שרעקליכן גיפֿט. זי האָט פֿונאַויבן צוויי גרויסע שפיציגע ציינער. די גיפֿט אַרבעט זיך



אויס אין באַזונדערע גיפֿט־גילן אין קאָפּ; פֿון די גילן גיסט זיך די גיפֿט אַריין אין קאַנאַל פֿון צאָן, דער קאַנאַל עפֿנט זיך פֿונדערווייט פֿון צאָן גיט אויפֿן שפּייץ גופֿא; מיטן שאַרפֿן שפּייץ שמעכט זי דורך די הויט, און פֿון לעכל גיסט זיך די גיפֿט אַריין אין וואונד. ווען די שלאנג איז רוהיג, ליגן די גיפֿט־ציינער פֿאַרבוין אויפֿהינטן אין באַזונדערע קנייטשן פֿון הויט. בעת די ציינער ברעכן זיך אָפּ, אנט־

קאָפּ פֿון אַ גיפֿטשלאנג מיט דער גיפֿט־גיל און גיפֿט־צאָן.
פֿון „קריפעלין, לייטפֿ. פֿ. ד. זאָלאַנג אונטערריכט“
פֿאַרלאַנג B. G. Teubner אין לייפּציג און בערלין.

וויקלען זיך אַנדערע קלענערע, וואָס געפֿינען זיך הינטער די גרויסע. נאָך רויב קריכט די שלאנג ארויס ביינאכט.

די צלמשלאנג לייגט גיט קיין אייער, ווי די רינגשלאנג. ביי איר ווערן געבאָרן לעבעדיגע קינדער. קלייניגע שלאנגען, וואָס הייבן גלייך אָן צו יאָגן זיך נאָך יאַשמערקעס.

זי האָט אויך קאלטע בלוט און דערוואַרעמט זיך, ווען די לופֿט אַרום איר איז וואַרעם. דעם גאַנצן ווינטער ליגט זי אָפּ אַ פֿאַרגליווערטע אין דער ערד.

איר גיפֿט איז פֿארן מענשן זעהר געפֿערליך. אין זומפֿיגע וועלדער, וואו די זלמשלאנגען טרעפֿן זיך, דארף מען זיך היטן ארומצוגיין בארוועס. לעדערנע שטיוול קען זי נישט דורכבייסן. דעם איינגעביסענעם אָרט מוז מען וואָס גיכער אויסברענען. ס'איז גוט, ווען מען בינדט שטייף ארום די פֿוס אָדער די האנט העכער איבערן וואונד, די גיפֿט זאָל זיך נישט פֿאַר שפּרייטן איבערן גאנצן קערפּער. אויב אין מויל זיינען נישט קיין פּרישציקעס און קיין ראַצן, קען מען אויסזויגן די גיפֿט פֿון וואונד מיטן מויל, ווייל די גיפֿט איז פֿארן מענשן נישט געפֿערליך, אויב זי קומט אריין אין מאַגן. געד פֿערליך איז זי נאָר, אויב זי קומט אריין אין די בלוט. בראַנפֿן, שפּירעט און וויין ווירקן גוט ווי א קעגנגיפֿט.

נאָך שלאנגען יאָגן זיך בושלען, מייזאָדלער און דער יאָזשיק, וואָס די שלאנג קען אים נישט איינבייסן צוליב זיינע שטעכעדיגע נאדלען.

קריכיגע בעלי-חיים אָדער שרצים (רעפּטיליען).

יאַשטשערקעס און שלאנגען זיינען ענליך איינע צו די אנדערע. באשרייבנדיג זייער לעבן און דעם בוי פֿון זייער קערפּער, פֿאַראייניגן זיי די געלערנטע אין איין קלאַס, וועלכן זיי רופֿן אָן קריכיגע בעלי-חיים אָדער רעפּטיליען. איר פֿאַרשטייט שוין אליין פֿונוואנען דער נאָמען נעמט זיך. איר האָט דאָך געזעהן, ווי שוואַך די פֿיס זיינען ביי דער יאַשטשערקע, און אז די שלאנגען האָבן גאָר קיין פֿיס נישט.

זיי רירן אָן די ערד מיטן בויך און באוועגן זיך פֿאַרויס, קרימענדיג (שלענגלענדיג) דעם גאנצן גוף. אויב איר וועט וועגניטאזי האָבן די געד לעגנהייט זיך איינצוקוקן אויף א סקעלעט פֿון א רעפּטיל, דערהויפּט פֿון א שלאנג, וועט איר זעהן, ווי ער איז צוגעפּאַסט צו אזא מין באוועגונג. דער חוט השדרה איז לאנג, די איינציגע בייגלעך (די ווירבלען) זיינען פֿאַרבונדן צווישן זיך זעהר באוועגליך, אזוי אז דער גוף קען זיך קרימען אין אלע זייטן. די שלאנג פֿאַרמאָגט נאָך דערצו זעהר אפֿולע ריפּן, וואס זיינען נישט צוזאַמענגעוואקסן אויפֿן ברוסט. בעת זי קריכט, שפּאַרט זי זיך אין מיט זייערע שפיצן דורכן הויט אין דער ערד.

אלע קריכער זיינען רויביות. זיי שלינגען אריין זייער רויב אינגאנצן, פֿאַרדייען לאנגזאַם און קענען דערפֿאַר א לאנגע צייט באגיין זיך אָהן עסן. אלע פּראָצעסן אין זייער גוף קומען פֿאַר לאנגזאַמער, ווי ביי די מילכזוויגער און די פֿויגל. זיי עמעמען פּאַמעליך, פּאַמעליך באוועגט זיך ביי זיי די בלוט, זי ווארעמט זיך ווייניג אָן, די אינווייניגסטע ווארעמקייט זייערע ווענדט זיך פֿון דער זון. שיינט די זון, און די לופֿט ארום איז ווארעם, ווארעמט זיך

ביי זיי אָן די בלוט און זיי הייבן זיך אָן ניכער צו באוועגן, דעמאָלט ווערט אויך די חיה לעבעדיגער. ווינטער ווערן זיי אינגאנצן פֿאַרגליווערט, אין פֿרילינג כאפן זיי זיך ווידער אויף.

דער שופינער צודעק פֿאַרהיט דעם גוף, וואָס רייבט זיך שטענדיג אָן דער ערד אָדער אָן דער קאָרע פֿון די בוימער, אָבער ער שיצט ניט פֿון קעלט. איר פֿאַרשטייט שוין אליין, פֿאַרוואס די קריכניגע נויטיגן זיך ניט אין קיין ווארעמען צודעק.

ביי דער צילמשלאנג גייען די קינדער ארויס פֿון איי נאָך אין מומערס גוף. די איבעריגע לייגן אייער, וועלכע ווערן אויסגעבריהט פֿון דער זון אָדער פֿון דער דערווארעמטער ערד.

אין די קאלטע לענדער זיינען גאָר קיין קריכער ניטא, ביי אונז זיינען זיי דא ווייניג. אָבער אין די ווארעמע לענדער איז דא א מאסע קריכער. מיט וואָס דערקלערט זיך דאָס? צו זיינען אייך באוואוסט נאָך אנדערע קריכער, אויסער יאשטשערקעס און שלאנגען? צו איז אייך אויסגעקומען צו זעהן א שטערעפאכע (א שילדקרעט)?

מענשן, וואס ליבן די נאטור, האָדעווען און האלטן רעפּטיליען אין מעראריומס. געוואוינטליך איז דאס א קעסטל מיט א גלעזערנער וואנט, מען דעקט אים צו מיט א דראָמענעם נעץ, ער זאָל דורכלאָזן פֿרישע לופט. אין מעראריום זעהט מען צו שאפן אזויגע באדינגונגען, וואָס זאָלן זיין ענליך צו די נאטירליכע, אין וועלכע די חיה איז איינגעוואוינט צו לעבן.

אין בערלין און אין אנדערע גרויסע שטעט זיינען איינגעארדנט זעהר גרויסע מעראריומס, וואָס אין זיי לעבן פֿאַרשיידענע קריכער, סײַ קליינע פֿון אונזערע געגנטן און סײַ מוראדיג גרויסע פֿון די ווארעמע לענדער. געלערנטע מאכן דאָרטן זייערע באַאָבאכטונגען, קינדער קומען אהין זיך לערנען צו זאמען מיט זייערע לערערס.

די מוראשקע.

דער בילד פֿון לעבן אין וואלד וועט זיין ניט קיין פֿולער, אויב מיר וועלן זיך ניט באַקענען געהענטער מיט דער וואלד מוראשקע.

די רויטליכברוינע וואלדמוראשקעס האָבן האָלט נאָדלועלדער. דאָ געפֿינען זיי גענוג בוימאטעריאל פֿאַר זייערע מוראשניקעס. אזוי ווי בערגעלעך, הויבן זיך אויף די מוראשניקעס צווישן די בוימער. זיי זיינען אויפֿגעבויט פֿון טרוקענע גאָדלען, שטיקעלעך האָלץ, ערד, פֿאַרשריקנטע פעך פֿון בוימער. אויפֿן מוראשניק וועט איר באַמערקן אפֿולע קליינע לעכעלעך, דאָס זיינען

טירן, וועלכע פֿירן אין די אינווייניגסטע טיילן פֿון דעם וואונדערליכן געבוי, מיט זיינע לאנגע קאָרידאָרן און קעמערלעך.

מיט דער גרעסטער מיה האָבן דאָס אויפֿגעבויט די מוראשקעס, וואָס וויבלען און גריבלען אויפֿן מוראשניק און אויף דער ערד לעבן אים פֿון פֿריה ביז שפעט. זיי לויפֿן ארום און איילן זיך ניט גלאט אינדערוועלט אריין. יעדע טוט א באשטימטע און נויטיגע ארבעט. אפשר איז אייך אויסגעקומען צו זעהן, ווי א מוראשקע שלעפט א נאָדל אָדער א שטיקל פֿון א פֿארטריקנטן בלאט. פֿאר איר איז דאָס א שווערע משא, די נאָדל גליצט זיך ארויס, זי כאפט זי ווידער אונטער און שלעפט געדולדיג ווייטער; אָפֿטמאָל קען מען זעהן, ווי מוראשקעס שלעפן אזא משא זאלבעצווייט און העלפֿן איינע די אנדערע. מוראשקעס זיינען געזעלשאַפֿט ליכע אינועקטן, ווי די בינען, און דער מוראשניק איז א גאנצע מדינה מיט א שטרענגער אָרדענונג, וואו אלע ארבעטן און פֿירן אויס א גרויסע אלגעמיינע ארבעט.

די באפֿעלקערונג באשטייט פֿון עטליכע מלכות אָדער מאמעס, פֿון מאנעלעך און פֿון אפֿולע, אפֿולע ארבעטערינס. די מלכות און די מאנעלעך האָבן פֿליגלען, די ארבעטערינס זיינען ניט באפֿליגלט. אין א שיינעם זוניגן פֿרילינגסאָג פֿליהען ארויס פֿון מוראשניק די מאמעס מיט די מאנעלעך, טאנצן און דרייען זיך אין דער לופֿט, דאָס איז זייער חתונה. נאָך דער חתונה שטארבן די מאַנעלעך, די מאמעס פֿארקריכן צוריק אין דער טיפֿעניש פֿון מוראשניק, דאָ פֿארלירן זיי אין דער פֿינסטערניש און אין דער ענגשאַפֿט זייערע פֿליגלען און לייגן טויזנטער קליינע אייעלעך. פֿון די אייעלעך קומען ארויס קליינע אומבאהאַלפֿענע בלינדע לארוועס, שפעטער ווערן פֿון די לארוועס לענגליכע פֿאָפקעס (צוליב זייער פֿאָרמע רופֿט מען זיי אייער, דאָס איז אָבער א טעות). פֿון דער פֿאָפקע גייט ארויס א פֿארטיגע מוראשקע.


די ארבעטער האָבן ניט קיין פֿליגלען. זיי האָבן זעהר א גרויסע קאָפּ, א קליינע ברוסט, און א דינעם שמענגעלע, וואָס טיילט אָפּ די ברוסט פֿון ביכל. זיי זיינען זעלמענע טוער: זיי בויען אליין אויס דעם גרויסן מוראשניק און האָדעווען די יונגע מוראשקעס. פֿריהער פֿאר אלץ מוז מען קאָרמענען דעם קליינעם לארוו, מען שפייזט אים מיט א ווייכע קאשקע, וואָס די ארבעטערינס ברעכן אויס פֿון זיך; די פֿאָפקעס מוז מען פֿארהיטן פֿון קעלט און נאסקייט, און די מוראשקעס שלעפן טאקע ארום די פֿאָפקעס פֿון איין קאָרידאָר אין דעם אנדערן. שפעטער ביים זי דורך דעם הארטן שאַלעכץ פֿון דער פֿאָפקע, די יונגע מוראשקע זאָל קענען ארויסגיין.

די מוראשקעס שפייזן זיך מיט ווערים, פֿארשידענע אינועקטן, מיט פֿלייש פֿון טויטע חיות, מיט יוסע ואפֿט פֿון בויער און אנדערע געוויקסן. פרובט אוועקלייגן אויף א מוראשניק א טויטן קראַט, א פֿויגל, א שלאנג, די

מוראשקעס וועלן די פלייש ארומפֿרעסן, און סױעט נאָר בלייבן א ריינער סקעלעט. זיי גריזענען מיט זייערע שאַרפֿע גומ אנטוויקלמע מוילצווענגלעך. אין א סכנה שיצט זיך די מוראשקע דורכדעם, וואָס זי שפּריצט ארויס פֿון בייכל א שאַרפֿע זויערקייט (מוראשקעווייערס).

ווינטער פֿארקריכן די מוראשקעס טיף אין זייער מוראשניק און פֿאלן אריין אין א שלאָף ביו פֿרילינג.

די מוראשקעס לאָזן ניט אריין אין זייער מוראשניק קיין מיטגלידער פֿון פֿרעמדע מוראשניקעס און דערטרענען אזוינע ניט געבעטענע געסט מיט זייערע שאַרפֿע מוילצווענגלעך. גאָכמער, זיי פֿירן פֿארביטערטע מלחמות



א מוראשקע מעלקט א בלעטערליוו.
(פֿלג. B. G. Toubner אין לייפציג און בערלין.)

איינע מיט די אנדערע, איין מוראשניק פֿאלט אן אויף דעם אנדערן. גע-
וואוינליך רויבן זיי דעמאָלט איינע ביי די אנדערע פֿאָפּקעס.

אין דערזעלבניגער צייט באמערקט זיך א וואונדערליכע דערשיינונג.
מוראשקעס לעבן זיך פֿרידליך צוזאמען מיט אנדערע אינזעקטן, לאָזן זיי
אריין צו זיך אין מוראשניק, זאָרגן פֿאר זיי, שפייזן זיי. דאָס זיינען גע-
וואוינליך אינזעקטן, וואָס לאָזן ארויס פֿון זיך א זיסן זאָט. די מוראשקעס
זיינען גרויסע בעלנים אויף אזעלכע זיסע זאָטן. אייך זיינען געוויס באקאנט
קליינע גרינע אינזעקטן, וועלכע באפֿאלן מאסנווייז די בלעטער און שטענגלעך
פֿון אפֿולע געוויקסן, דאָס זיינען בלעטערליוו. זיי וויגן די זאָט פֿון די
בלעטער, אין מאָגן ווערט ביי זיי די זאָט איבערגעארבעט אין א זיסע
פֿליסיקייט דאָס איבעריגע ווארפֿן זיי ארויס, און די מוראשקעס גייען זיי נאך
טריט ביי טריט, קיצלען זיי מיט די פֿילערס, "מעלקן", זיי.


צו זיינען דאָ אין אייערע וועלדער מוראשניקעס? וואָס האָט איר אליין
באמערקט, זיך צוקוקנדיג צו א מוראשניק? אפשר האָט איר געטראָפֿן

מוראשקעס אין שפאלטן פֿון הייזער? אין זאמד? דערמאָנט זיך אליין, וואָס איר ווייסט וועגן אינזעקטן. פֿון וועלכע טיילן באשטייט זייער גוף? וואָס פֿאַר א צודעק האָבן זיי? ווי עטעמען זיי? ווי פֿאַרמערן זיי זיך?

די צלמשפּין.

די הויזשפּין איז אונז אַלעמען גוט באוואוסט. זי ציהט אָן איר שפּינד וועכץ אין די ווינקלען און אויף די פֿענסטער פֿון שטוב. אין וואַלד טרעפֿט זיך א נאָהענטע קרובה אירע, די צלמשפּין. זי איז גרעסער פֿאַר דער הויז שפּין. קוקט זיך איין אויף איר אויפֿמערקזאם, וועט איר דערזעהן אויף איר טונקעלן בייכל א מוסטער פֿון ווייסע פיגמלעך, וואָס זיינען צוזאמענגעדֿ שמעלט, ווי א צלם. איצט פֿאַרשטייט איר שוין, פֿונוואנען עס נעמט זיך איר נאָמען.

די צלמשפּין איז א רויבער, פֿונקט ווי די הויזשפּין. זי שפּייזט זיך מיט פֿליגן, קאָמארעס און אנדערע קליינע אינזעקטן, וואָס פֿאלן אריין אין איר נעץ. דער נעץ איז אנגעצויגן צווישן צוויי צווייגן אָדער שטאַמען. ס'איז זעהר אינטערעסאַנט צו באַאָבאַכטן, ווי די שפּין מאכט איר שפּינוועכץ. זי לאָזט ארויס פֿון באזונדערע בראָדעווקעס, וואָס געפֿינען זיך אויפֿן הינטערשטן טייל פֿון בייכל, נאנץ דינינקע פֿעדים, פֿריהער ציהט זי דורך א פֿאָדים אינדערברייט, דערנאָך ציהט זי אָן עטליכע פֿעדים אין די זייטן, ביזוואנען עס באקומט זיך ווי א פֿילקאנטיגער ראם. צום ראם ווערן צוגעצויגן פֿעדים־שטראלן, וואָס גייען ארויס פֿון איין מיטן; דערנאָך ווערן די שטראלן אסך מאַל ארומגעצויגן מיט פֿעדים. אינדעראַמתן אָבער איז דאָס אלץ איין פֿאָדים, וועלכער גייט ארויס פֿון מיטן און דרייט זיך ארום און ארום די שטראלן, אלץ ברייטער און ברייטער, ווי א שפּיראל. עטוואס אפגערוקט פֿון דער שפּיראל ציהט די שפּין דורך א צווייטע, נאָך א געדיכטערע שפּיראל, פֿונאויסן אויף אינווייניג.



די צלמשפּין.

(פֿל. B. G. Teubner אין לייפּציג און בערלין.)

אויפֿן שפּינוועכץ זעהען זיך קליינע קלעפיגע טראָפּנס. אויף זיי

פארהאלטן זיך דאָס די אינועקטן, וואָס בעתן פֿליהען שמויטן זיי זיך אָן אויפֿן נעץ. די שפּין זיצט אינמיטן, אָדער באהאלט זיך אין א ווינקלעלע און ציהט דורך צו זיך א סינגאלפֿאָדים פֿון נעץ. ווען אין נעץ פֿאלט אריין אן אינועקט, גיט ער א לייכטן ציטער. דער ציטער גיט זיך איבער דעם סינגאלפֿאָדים, די שפּין דערפֿילט, אז עס איז דאָ רויב, און ווארפט זיך אויף דעם געפֿאנגענעם אינועקט.

די אויבערשטע מוילצוואנגען ביי א שפּין באשטייען פֿון צוויי גלידער, פֿון א גראָבן, א מוסקולדיגן, און פֿון א דיגעס און שפיציגן. מיטן שפיציגן גליד שמעקט זי דורך די הויט פֿון אינועקט און לאָזט אריין אין וואונד א טראָפֿן גיפֿט. די זאפֿט פֿון איר קרבן זויגט זי אויס און לאָזט איבער די פוסטע הייטל. נאָכן עסן לייגן זיך די שארפֿע שפיצן צונויף אין מויל, ווי די קלינגלעך פֿון א מעסערל.

די צלמשפּין האָט אויפֿן קאָפּ אכט פּאָר קליינע אויגן. די ראַיה איז ביי איר שוואַך אנטוויקלט, זי פֿילט אָבער איטלעכע באוועגונגן, אפֿילו דעם לייכטסטן ציטער, הערט גוט און האָט א חוש הריח.

ביי דער שפּין איז דער קאָפּ צוואמענגעוואקסן מיט דער ברוסט, דעם טייל רופֿט מען "קאָפּברוסט", אָטדער טייל איז באדעקט מיט א הארטן צודעק פֿון כוֹס. די בייכל איז ווייכער, זי טיילט זיך אָפּ פֿון קאָפּברוסט מיט א דיגעס שמענגלעלע און איז גרעסער פֿון איר.

צום קאָפּברוסט זיינען צוגעוואקסן פֿונאונטן 4 פּאָר צעגלידערטע פֿיס מיט פֿארבויגענע שפיציגע קראלן. די פֿיס העלפֿן איר זעהר פֿיל ביים שפינען איר נעץ.

די בייכל איז גיט צעגלידערט אויף רינגען. פֿון דער אונטערשטער זייט קען מען ביי איר באמערקן צוויי עפֿענונגען, דאָס איז דער אנהייב פֿון די לופֿטרערן, וואָס די שפּין ציהט דורך זיי אריין לופֿט, בעת זי עטעמט.

אין האַרבסט לייגט די שפּין אייער, וויקלט זיי איין אין שפינוועכין; זיי ווינטערן איבער אין א שפאלט, אין פֿרילינג קומען פֿון זיי ארויס קליינע, אָבער פֿארטיגע שפינען. שפינען לעבן איינזאם, יעדערער אין זיין נעץ, לוייערנדיג אויף רויב.

נאָר פֿון ערשטן בליק קען מען מיינען, אז שפינען זיינען אינועקטן. בעת מען באקענט זיך אָבער געהענטער מיט זיי, זעהט מען דייטליך, אז זיי אונטערשיידן זיך שטארק פֿון אינועקטן: דער גוף באשטייט נאָר פֿון צוויי טייל, זיי האָבן פֿיר פּאָר פֿיס, האָבן אָבער גיט קיין פֿליגלען. זיי עטעמען מיט לופֿטרערן, האָבן אָבער נאָר צוויי עפֿענונגען. זיי אנטוויקלען זיך פֿון איי און מאכן גיט דורך קיין שום פֿארוואנדלונגען.

זיי זיינען גלידער פֿיסיגע, ווי די אינזעקטן, געהערן אָבער צו א באזונדערן מין גלידערפֿיסיגע, וואָס מען רופט זיי שפּיגען אָדער שפּיג-ארטיגע.

אויפֿן פֿעלד.

קאָרן.

מיט מיה און זאָרג באארבעט דער מענש דאָס פֿעלד און פֿארזיט קאָרן, ווייץ, האָבער, גערשטן און אנדערע תבואות. אין אונזערע קאנטן איז קאָרן




- (1) א בליהענדיגער זאנג.
- (2) א טייל פֿון א שטענגל פֿון תבואה מיט א קני און מיט א בלאַט. ב"ה = בלאטהייטל.
- (3) אן איינציגע בלום.
- (4) א זאנגעלע מיט צוויי פֿארטיגע קערנער. בש"ם = בלומענשופן, זש"ם = זאנגענשופן.

די וויכטיגסטע תבואה, זי גיט אונז ברויט. דאָס איז אונזער וויכטיגסטע שפיין, וואָס ווערט אונז קיינמאָל גיט מיאוס.

ס'זיינען דאָ צוויי מינים קאָרן: (1) זומערקאָרן, וואָס גויטיגט זיך אין א לאנגן און ווארעמען זומער. מען פֿארזיט אים אין אָנהייב פֿרילינג און מען שניידט אים סוף זומער; (2) ווינטערקאָרן פֿארזיט מען אין הארבסט, ער באַווייזט אויפֿצוגיין נאָך פֿארן שניי, ווינטערט איבער אונטערן שניי און ווערט פֿארטיג פֿריהער פֿאר אנדערע תבואות. אין אונזערע געגנטן זייט מען געוואוינליך ווינטערקאָרן.

אין דער ווייבער, פֿייכטער און ווארעמער ערד ווערט דער קאָרנקערנדל אנגעקוואַלן מיט וואסער, דער שאַלעכץ פלאצט, און עס באַווייזט זיך א דינער



די שפראַצונג פֿון א קערנדל תבואה (קאָרן).

- | | | |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|
| ה. דער הויפטוואָרצל. | ש. די שייד פונם ערשטן בלאָט. | ינגע קאָרן. |
| ב. דער בייוואָרצל. | ג. בל. דער ערשטער גרינער בלאָט. | ש. די בלאטשייד. |
| ק. די קנאָספּ. | | פ. דער בלאַטפלאַך. |
| | | ה. די בלאטהייטל. |

פּעדימל, וואָס איז באדעקט מיט הערעלעך, דאָס איז דער וואָרצל. נאָכן ערשטן וואָרצל באווייזט זיך א צווייטער, א דריטער און אזוי כּסדר; אין פּעדימל איז אזוי ווי דער אנדערער. ס'איז ניט קענטיג קיין אונטערשייד צווישן דעם הויפטוואָרצל און די נעבנוואָרצלען, דאָס איז א גאנצער בינטל וואָרצלען אָדער א בינטלוואָרצל. אין דערזעלביגער צייט גייט אויף א שפיציגע קנאָספּ; מיטן שפיץ שלאָגט זיך די קנאָספּ דורך דורך דער ערד און באווייזט זיך אויף דער ווייטער וועלט. אין איר געפּינט זיך דער שטאם און דער ערשטער בלאט. דער בלאט איז רויטליך און צונויפגעוויקלט; ער וויקלט זיך פּונאנדער ניט הויך איבער דער ערד, און פּון אים קומט שוין ארויס א צווייטער בלאט, א גרינער.

ווען מען פּארווייט עמליכע קערנער אויף נאסע לעשפּאפּיר איבער א גלאָז מיט וואסער, זעהט מען דייטליך, ווי דער קאָרנקערנדל גייט אויף. לאָמיר זיך פּריהער איינקוקן אויפּמערקזאם אויף דעם קערנדל אליין. ער איז באדעקט מיט א געלביכן שאַלעכץ, וואָס מען קען אים ביי א טרוקענעם קאָרן ניט אראָפּשיילן. ווען מען צערייבט דעם קערנדל מיט א שטיין אָדער אַן אנדער הארטע זאך, באווייזט זיך מעל. דאָס קערנדל האָט פּון איין זייט דורך די גאנצע לענג א רינגעלע. בעת מען ווייקט אים די קערנער אין וואסער, נעמט זיך די שאַלעכץ גרינג אראָפּ, און דאן זעהט מען אויפּן "רוקן" (אויף דער זייט, וואו קיין רינגעלע איז ניטאָ) דעם שפּראָצער. ער באשטייט פּון א וואָרצלעלע און א צוויינגעלע (א קנאָספּ מיטן אנפּאנג פּון שטאם און דעם ערשטן בלאט). דער שפּראָצער ליגט אויף א באזונדער בלעטעלע אָדער א שילד, וואָס טיילט אים אָפּ פּון דער מעליגער מאסע. דער שילד איז דער זאָטבלאט אָדער דער שפּראָצבלאט. ביי א בעבל, אַן ארבעס און נאָך ביי אפּולע מינים קערנער זיינען דאָ צוויי שפּראָצבלעטער, ביי קאָרן און ביי די איבעריגע תבואות איז דא נאָר איין שפּראָצבלאט. אויפּן נאסן פּאפּיר זיינען גוט קענטיג די ערשטע וואָרצלעלעך און דער ערשטער בלאט, וואָס איז צונויפגעוויקלט ווי א טרייבעלע. די מעליגע מאסע ווערט ווייך, פּליסיג, דאָס איז די שפּייז, פּון וועלכער עס לעבט און בייט זיך אויף דער יונגער געוויקס. דעריבער ווערט אָסדי מאסע וואָס ווייטער אלץ ווייניגער, ביז זי גייט אים אינגאנצן, און עס בלייבט איבער מערניט ווי דער פּוסטער שאַלעכץ. דער יונגער געוויקס קען זיך ווייטער אויפּן פּאפּיר ניט אנטוויקלען, ער שטארבט אָפּ; אין דער ערד אָבער אנטוויקלט ער זיך ווייטער, ווייל די וואָרצלען, וואָס לאָזן זיך אראָפּ טיף אין די פּייכטע שיכטן פּון באָדן, ציהען יניקה פּון דער ערד, און די בלעטער וואָס אנטוויקלען זיך, ציהען שפּייז פּון דער לופּט. אין קערנדל איז אויף אזא אופּן אנגעגרייט שפּייז פּאַר די ערשטע צייט, ביי וואנען עס וועלן זיך אנטוויקלען און פּאַרשטארקן די וואָרצלען און די בלעטער.

דער שטאם ציהט זיך אויס אינדערהייך ביז צוויי מעטער. ער איז דין, שלאנק און בייגעוודיג. פרובט אים איינבייגן צו דער ערד און איר וועט זעהן, ווי ער וועט זיך ווידער אויפהייבן. בעת א ווינט, הויבן זיך אויף אויפן קאָרנפֿעלד אזוי ווי כוואליעס: דאָס בייגן זיך צו דער ערד און גלייכן זיך ווידער אויס די הויכע און שלאנקע קאָרנשמענגלעך.

יעדער שמענגל איז א הארטער לאנגער שטרוי, אינווייניג איז ער פוסט, אנגעפילט מיט לופט. ער איז ווי א לאנגע רער, וואָס איז צעטיילט אויף עטליכע טיילן דורך שטארקע מאסיווע קניפלעך אָדער קניען. די קניפלעך מאכן דעם גאנצן שטרוי האפטיגער, שטארקער.

די בלעטער זיינען לאנג און שמאַל, געאָדערט אינדערלענג, זיי האָבן לאנגע און ברייטע שטילן, וואָס כאפן ארום, ווי שיידן, דעם שטרוי. דער שייד איז אָפגעטיילט פֿון בלאט מיט א הארטער הייטעלע. די טראָפנס וואסער, וואָס רינען אראָפ פֿונם בלאט, קייקלען זיך אראָפ פֿון זייטעלע אויף דער ערד צו די וואָרצלען און קלייבן זיך ניט צוואמען אין שייד, וואָס וואָלט אָנגעהויבן פֿוילן פֿון צופיל פֿייכטקייט.


דער בייגעוודיגער שטרוי ברעכט זיך ניט פֿון ווינט, דאָסגלייכן די לאנגע און שמאַלע בלעטער, וואָס פֿלאטערן, ווי פֿאָנעס, און באוועגן זיך גרינג אין דער זייט, אין וועלכער דער ווינט ווייהט.

אויפֿן שפיץ פֿון שטרוי אנטוויקלט זיך א לאנגער און א שווערער זאנג. יעדער זאנג באשטייט פֿון אפֿולע קליינע זאנגען; יעדער קליינער זאנג פֿון צוויי בלומען. די בלומען זיינען אויפֿן ערשטן קוק גאָרניט ענליך צו דעם, וואָס מיר זיינען געוואוינט צו רופֿן בלומען, זייער פֿארב איז פֿריהער גרין, און דערנאך געל, ווי דער גאנצער שטרוי, יעדער איינציגער קליינער זאנגעלע האָט צוויי הארטע זאנגענשופעלעך, און יעדער בלימעלע ווידער צוויי בלומענ-שופעלעך: איינע א לענגליכע, וואָס ענדיגט זיך מיט א לאנגן האריגן שפיץ (א גראנע) און א קלענערע אָהן א שפיץ; ביידע שופעלעך כאפן ארום דעם פעסטל מיט צוויי פֿעדערדיגע מיילער און דריי שטויבפֿעדים מיט לענגליכע שטויבבייטלען. די פֿארטיגע שטויבפֿעדים רוקן זיך ארויס פֿון זאנג. די בייטעלעך עפענען זיך אין זוניגע מעג. דער קלענסטער ווינטל כאפט אנטער דעם טרוקענעם שטויב און פֿארווייהט אים אין אלע זייטן. די פעסטלעך נעמען אים גרינג אויף מיט זייערע האָריגע פֿעדים. אפֿולע שטויב גייט אינוועץ, אָבער ער ווערט אויפֿן קאָרנפֿעלד אזויפיל געשאפֿן, אז די באַרוכפֿערונג איז געזיכערט. די געדיכטקייט פֿון פֿעלד איז אויך א גוטע מעלה דערצו.

די אָפגעליידיגטע שטויבבייטעלעך פֿאלן אראָפ, און פֿון פעסטל אנט-וויקלט זיך דער ברויטקערנדל. בעת די קערנער ווערן געל, טרוקן און

הארט, שניידט דער מענש אפ די קארן. אויב מען זאל עס לאָזן וואקסן צו לאנג, וועלן זיך די קערנער אליין ארויסשיטן פֿון די זאנגען.

די ווייסע מעליגע מאסע און די קערנער באשטייען פֿון קראַכ מעל און ווייסל (דערזעלביגער שטאָף, וואָס געפינט זיך אין א ווייסל פֿון אן איי); דערפֿאר איז ברויט אזוי זעמיג. די קערנער צעמאָלט מען צווישן די מילשטיינער, דערביי לאָזט מען זיי דורך דורך א זיפ. די מעל גייט דורך, און דער צעריבענער שאַלעכין, די קלייען, בלייבט אין זיפ. די קלייען איז אויך זעהר זעמיג, אָבער דער מענשליכער מאַגן פֿאַרדייט אים שווער. דערפֿאר קאַרמעט מען מיט די קלייען בהמות. דער שמרוי איז אויך זעהר נוצליך. זאָגט אליין, ווי מען נוצט עס אויס. פֿון קארן טרייבט מען אויך בראַנפֿן און שפירעט.



(א) האָבער, (ב) גערשטן, (ג) ווייץ, (ד) קארן.

פֿון „קדעמעלין. לייטע. ס. ד. באַטאנא. אונטערריכט“, פֿאַרלאַג B. G. Teubner אין לייפציג און בערלין.

ווייץ.

וויצענע מעל איז נאך בעסער פאר קארענע; זי ווערט גרינגער פארדייט און איז גאך זעמיגער. ווייץ וואקסט נישט גאר אויף א פעטן הומוסבאדן. זי גייט זיך אויך אין א ווארעמערן זומער, ווי קארן. דערפאר איז ווייץ אין אונזערע קאמפן וויינגער פארשפרייט. ווייץ אנטוויקלט זיך, וואקסט, בליהט און באשטויבט זיך אזוי, ווי קארן. עס זיינען פארהאנען אפולע מינים ווייץ. די זאנגען זיינען גרעכער, ווי ביי קארן. יעדער זאנגעלע באד שטייט פון פיר בלימעלעך. גרינג איז צו אונטערשיידן דעם מין ווייץ, ביי וועלכן די שופן זיינען אהן גראנען (האריגע שפיצן). וויצענע קערנער זיינען עטוואס גרעסער, ווי קארענע.

נערשמן.

נערשמן איז נאכמער פארשפרייט, ווי קארן. ער וואקסט אפילו אין לענדער מיט גאר א קורצן און קילן זומער (ווייט אין צפון און אויף הויכע בערג). נערשמן וואקסט נישט אזוי הויך, ווי קארן. זיינע גראבע זאנגען האבן לאנגע און שיינע גראנען. מיט נערשמן קארמעט מען עופות; פון נערשמן מאכט מען געשמאקע און זעמיגע גרויפן (פערגרויפן) און מען בריייהט ביר. אויב אין דעם ארט, וואו איר וואוינט, איז דא א בריוו, דערווייטט זיך דארטן, ווי מען מאכט ביר.

האָבער.


האָבער איז אויך שטארק פארשפרייט. דאָס איז די וויכטיגסטע פֿומער פאר אונזערע בהמות, דערהויפט פאר פֿערד. פֿון האָבער מאכט מען האָבערנע גרויפן. האָבער איז א זומערתבואה, פונקט ווי נערשמן. די קערנער זיינע וואקסן נישט אין זאנגען, נייערס אין בעזעמלעך. וועלכע נאָך תבואות זיינען אייך באוואוסט? וועלכע זיינען מער פֿאר-שפרייט אין דער געגנט, וואו איר וואוינט?

פֿלאַקס.

פֿלאַקס (אָדער לייז) וואקסט אנדערס, ווי תבואה; ער האָט גאר אנדערע זאָט (זאָמען), בלעטער, בליהונג און שמענגלעך. דער מענשט אָבער פֿאר-זייט עס אויף זיינע פֿעלדער אין שכנות מיט קארן און אנדערע תבואות. פֿלאַקס זייט מען זעהר געדיכט. וואָס געדיכטער, אלץ דינער זיינען די פֿלאַקסשמענגלעך און אלצמער ציהען זיי זיך אויס אינדערהיך צו דער זון.


דער שמענגל צווייגט זיך נאָר אין אויבערשטן טייל; ער איז באוואקסן מיט קליינע לענגליכע בלעטעלעך. די בליהונג פֿון פֿלאַקס איז הימלבלוי. איטלעכע בלימעלע איז ווי א קליינער שמערן מיט א גרינער שיסעלע, א פֿינפֿבלעטערדיגן קרענצל, מיט פֿינף שטויבפֿעדן. דער פעסטל איז אויך מיט פֿינף מיילער. די פֿרוכט איז א גרינע קעפעלע (א קאפּסל). זי איז צע-טיילט אויף עטליכע פֿעכער מיט קליינע פּלאַציגע בליסטשעדיגע קערנער. אז מען צערייבט א קערנדל אויף פּאפּיר, בלייבט א פֿעטער פֿלעק. פֿון די זאַמען פרעסט מען אויס אייל (ליינאייל).

דער פֿלאַקסשמענגל איז ניט קיין פּוסטער, ער איז אינווייניג האַרט, האַלציג, פֿונאויסן האָט ער א דינע הייטל (קארע), אונטער דער הייטל א שיכט באסט אָדער לוב, וואָס באשטייט פֿון זעהר דינע און שטארקע פֿעדן. אַמדי פֿעדן גיבן דאָס צו דעם דיגעס שמענגל פֿעסטקייט, זיי מאַכן אים בייגעוודיג, ער בייגט זיך פֿון ווינט, אָבער ברעכט זיך ניט. שוין פֿון פֿאַרצייטן אָן האט זיך דער מענש אויסגעלערנט צו באארבעטן און אויסצונוצן אַמדי פֿעדן.



בליהענדיגער פֿלאַקס.
פֿון „קרעטעלין, לייטפֿ. פֿ. ד.
באַטאַנישן אונטערריכט“,
פֿלג. B. G. Teubner
לייפּציג און בערלין.

בעת די פֿלאַקס בליהט אָפּ און דער שמענגל ווערט געל, צופּט מען אויס די שמענגעלעך פֿון דער ערר. די פֿרוכטקעפלעך נעמט מען אראָפּ מיט אַן אייזערנע קאם. די בינמלעך פֿלאַקס פֿאַרווייקט מען אין שטייענדיגן וואסער (מען קוועטשט זיי צו מיט שטיינער, זיי זאָלן ניט ארויפֿשווימען) אויף 5—10 מענ. דאס האַלץ און די קאָרע הויבן אָן צו פֿוילן. נאָכן ארויס-נעמען פֿון וואסער, טריקנט מען עס אויפֿן זון. דערנאָך הויבט מען אָן די פֿלאַקס צו באארבעטן: קלאפּן רייבן און קעמען. די קאָרע צערייסט זיך, די האַלץ צעברעקלט זיך, און די לאנגע, דינע און שטארקע פֿעדן טיילן זיך אָפּ און ווייזן אויס, ווי שיינע ווייכע בלאַנדע האָר. פֿון זיי שפינט מען פֿעדן און פֿון די פֿעדן וועבט מען לייזונט. די לייזונט איז גרויליך, מען בלייכט עס אויפֿן זון און אויפֿן פֿראַס, ביז זי ווערט ווייס. קאָנאָפּלעס ווערט אויך פֿאַרווייט צוליב די פֿעדן, וואָס מען ארבעט אויס פֿון זיינע באסט. די פֿעדן פֿון קאָנאָפּלעס זיינען ניט אזוי גוט, ווי די פֿלאַקספֿעדן, מען מאכט פֿון זיי שטריק און פֿראַסערע זאַרטן לייזונט. קאָנאָפּלעס איז א הויכער אייגענשאַפטדיגער צווייהויזיגער געוויקס. די מעגליכע און ווייבליכע בלומען זיינען ניט



קאנאָפּלע.

פֿון „קרעמעלין, לייטע. פֿ. ד. באַשאַנ. אינטעררייכט“, פֿלנ. B. G. Teubner ליפּציג און בערלין.

קיין קענטיגע און וואקסן אויף צוויי באזונדערע געוויקסן. מיט די קליינע פֿעטע קערנדלעך קאַרמעט מען פֿויגלעך און מען פרעסט אויס פֿון זיי אייל. פֿלאקס און קאָנאָפּלעס באארבעט מען אין די דערפֿער מיטן האנט און אויף פֿאבריקן מיט מאשינעס.

דער מענש און דאָס פֿערד.

אין אלע לענדער, אין אלע טיילן וועלט פֿארנעמען זיך מענשן מיט ערד-ארבעט. פֿון פֿעלד ציהען זיי חיונה און גיבן אים אָפּ זייערע בעסטע כוחות און געדאנקען; שוין טויזנטער יאָרן אקערט דער מענש די ערד. ס'זיינען אָבער געווען צייטן, בעת ער האָט פֿון דער ארבעט גאָרניט געוואוסט. דער מאַלט איז ער געווען א יעגער, וואָס פֿלעגט בלאנדזשענען דורך געדיכטע וועלדער. יאגדעס, וואָרצלען און רויהע פֿלייש פֿון ווילדע חיות, דאָס איז געווען זיין שפיז. אָרעם און געפֿערליך איז געווען דאָס לעבן פֿון אזא וואלדמענשן. ער פֿלעגט פֿיטערן בהמות אין ברייטע און וויסע מדבֿריות און פֿלעגט שטענדיג מוזן ארומוואנדערן, זוכנדיג פֿוטער פֿאר זיין פֿיך. ווען דער מענש האָט זיך אָבער אויסגעלערנט באארבעטן די ערד, זייען און שניידן תבואה, האָט ער זיך באזעצט אויף א שטענדיגן אָרט און האָט זיך צוגעבונדן צו דער ערד, וואָס גיט אים זיין ברויט. פֿון יענער צייט אָן איז זיין לעבן געוואָרן רייכער און זיכערער.

וואָס בעסער דער מענש באארבעט די ערד, אלץ מער ברענגט זי אים איין. דערפֿאר שטרענגט ער אָן זיינע כוחות און זיין גאנצן שכל, כדי אויס-צובעסערן די ארבעט. די וויסנשאַפֿט האָט באַוווּן, פֿון וואָס די געוויקסן באשטייען און אין וואָסערע שטאָפֿן זיי נויטיגן זיך, וואָס זיי באקומען פֿון דער ערד און וואָס מען מוז דער ערד צוגעבן, בעת זי ווערט אויסגעמאָגערט. אפֿילו די גיט געלערנטע ערדארבעטער האָט שוין דאָס לעבן אליין באוווּן, אז אויב מען פֿארזיט עמליכע יאָר גאָכאנאנד אויף איין פֿעלד דיוועלביגע תבואה, ווערט די גערעטעניש אלץ קלענער; דערפֿאר מיסטיגט מען די פֿעלדער און מען לאָזט די ערד זיך אָפרוהען. מען צעטיילט דאָס פֿעלד אויף דריי פּאסן. אויף איין פּאס פֿארזיט מען ווינטער-תבואה, אויף דעם צווייטן — זומער-תבואה, דעם דריטן לאָזט מען ליידן, מען צעאקערט גאר גוט, די ערד זאָל זיך דורכלופֿטערן און אנזאפֿן מיט וואסער. דאָס איז די דרייפֿעלדיגע סיסטעם. אזוי באגייען זיך די פּויערים אין רוסלאנד. דערביי גייט אבער יעדן יאָר אינוועץ א דריטל פֿעלד, איז דאָ גאָך א סיסטעם.

גיט אלע געוויקסן נעמען פֿון דער ערד דיוועלביגע שטאָפֿן, גיט אלע ציהען יניקה פֿון דעמועלביגן שיכט פֿון באָדן. אזוי, למשל, ווייזט זיך ארויס, אז געוויקסן, וואָס צעשפּרייטן זייערע וואָרצלען אינדערברייט און גיט אינדערטוף, מאכן מאָגער גאָר דעם אויבערשטן שיכט פֿון באָדן, דעריבער קען מען גאָך זיי זעהן גוט פֿארזייען פֿלאנצן, וועלכע וואָרצלען זיך טיף און ציהען זייער יניקה פֿון די טיפֿערע שיכטן. אנדערע פֿלאנצן לאָזן גאָך זיך וואָרצלען, וועלכע ווערן צעפּוילט און מאכן פֿרוכפֿערדיג די ערד; למשל, בעבלעך, ארבעס

און אנדערע שמעטערלינגבלומיגע געוויקסן. אויף אזא אופן קען מען אויס-
נוצן דאָס גאַנצע פֿעלד, בייטנדיג די פֿלאַנצן. דאָס איז די פֿיל פֿעלדיגע
סיסטעם. דאָס פֿעלד ווערט צעטיילט אויף אפֿולע פּאַסן, אויף וועלכע מען
פֿאַרווייט פֿאַרשידענע מינים תבואה. און איטלעכן יאָר בייט מען זיי לויט א
געוויסן קור. אזא סיסטעם גיט גוטע רעזולטאַטן. זי איז איינגעפֿירט אין
אלע קולטורעלע לענדער.

וואָספֿאַר א סיסטעם איז איינגעפֿירט אין אייער געגנט?

שוועמלעך — פֿאַראַזיטן אויף תבואה.

אויפֿן קאָרנפֿעלד וואַרפֿן זיך אמאָל אין די אויגן זאגנען, וואָס פֿון זיי
שמעקן ארויס לענגליכע האַרמע און שוואַרצע קערנער. דאָס איז מוטער-
קאָרן. אטרי גרויסע קערנער זייגען גיפֿטיג. ווען מען מישט זיי צו צו מעל,
ווערט דער מענש דערפֿון שווער קראַנק און קען אפֿילו שטאַרבן. סווייזט זיך
ארויס, אז דאָס זייגען קליינע שעדליכע שוועמלעך, וואָס באַזעצן זיך אויפֿן
פעסמל און וואַקסן זיך פֿונאַנדער, ביוואַנען עס ווערן די גרויסע שוואַרצע
קערנער, וואָס שמעקן ארויס פֿון זאגן.

זיי פֿאלן אַראָפּ אויף דער ערד, ווינטערן איבער, אין פֿרילינג באַווייזן זיך
אויף זיי פֿעדימלעך מיט רויטע קעפֿלעך, ווי שפּילקעלעך. פֿון די שפּילקעלעך
שיט זיך ארויס שטויב, דאָס איז זייער זאָמ. אויב דער ווינט פֿאַרטראָגט
די שטויבונגע זאָמ אויפֿן פעסמל, וואַקסט זי זיך פֿונאַנדער אויף אים. פֿלאַנצן
און דערהויפּט באַשעפֿענישן, וועלכע באַזעצן זיך אויף אנדערע און לעבן
אויפֿן חשבון פֿון די באַפֿאַלענע, רופֿט מען פֿאַראַזיטן. די פֿאַראַזיטן לאָזן
ארויס פֿון זיך א זיסן זאַפֿט (האַניג), דער פעסמל ווערט קלעפּיג און ציהט צו
אינוועקטן. אַריבערפֿליהענדיג פֿון איין זאגן אויף דעם אנדערן, פֿאַרטראָגן די
אינוועקטן די קראַנקייט איבערן גאַנצן פֿעלד, און סוף וומער וואַקסט אויס
אויף די אַנגעשמעקטע זאגנען דער שוואַרצער שוועמל. עס איז שווער ביי-
צוקומען דעם פֿאַראַזיט. ניטוויילנדיג פֿאַרטראָגט מען אים מיט די געוונטע
קערנער אין שייער, אָדער מען פֿאַרווייט אים אין פֿעלד.


אויף האַבער, זעלמענער אויף קאָרן, פֿאַרשפּרייט זיך נאָך אַן אנדער
פֿאַראַזיט: אויף די בלעטער באַווייזן זיך געלע פֿלעקן, ווי ראָסט אויף איין.
דאָס זייגען קליינע שוועמלעך. זיי ציהען די זאַפֿט פֿון בלאַט, און די
תבואה קען זיך צוליבעם גיט אַנטוויקלען.

נאָך שעדליכער איז אַן אנדער סאָרט פֿאַראַזיטישע שוועמלעך, וואָס
וואַקסן אויף די קערנער. מען רופֿט זיי „בראַנדשוועמלעך“, ווייל די קערנער
ווערן אזוי ווי פֿאַרברענט, זיי פֿילן זיך אַן מיט א שוואַרצער שטינקעדיגער מאַסע.

שעדליכע קרייטיכער אויפן פעלד.

אויפן פעלד מיטן גוט צעאקערטן באָדן, מיט די הויכע און געדיכטע תבואהשמרוי, וואָס שיצט פֿון ווינט, באשאפֿן זיך גינסטיגע באדינגונגען פֿאַר אפֿולע ווילדע געוויקסן. דער מעגש קוקט אויף זיי, ווי אויף שעדליכע קרייטיכער, ווייל זיי ציהען שפייז פֿון באָדן און שטיקן די תבואה. צו דעם מין געוויקסן געהערן די בלויע קאַרנבל לומען אדער די קאַרנעדעלעך.

די בלויע קאַרנבלום געפֿינט מען גיכער פֿאַר אלץ אויפֿן קאַרנפֿעלד, ווייל זי איז גוט צוגעפֿאסט צו א זאמדיגן באָדן. אירע שמאַלע און באהאַרטע בלעמעלעך דעמפֿן גיט אויס קיין פֿולע וואסער. אירע קליינע בלימעלעך זיינען צוזאמענגעגענומען אין א שיינע קעפעלע. פֿון ערשטן בליק קען מען מיינען, אז דאָס איז איין בלום, אינדראַמתן אָבער איז דאָס א גאנצער געזעמל פֿון בלומען (א געבליים). יעדער בלימעלע פֿאַר זיך וואָלט גאַרניט קענטיג געווען, אלע צוזאמען בלויזן זיי זיך פֿונדערווייטן אין געדיכטן פעלד און קענען אויסהאלטן אויף זיך א שווערן אינסעקט. אין קעפעלע באַמערקן מיר צווייערליי בלומען: אויסערליכע און אינערליכע. די גרעסערע אויסערליכע בלומען האָבן די פֿאַרמע פֿון א בעכערל מיט פֿינף שפיצן, וואָס איז אונטן דין ווי א רערעלע. זיי האָבן גיט קיין שטויבפֿעדים, גיט קיין פעסטל און גיבן גיט קיין פֿרוכט, זייער זאך איז נאָר צוציהען צום געוויקס אינסעקטן. די אינווייניגסטע בלומען זיינען קלענער. כדי זיי בעסער צו זעהן, דאַרף מען אויף זיי קוקן דורך א פֿאַרגרעסערנלאָז. יעדע בלימעלע איז א רערעלע. פֿונאַונטן זעהט זיך דער קניפל (די פֿלעשעלע) פֿון פעסטל; אויבן איז די רערעלע אזוי ווי אַנגעבלאָזן און ענדיגט זיך מיט פֿינף שפיצן, פֿון זיי קוקט ארויס דער פעסטל מיט צוויי מיללער און ארום אים די צוזאמענגעוואקסענע שטויבפֿעדים.




מוטער האָרן.


פֿון „קרעפֿעלין, לייטס. פֿ. ד. באַטאַנ. אונטערריכט.“ פֿאַרלאַנג
B. G. Teubner, לייפּציג און בערלין.

אין האַרבסט שיטן זיך די קליינע פֿרוכטקערנדלעך ארויס, און דער ווינט פֿארטראגט זיי און פֿארזייט זיי. אַפֿטמאָל טוט דאָס, ניטוילנדיג, דער פּויער אליין. ער פֿארטראַגט די קערנדלעך צוזאמען מיט די תבואה אין שיער אריין און פֿארזייט זיי דערנאָך אויפֿן פֿעלד.

געוויקסן מיט אוינע בלומען הייסן קאַרבבלומיגע, ווייל די איינצלנע בלומען זיינען פֿאראייניגט צוזאמען אין א קעפל אָדער א קאַרב, וואָס זעהט אויס ווי איין גרויסע בלום. קאַרבבלומיגע גע-



ראמומקע.



קאַרבבלום.

פֿון „קרעמעלינס לייטפֿ. פֿ. ד. באַטאַנ. אונטערריכט“ פֿאַיל. B. G. Teubner אין לייפּציג און בערלין.

וויקסן זיינען זעהר פֿארשפּרייט אין דער נאטור. אין פֿעלד, אויפֿן וועג צווישן די זאנגען, קענט איר זיי אויך געפֿינען. אט וואקסן ראמומקעס. זייער קאַרב באשטייט פֿון צווייערליי בלומען, וויסינקע צינגעלעך ארום, און קליינע געלע טרייבעלעך אינמיטן.


די הויכע שמעכעדיגע דיסל איז אויך א קאַרבבלומיגער געוויקס, אירע בלומען זיינען רויטליך-וויאַלעט. די קערנדלעך האָבן א קרוין פֿון דינע הערעלעך, דער ווינט כאפט זיי אונטער און פֿארזייט זיי אויפֿן פֿעלד, דער-

פֿאַר איז שווער זיי אויסצוראטן. זיי וואקסן זיך פֿונאנדער און שטיקן די
תבואה מיט זייערע וואַרצלען.
וועלכע קאַרבבלומיגע געוויקסן זיינען אייך נאָך באקאנט? וועלכע פֿעלד-
קרייטיכער זיינען אייך נאָך באוואוסט?

די איינוואוינער פֿון פֿעלד.

מיר ווייסן, אז אין וואלד לעבן אפֿולע קליינע און גרויסע חיות, זיי גע-
פֿינען דאָרטן שפייז און א באהעלטעניש אין אן אומוועטער און אין א געפֿאַר.
דאָס פֿעלד קען זיך ניט גלייכן מיטן וואלד. קורץ איז דאָס לעבן פֿון דער
תבואה אויפֿן פֿעלד, און שוואך איז דער שוין, וואָס מען קען געפֿינען אונטער
די זאנגען בשעת אן אומוועטער. פֿונדעסטוועגן וואוינען אין פֿעלד אפֿולע
באשעפֿענישן.

די גרויליך-געלע פֿעלדמויז איז א לעסטיגער איינוואוינער אויפֿן פֿעלד.
זי גראָבט זיך אויס א גאָרקע אין דער ערד און שלעפט אהין קערנער.
ארויפֿקלעטערן ביז צו די זאנגען קען זי ניט, דערפֿאַר בייסט זי אָפֿ דעם
שטרוי פֿונאונטן און פֿאַרשלעפט אים מיטן זאנג צוואמען צו זיך אין גאָרקע
אריין.



פֿעלדמויז.

פֿון „מיינהאלדס טירבילדער“, פֿלג. צ. צ. מיינהאלד א. זעהנע אין דרעזדען.

די פעלדמויז האָט אַ גרעבערן קאָפּ און אַ קירצערן עס. ווי די הויזמויז.
זי פאַרמערט זיך זעהר שטאַרק און מאכט אָן פֿיל שאַדן אויפֿן פֿעלד.
דער ליבליכער לאַרך באַזעצט זיך אויך אויפֿן פֿעלד. גאָיף דער ערד אין
אַ גריבעלע בױט ער אויס זיין נעסט פֿון גראָז און שטרױעלעך און לייגט אַ-



דער לאַרך.

פֿון „פראַנקערשטייל, רעאליענבוק, ב'ד I, אויסג. A. פֿלנ. B. G. Teubner אין לייפּציג און בערלין.

היין אריין זיינע ברוינגעשפּריצטע אייער. זיינע פֿעדערן זיינען אויך ברוינליך-
גרוי, זייער פֿאַרב איז ענליך צו דער פֿאַרב פֿון דער ערד. פֿלינק און לייכט
באָזעגט ער זיך צווישן די זאָנגען, דערביי העלפֿט אים זעהר דער הינטערשטער
פֿינגער מיט זיין לאַנגן קראָל.

ער שפייזט זיך מיט אינסעקטן, קערנער און מיט יונגע נאָרוואַס אויפֿ-
געגאנגענע תבואה. ער קומט צופֿליהען גאָר פֿריה אין פֿריהלינג, ווינאָר דער
שניי הייבט אָן צו צעניין. זיין ליבער געזאנג הערט זיך פֿון מארט ביו טיף
אין זומער אריין. ער הייבט זיך אויף הויך, הויך אין דער לופֿט, מען קען אים
קוים מיטן אויג דערזעהן, און שוועבנדיג זינגט ער זיין קלינגעדיג ליד. אין
האַרבסט פֿאראייניגן זיך די לאַרכעס אין גרויסע טשאטעס און פֿליהען אוועק
אין די וואַרעמע לענדער.

דער רעגנוואַרעם.

דעם קליינעם רעגנווערעמל קען מען געפֿינען ניט גאָר אויפֿן פֿעלד,
נייערט אומעטום אין דער ערד: אין גאַרטן, אויפֿן לאַנקע, אויפֿן ברעג
פֿון וואסער און אין וואלד. אָבער דעם גרעסטן באשטייט האָט ער פֿאר די
פֿעלדער. איר האָט אים געוויס געזעהן, אויב אייך איז אויסגעקומען וועג-
עסאיז צו גראָבן די ערד.

דער רעגנוואַרעם באהאלט זיך אין דער ערד אין א לעכעלע אָדער א
רערעלע, וואָס איז אזוי גרויס, ווי זיין גוף. ער עטעמט אריין די לופֿט דורך
די הויט פֿון זיין גאנצן גוף. אָבער דורך א טרוקענע הויט איז שווער צו
עטעמען, דעריבער איז זיין הויט שמענדיג פֿייכט, שליימיג. פֿרובט אים
אָנרירן מיט דער האנט, וועט איר דאָס דערפֿילן. דערפֿאר האָט ער אויך
מורא פֿאר די זון און קריכט ארויס פֿון דער ערד גאָר ביינאכט אָדער גאָך
א רעגן.

זיין גאנצער גוף באשטייט פֿון אפֿולע קליינע רינגען. פֿונאונטן און
פֿון די זייטן האָט ער גאנץ קליינע הערעלעך, מיט זיי שפארט ער זיך איין
אין באָדן, בעת ער קריכט. ער באוועגט זיך דורכדעם, וואס פֿאַרנט ציהט ער
זיין גוף אויס און הינטן ציהט ער אים צוגיף.

בעת ער קריכט אריין אין דער ערד, ציהט ער שטארק אויס די פֿאָדערשמע
רינגען, זיי ווערן גאָר דין און מיט זיי גראָבט ער זיך אריין מיטן קאָפּ פֿאַרויס
אין דעם ווייכן באָדן. דערביי העלפֿט ער זיך דערמיט, וואָס ער געמט אריין
די ערד אין מויל, לאָזט זי דורך דורך זיין גאנצן אינגעווייט און ווארפֿט זי
ארויס פֿונהינטן אויפֿן אויבערפֿלאַך. אויף אזא אפֿן טוט ער אָפּ מיט-
אמאָל צוויי ארבעטן: ער פֿאַרקריכט אין דער ערד און שפייזט זיך אין דער-
זעלביגער צייט מיט דער פֿוילעכץ, וואָס געפֿינט זיך דאָרטן. ער האָט
ניט קיין ציינער און קיין מוילצווענגלעך, ווי די אינסעקטן, און גריועט ניט
קיין וואַרצלען פֿון געוויקסן. אָפֿטמאָל ביינאכט ציהט ער אריין אין זיין לעכל
בלעטער, אָבער ער שפייזט זיך מיט זיי ערשמ דאָן, ווען זיי ווערן פֿאַרפֿוילט

אין דער ערד. דאָס רוב זיינען דאָס קרויטבלעטער. ער דערקענט זיי, ווי עס ווייזט אויס, נאכן ריח, ווייל קיין אויגן האָט ער ניט. ער דערפֿילט דעם קלענסטן טרייסל און באהאלט זיך גלייך אין דער ערד. ניט האָבנדיג קיין אויגן, דערפֿילט ער דאָך ליכטיקייט. ער קריכט תיכף אריין אין דער ערד, ווען מען באלייכט אים אינדערפֿינסטער מיט אַ לאַמטערנע. ער פֿארמערט זיך דורך זיינע שליימיגע אייער.

די רעגנווערים האָבן דעם גרעסטן באטייט אין דער נאטור: זיי העלפֿן שאַפֿן אַ פֿרוכפערדיגן באַדן. אווויז זיי צעלעכערן דעם באַדן, קומט אין אים אריין מער לופֿט און פֿייכטיקייט. זיי לאָזן דורך די ערד דורך זייער גוף און מאכן זי ווייכער. זיי ציהען אריין בלעטער אונטער דער ערד און מאכן זי דערמיט רייכער מיט פֿוילעכץ. אזוי אקערן און מיסטיגן זיי אָהן אַן אויפֿהער די ערד.

דער רעגנוואַרעם האָט אפֿולע קרובים, וואָס לעבן אין דער ערד, אין וואסער און אפילו אין גוף פֿון אנדערע חיות, ווי פֿאראזיטן. די נאטור פֿאַרשער טיילן זיי אויס אין אַ באזונדערע גרופע אָדער טיפ בעלי־חיים, וואָס זיי רופֿן אָן ווערים. ווערים האָבן אַ ווייכן גוף מיט אַ פֿייכטע שליימיגע הויט, דורך וועלכע זיי עטעמען. ביי דעם גרעסטן טייל ווערים איז דער גוף צעגלידערט אויף רינגען. זיי האָבן ניט קיין ציינער און קיין מויל־צווענגלעך און קענען זיך שפייזן נאָר מיט נאָר ווייכע שטאָפֿן אָדער מיט זאפֿטן.

אויף דער לאַנקע.

ווילדע תבואה.

ווי אַ שיינער בונטער טעפעך ליגט פֿאַר אונז די לאַנקע. פֿון דעם גע- דיכטן גרינעם גראַז קוקן ארויס טויזנטער פֿאַרביגע בלומען. די גרינע גראַז איז ווילדע תבואה. ס'איז פֿאַרהאנען זעהר פֿיל מינים ווילדע תבואה. בעת מיר קוקן זיך צו געהענטער צו די גרעזער, באמערקן מיר גלייך, ווי גאָהענט זיי זיינען צו תבואה. דער שטאם איז אַ פוסטער שטרוי, וואָס ווינט זיך פֿון ווינט, אָבער ברעכט זיך ניט; די שמאָלע און לענגליכע בלעטער כאפֿן ארום מיט זייערע שידן דעם שטרוי; די בליהונג איז צונויפֿגעקליבן אין זאנגען אָדער אין בעזעמלעך, ווי ביים האָבער. די זאנגען און די בעזעמלעך זיינען צונויפֿגעשטעלט פֿון אוינע קליינע און גיטקענטיגע בלומען, אַז נאָר דורך אַ פֿאריגרעסערנלאַז קען מען זיי דייטליך זעהן. בעת זיי שטויבן, רוקן זיך


ארויס פֿונם זאנג געלכליכע און ברוינליכע שטויבפֿעדעם; זיי באשטויבן זיך, ווי די פֿעלדטבואה, דורכֿן ווינט.

זיי וואקסן גוט אויף איטליכן באָדן, און מיר געפֿינען זיי אומעמוס, אפֿילו אויפֿן שיטיגן זאמד. זיי פֿארמערן זיך גיט גאָר מיט קערנדלעך. מער

פֿאר אלץ פֿארמערן זיי זיך דורך "אפֿלויפֿער", וואָס דער וואָרצלשטאם לאָזט ארויס פֿון זיך אין אלע זייטן. פרובט אויסגראָבן פֿון דער ערד א ווילדע תבואה, וועט איר זעהן, וויפֿיל אפֿלויפֿער מיט קנאָספֿן וויער לענגליכער וואָרצלשטאם פֿארמאָנט. געוואוינטליך שניידט מען אָפֿ די גראָז פֿריהער, איידער עס ווערט פֿארטיג די פֿרוכט (די קערנדלעך), און פֿונדעסטוועגן וואקסט זי ווידער אָפֿ; דאָס איז מעגליך גאָר דערפֿאר, ווייל דער וואָרצלשטאם בלייבט אין דער ערד און שטעלט ניט אָפֿ זיין ארבעט נאכן היישניט. פֿון אַמדי מינים ווילדע תבואה, וואָס פֿארשפרייטן זיך אויף די ברויטפֿעלדער און נעמען צו שפייז און ליכטיקייט פֿון אונזערע תבואות, איז זעהר שווער פֿטור צו ווערן. מען שניידט זיי אָפֿ צוזאמען מיט דער תבואה, אָבער זיי וואקסן ווידער אָפֿ פֿון וואָרצלשטאם.

אפֿולע פֿון די ווילדע תבואות האָבן א גרויסן באטייט פֿארן מעגשן, ווייל פֿון זיי באקומט זיך דער בעסטער היי פֿאר אונזערע בהמות. זעהר א זעטיגער היי באקומט זיך פֿון אויסגע-טריקנטע טימאָפֿייגראָז (טימאָפֿעיעווקע). די טימאָפֿייגראָז האָט לענגליכע, זעהר געדיכטע זאנגען, ווי בערשמעלעך. מען פֿארזיט זי אויכעט קינסטליך אויף גאנצע לאַנקעס.

די בליהונג פֿון דער ווילדער



פֿעלדגרעזער.

(א) טימאָפֿייגראָז (פֿערעגראָז); (ב) שמעקעדיגע גראָז; (ג) פֿלעוועל

פֿון „קרעמלין, לייטפֿ. פֿ. ד. באַשאַנ. אינטערריכט“ פֿאַרלאַג B. G. Teubner אין לייפּציג און בערלין.


תבואה איז אוי קליין, אז עס איז שווער צו אונטערשיידן איין מין פֿון דעם אנדערן. געפֿינט אויף דער לאַנקע טימאָפֿייגראַז און ציטערגראַז. די ציטערגראַז האט פלאַציגע ברוינליכע זאנגעלעך אויפֿן בעזעמל, זיי ציטערן פֿון קלענסטן ווינטל. די יאָזשיקעס האָבן האַרמע שופֿעלעך אין די זאנגען.

די איבעריגע געוויקסן אויף דער לאַנקע.

די איבעריגע געוויקסן אויף דער לאַנקע האָבן פֿאַרביגע און אָפֿט שמעקעדיגע בלומען און ווערן באשטויבט דורך אינסעקטן. שוין איז די לאַנקע אין אַ וויניג טאג. אויב איר וועט זיך פֿאַר- אינטערעסירן מיטן לעבן אויף אזא לאַנקע און וועט זיך אָפֿשטעלן, כדי זי שטיל צו באוואונדערן, וועט איר באנעמען אַ זשוזשען און אַ זומען פֿון אינסעקטן, וואָס פֿליהען פֿון בלום צו בלום, פֿאלן צו צו אַ בעכערל פֿון אַ שמעקעדיגער בלום, ווערן אזוי ווי פֿאַרגליווערט אויף אַ רגע און פֿליהען שוין צו אַן אנדער בלום. אָפֿטמאָל קענט איר דערביי באמערקן, אַז געוויסע אינ- סעקטן האָבן זייערע באליבטע בלומענשפייזער. זיי געפֿינען זיי גלייך צווישן אנדערע און מיידן אויס די איבעריגע. אזוי פֿליהט די פֿערבין אויף אַ לאַנקע, וואָס איז רייך מיט קלעווער (דרייבלאט), נאָר אויף די רויטע און די ווייסע קעפֿעלעך פֿון קלעווער; אמאָל קענט איר זעהן, ווי זי קלייבט אויס נאָר רויטע קאָרנבלומען.

דורכן פֿריהלינג און זומער ביים זיך אייניגע מאָל דער אלגעמיינער בילד פֿון דער לאַנקע. פֿאַרשידענע געוויקסן האָבן זייער באשטימטע צייט צו וואקסן און צו בליהען. אין די ערשטע מעג פֿון פֿריהלינג וואַרפֿן זיך אין די אויגן געלע בלומען. דאָס איז דער "לייבנצאָן", אָדער די פּוכבלום. ער בליהט פֿריה און באהערשט אינאנהייב די לאַנקע; דערנאָך נעמען זיך צומישן צו דער געלער פֿאַרב אויכעט אנדערע פֿאַרבן, דערהויפּט וויאַלעט און רויט; וויאַלעט איז קלעווער, און רויט זיינען פֿאַרשידענע מינים ווילדע גענעלעך; צווישן זיי זעהען זיך די ווייסע שירמלעך פֿון קימל און פֿון ווילדע מערן; בלוי זיינען די גלעקעלעך; געל זיינען אויך פֿאַרשידענע מינים מערדערלעך, (לומיקעס) מיט זייערע גלאנציגע בלומען; מערדערלעך האָט זיי אנגערופֿן דאָס פֿאלק, דערפֿאַר ווייל זיי זיינען גיפֿטיג.

דאָס אלגעמיינע בילד ווענדט זיך אָן דעם, אויף וואָספֿאַר אַ באָדן די לאַנקע געפֿינט זיך, אויף אַ טרוקענעם אָדער אויף אַ פֿייכטן. אויף אַ טרוקענעם באָדן האָבן פֿיל געוויקסן שמאַלע אָדער טיף איינגעשניטענע בלעטער, אמאָל בלעטער דיגע, ווי האָר; ביי אנדערע געוויקסן זיינען די בלעטער שטאַרק באהאַרט. אויף דער אָפֿענער לאַנקע ווערן די געוויקסן שטאַרק



גלעקלעד.

פֿון „הערשעלין, לייטע. פ. ד. באַפּאַנ. אונטערריכט“, פֿלג. B. G. Teubner אין לייפּציג און בערלין.

באשטראלט פֿון דער זון; אויבןע בלעטער פֿאַרהיטן פֿון א צו שטארקע אויס-
דעמפֿונג פֿון וואסער.

גאָך איין אינטערעסאנטע דערשיינונג קענט איר באמערקן אויפֿן לאַנקע, מיר ווייסן, אלע געוויקסן נויטיגן זיך אין ליכטיקייט, אין דעם שיין פֿון דער זון. געוויקסן מיט א שטארקן שמענגל, וואָס הייבט זיך אויף הויך, זיינען פֿאַרזיכערט מיט ליכטיקייט; אנדערס איז מיט די, וואָס האָבן א שוואכן גראָזיגן שמענגל, וועלכער קען זיך ניט האלטן אינדערהייך און קריכט אויף דער ערד; אויבןע געוויקסן וואָלטן געמוזט אפשטארבן אין שאַטן, אָבער זיי העלפֿן זיך דערמיט, וואָס דער שוואכער שמענגל שפּאַרט זיך אָן אויף זיין שטארקערן שָכּן, וויקלט זיך ארום ארום זיין שטאַם און הייבט זיך אויף צו דער ליכטיקייט. אויף דער לאַנקע וועט איר געפֿינען אפֿולע אויבןע וויקלער אָדער קריכגע געוויקסן. געפֿינט דאָס געוואוינטליכע וויקלבליםעלע. זי האָט לענגליכע בלעטער, ווי פֿילן. אירע ווייסראָזליכע בלומען ווייזן אויס, ווי א ברייט געעפֿנטע לייקעלע. זיי שמעקן ווי ביטערע מאנדלען. אפֿולע פֿלאנצן זיינען געשיצט פֿון אינסעקטן דורך זייערע שמעכליגע האר, בהמות מירן אויך אויס אויבןע געוויקסן. אנדערע געוויקסן זיינען גיפֿטיג. ס'איז צו בא-
וואנדערן, ווי בהמות דערקענען אויבןע געוויקסן. געוויס העלפֿט זיי מיט דערביי זייער שארפֿער חוש-הרית.

וויקע.

די וויקע האָט אויך א זעהר שוואכן שטאם, אָבער די געפֿעדערטע בלעטער פֿארענדיגן זיך ביי איר מיט לענגליכע גרינע געדרייטע פֿעדים. מיט די פֿעדים כאפט זי ארום אנדערע שטארקערע געוויקסן און אזוי הייבט זי זיך אויף צו דער זון און צו דער ליכטיקייט.

אירע בלויליך-לילע בלומען זיינען צוזאמענגעקליבן אין לענגליכע גע- בלימען. יעדע בלום האָט א שיסעלע און א קרענצל פֿון פֿינף בלעטער: א זעגל, צוויי פֿליגלען און א שיפֿעלע, וואו ס'ליגן די שטויבפֿעדים און דער לענגליכער פעסטל מיט א האַריגע מיילכעלע. טיף אין בלום איז דאָ האַניג, נאָר די ערדבין מיט איר לאנגן ווינער קען צו אים צוקומען; וויגנדיג די האַניג, טראָגט זי אריבער די שטויב פֿון איין בלום אויף די אנדערע. אבער די בינען געפֿינען זיך אָפֿט א קירצערן וועג צום האַניג; זיי שמעכֿן דורך די שיסעלע און די בלומענבלעטער. אויפֿן אונטערשטן זייט פֿון די בייבלעטער איז אויך דא האַניג, וואָס ציהט צו צו זיך מוראשקעס. די נאטורפֿאָרשער האָבן נאָך ביזאהער ניט ארויסגעפֿונען דעם באמייט פֿון אַטדעם האַניג אויף די בלעטער. זיי רעכענען, אז דאָס איז א שונזימל: די מוראשקעס נאשן דעם האַניג און עסן אויף די איבעריגע אינסעקטן, וואָס וואַלן געקענט שאטן דעם געוויקס. די וויקע איז א פֿלאטערגעוויקס, לויט אירע בלומען און פֿרוכט איז זי ענליך צו ארבעס.

קלעווער אָדער דרייבלאט.

קלעווער איז אויך א פֿלאטערגעוויקס. ס'איז פֿארהאָנען רויטע און ווייסע קלעווער. זייערע שמעקעדיגע בלומען זיינען זעהר קליין, אָבער זיי זיינען קענטיג, ווייל זיי זיינען צוזאמענגעקליבן אפֿולע אין איין גרויסער קעפֿעלע. נעמט פֿונ- אנדער די קעפֿעלע און קוקט זיך צו אויפֿמערקזאם צו די איינצלע בלומען, וועט איר געפֿינען דעמוזעלביגן בוי, ווי ביי וויקע, אָדער ביי ארבעס. ווען מען גיט א דריק די שיפֿעלע, באווייזן זיך די שטויבפֿעדים און דער פעסטל מיט זיין בערשמעלע. דאָסזעלביגע קומט פֿאָר, בעת אן אינסעקט זעצט זיך אויפֿן שיפֿעלע. אזוי העלפֿן מיט די אינסעקטן דער באשטויבונג. ווי ביי דער וויקע, אזוי אויך דא קענען נאָר די עררבינען ארויסגעפֿינען דעם טיפֿפֿארבאָרגענעם האַניג. די געוואוינליכע בין געפֿינט זיך דעם קירצערן וועג, דורכשמעכֿנדיג די שיסעלע. ביי דעם ווייסן קלעווער איז די בלומענרעלע קירצער, און ס'איז דערפֿאר גרינגער צוצוקומען צום האַניג.

קלעווער גיט דעם בעסטן היי, דערפֿאר פֿארווייט מען מיט אים גרויסע פֿעלדער.

וועגן צוזאמענלעבן פֿון די געוויקסן אויף דער לאַנקע.

די געוויקסן אויף דער לאַנקע זיינען אויסערליך שוואכער פֿאר די בויער, אָבער זיי זיינען אויך גוט געשיצט פֿון קעלם, ווינט און טריקעניש. דער גראַזיגער שטאם און די בלעטער שטארבן אָפּ אין האַרבסט, אָבער דער וואַרצל-שטאם ווינטערט איבער אין דער ערד.

זייערע שוואכע שמענגלעך קענען באשטיין קעגן דעם גרעסטן ווינט, ווייל זיי זיינען בייגעוודיג און וויגן זיך אין דער זייט, אין וועלכער דער ווינט ווייט; באזונדערס איז דאָס קענטיג ביי אלע גרעזערותבאות. דער פוסטער שמרוי און די לאנגע שמאַלע בלעטער פֿלאטערן, אָבער ברעכֿן זיך ניט פֿון ווינט.

די געוויקסן וואקסן געדיכט, פֿלעכטן דורך דעם גאנצן באָדן מיט זייערע צעשפרייטע וואַרצלשטאמען און שיצן אויף אזא אופן אייגע די אנדערע. צוליבדעם, וואָס זיי וואקסן געדיכט, איז מעגליך די געקרויצטע בא-שטויבונג.

די געוויקסן באקומען אפֿולע ליכטיקייט, זיי דעמפֿן אָבער אויס דערפֿאר אפֿולע וואסער. פֿון דער אנדער זייט, איז אויף דער לאַנקע פֿארהאָנען מער טוי און נעפל, און דאָס פֿרישט אָפּ די געוויקסן.

מיר זעהען, אז די לאַנקע איז אויך אזא לעבנגעמיינשאפט, ווי דער וואַלד. דאָ איז אויך דאָס לעבן פֿון איין געוויקס ענג פֿארבונדן מיטן לעבן פֿון דעם אנדערן.


די לאַנקע ניט אויך שפייז און א היים פֿאר טויזנטער אינסעקטן, קליינע און גרויסע; ווילדע הינער און לאַרכעס בויען זייערע נעסטן אין גריבעלעך צווישן די געדיכטע גראַז; פֿרעש באהאלטן זיך דאָ און יאָגן זיך נאָך אינסעקטן, זיי באזעצן זיך דערהויפּט אויף פֿייכטע זומפּיגע לאַנקעס; דאָ טרעפֿן זיך אויך שלאנגען און אנדערע קריכיגע חיות; בושלען אָדער שטאַרכן שפּרייזן מיט זייערע לאנגע פֿיס דורך די הויכע און געדיכטע גראַז און כאפּן מיטן לאנגן שנאָבל פֿרעש, שלאנגען און יאסמטשערקעס.

משה־רבנוס קיהעלע.

אָפּט קען מען געפֿינען אויף דער לאַנקע א קלייניקן זשוק, וואָס די קינדער רופֿן אים „משה־רבנוס קיהעלע“. זיין גוף איז קיילעכדיג, זיינע הארטע אויבערפֿליגלען זיינען רויט מיט שווארצע פינטלעך. אונטער די אויבער-פֿליגלען האָט ער א צווייטע פֿאר פֿליגלען: גרעסערע און דורכיכטיגע. ער

לאָזט זיי פֿונאנדער, בעת
ער פֿליהט.

בעת מען כאפט אים
אָן, פֿארשטעלט ער זיך פֿאר
א טויטן. ער איז א רויבער
און שפייזט זיך מיט אינ-
סעקטן, וואָס ער כאפט אויף
די געוויקסן. דאָסועלביגע
טוט אויך זיין לארוו.




משהרבינוס קיהעלעך
(אויף בלעטער).

דער

גרינער היישפרינגער.

די היישפרינגערס לאָזן
זיך זעהן און הערן אויף דער
לאָנקע. סוף זומער גיבן

זיי גאנצע קאנצערטן. איר האָט געוויס געהערט זייער „ציק-ציק“. ס'זיינען
פֿארהאָנען גרויע און גרינע היישפרינגער. אויב ס'זועט זיך אייך איינ-
געבן אנצוכאפן א גרינעס היישפרינגער, לאָזט אים אריין אין א גלאָז און
קוקט זיך צו צו אים אויפֿמערקזאם. פֿון ערשטן בליק קען מען אונטערשיידן
די ווייבעלע פֿון מאנעלע. ביי איר ענדיגט זיך די בייכל מיט א לאנגן
אייערליינער. זי שטעכט אים אריין אין דער ערד און לייגט דאָרטן אירע
קליינע אייעלעך, וואָס פֿון זיי קומען ארויס אין פֿריהלינג קליינע היישפרינגער
אָהן פֿליגלען. זיי הויטלען זיך עטליכע מאָל און אנטוויקלען זיך אלץ מער,
ביז זיי ווערן אמתע היישפרינגערס; דעם גילגול פֿון א פֿאָפֿקע מאכן זיי
ניט דורך.



דער גרינער היישפרינגער.

דער היישרינגער שפייזט זיך מיט בלעטער פֿון געוויקסן און מיט אינ-
סקעטן. זיין מויל האָט שאַרפֿע מוילצווענגלעך. אויפֿן קאָפּ האָט ער צוויי
גרויסע אויגן און א פֿאָר לאַנגע טאפּערס; בעת ער דאַרף שפּרינגען, פֿאַר-
בויגט ער זיי אויפֿהינטן.

ער איז א פֿלינקער שפּרינגער. דערצו זיינען זעהר גוט צוגעפּאסט
זיינע לאַנגע הינטערשטע פֿיס. די אויבערשטע פֿליגלען ביי דעם היישרינגער
זיינען גלייכע און האַרטע, אונטער זיי געפֿינען זיך נאָך א פֿאָר פֿליגלען,
ברייטע און דורכזיכטיגע. בעת ער פֿליהט שפּרייט ער זיי אויס; אין רוהיגן
צושטאנד לייגט ער זיי צוזאַמען ווי א פֿעכער אונטער די אויבערשטע
פֿליגלען.

דער גוף איז ביי אים צעטיילט אויף דריי טיילן און איז באדעקט מיט
א האַרמן פּאַנצער פֿון כיטיין, ווי ביי אלע אינסעקטן. ער עמעמט דורך
די קליינע לעכעלעך, וואָס געפֿינען זיך אויף די רינגען פֿון זיין בייכל.
אַבער וויאזוי זינגט ער? אויב איר מיינט, אז מיטן מויל, האָט איר א
טעות. איין פֿליגל רייכט זיך אָן דעם אנדערן, און דערפֿון קומט דער סקריפּ
אַדער דער „ציק“. דער היישרינגער הערט גאַנץ גוט, אָבער זיינע אויערן
געפֿינען זיך אויף די פֿאָדערשטע פֿיס.

פֿונאוונט ווערט דער קאָנצערט אויף דער לאַנגקע נאָך הילכטער: דאָס
גריכט די פֿעלדגרויך. ס'איז שווער זי צו זעהן, ווייל זי באהאלט זיך אין
קליינע גריבעלעך אין דער ערד.

וואָספֿאַר א באַטייט האָט פֿאַרן היישרינגער זיין גרינע פֿאַרב? וועלכע
אינסעקטן זיינען אייך נאָך באוואוסט אויף דער לאַנגקע?

דער קראָט.

דער קראָט לעבט אויף דער לאַנגקע אונטער דער ערד. איר זעהט דאָך
אַפֿט קופּקעלעך ערד אויף דער לאַנגקע, דאָס איז זיין אַרבעט. אפּשר וועט
אייך אמאָל אָפּגליקן, און איר וועט דערזעהן דעם קראָט אליין, בעת ער
קריכט ארויס פֿון זיין נאָרקע. קוקט זיך צו צו אים, ער איז א קונציגער
ערדגראָבער. דער גאַנצער גוף זיינער איז ווי א וואליק, פֿונפֿאַרנט אביסל
צוגעשפיצט, זיין נאָז איז אויסגעצויגן, ווי א קליינער שנוק.

די פֿאָדערשטע פֿיס זיינען אמתע שויפֿלען, זיינע ברייטע טריט, אָדער
ריכטיגער זיינע הענט, האָבן קורצע פֿינגער מיט לאַנגע און שאַרפֿע קראַלן,
וואָס זיינען אויסגעדרייט אינדערווייט. מיט די הענט גראָבט ער די ערד,
שאַרט זי אָפּ אַנאזויט און וואַרפֿט זי ארויס. דערביי העלפֿט אים אויך דער
קאָפּ, דערהויפּט דער שנוק. אזוי ווי א קליין גראָבט ער זיך אין דער ערד



דער קראָט.

פֿון „מינרלארס טירכילדער“, פֿלג. C. C. Meinhold & Söhne אין דרוועי.

אריין, די הינטערשטע פֿיס גראָבן נישט. ס'איז צו באוואונדערן, וואָספֿאר א שווערע ארבעט אזא קליינע באשעפֿעניש טוט אויף. ער גראָבט זיך אָפֿטמאָל איין אין אזוינע ערד, וואָס דער מענש קען זי בייקומען נאָר מיט אַן אייזערנער לאָפעטע. זיין שוואַרצער פעלצל האָט קורצע גלאטע און בליסמשעווריגע האָר. די ערד קלעפט זיך צו אַזעלכע האָר ניט צו, און זיי שמערן אים ניט, בעת ער גראָבט זיך אין דער טיפֿעניש.

די אויגן זיינען שוואַך און קליין און פֿאַרבאהאלטן צווישן די האָר; אין דער פֿינסטערניש אונטער דער ערד דארף ער זיי ניט; אויף דער ערד קריכט ער ארויס מערניט ווי ביידערנאכט.

דער געהער איז ביים קראָט שאַרף. קיין אויערמושלען האָט ער ניט, אָבער אין דער האַרטער ערד ניט זיך אזוי אויך גוט איבער יעדער קלאַנג; בעת ער גראָבט, פֿאַרמאכט זיך די אויערן מיט באַזונדערע דעקלעך. (וואָס פֿאַר א באַטייט האָט דאָס?) ער האָט ציינער פֿון א רויבֿהיה, זיי זיינען נאָר קלענער און נאָך שאַרפֿער, די עקציינער זיינען אזוי ווי שאַרפֿע שפּילקעס. ער שפּייזט זיך מיט אינסעקטן, זייערע לאַרוועס, מיט רעגנווערים, מיט שנעקעס און אפֿילו מיט מייז. ער איז א גרויסער פֿרעסער, דערהויפּט איז ער א בעלן אויף לאַרוועס פֿון מאַיזשוקעס, ער פֿרעסט זיי אויף טויזנטער־ווייז.

ער פֿאלט ניט אריין אין קיין ווינטערשלאָף. טיף אין דער ערד, וואו ער ליגט, פֿילט זיך דער פֿראַסט ניט. און די אינסעקטן און ווערים, וואָס ער שפּייזט זיך מיט זיי, געפֿינען זיך אויך דאַרטן אין יעדער צייט פֿון יאָר. זיין רונדליכע גאַרקע געפֿינט זיך טיף אין דער ערד. אין אלע זייטן נייען אָפּ פֿון איר לאנגע דורכגענג אָדער קאַרידאָרן. דאָס זייגען זיינע וועגן, וואו ער זוכט און כאפט רויב. די גאַרקע איז ווייך אויסגעבעט מיט טרוקענע גראָז. קראַטעס לעבן איינציגווייז.

דער קראַט איז זעהר א נוצליכע היהעלע. ס'איז גענוג זיך צו דערמאָנען, וויפֿיל שאָדן עס מאכט אָן אויפֿן פֿעלד, אין גארטן און אין וואלד די לארוועס פֿונם מאיזשוק, כדי מיר זאָלן קענען אָפּשאצן די נוצן פֿון א קראַט. אמת, גראַבנדיג די ערד, קען ער אמאָל שאַטן די וואַרצלען אָדער אָנוואַרפֿן זיינע קופּקעס ערד אויף א בייט אין גאַרטן. אָבער דער שאָדן איז צו קליין אין פֿאַרגלייך מיטן נויץ, וואָס ער ברענגט. דעריבער דארף דער מענטש אים ניט רודפֿן.

לעבן וואסער און אין וואסער.

דאָס לעבן פֿון אסך געוויקסן און חיות איז ענג פֿאַרבונדן מיטן וואסער. באזונדערס רייך מיט געוויקסן זיינען שטייעדיגע וואסערן, אָוערעס, סאושלקעס. דאָס לויפֿיגע וואסער איז ניט אזוי גינסטיג פֿאַרן לעבן פֿון געוויקסן. איר האָט געוויס אליין באמערקט, אז די שמראַמיגע טייכן ווערן ניט פֿאַרוואקסן. דער גיכער שמראַם לאָזט די געוויקסן ניט פֿאַרפֿעסטיגן זיך אין וואסער. אפֿולע געוויקסן וואקסן אויף דער פֿייכטער ערד פֿון ברעג, אנדערע באַ-זעצן זיך אין וואסער גופֿאָ. ס'איז אינטערעסאנט זיך צו באקענען מיט עטליכע אזויגע געוויקסן, כדי צו זעהן, ווי וואונדערליך זיי פֿאסן זיך צו צום לעבן אין וואסער.

די פֿאַרנעסנימל.

דאָס זייגען קליינע בלויע בלימעלעך, וואָס יעדערער קען זיי זעהר גוט. זיי וואקסן אויף פֿייכטע ערד ביים ברעג פֿון וואסער. אמת, זיי טרעפֿן זיך אויך אויף טרוקענע לאַנקעס, אָבער יעמאָלט זיינען זיי אָרעם, אויסגעצויגן, די בליהונג איז קליין און בלייך. אויפֿן ברעג פֿון וואסער דערנרייבן זיי זייער גרעסטע פראכט. די פֿאַרנעסנימל איז א פֿיליאָריגער געוויקס, אין דער ערד האָט זי א וואַרצלשטאם. בעת מען ועצט אריין אין פֿייכטע זאמד אירע קליינע צווייגעלעך, וואקסן זיי דורך; די שמענגלעך און די קליינע

לענגליכע בלעמער זיינען לייכט באהאָרט, דאָס פֿאַרהיט פֿון א צו שטאָיקער אויסדעמפֿונג.

דאָס שענסמע אין דעם געוויקס זיינען די בלומען. יעדע בלום האָט א גרינע שיסעלע און פֿינף הימל־בלויע בלומענבלעמעלעך. אונטן

זיינען זיי אויסגעצויגן, און פֿונאָיבן ווייזט די בלום אויס, ווי א פֿלאַכער טעלערל מיט א געלן פֿלעק אינ־מיטן; דער פֿלעק מאַכט קעגנטייער



די פֿאַרגעסניסל.

פֿון „קדמפֿעלין, לייטפֿ. פֿ. ד. באַטאַנישן אינסטערריכט“.

פֿלנ. B. G. Teubner אין לייפֿציג און בערלין.

די בלום פֿונווייטן, ער באַשטייט פֿון פֿינף קליינע שופֿעלעך, וואָס פֿאַרמאַכן די בלומענרעדעלע און שיצן די שטויבפֿעדעס פֿון באַנעצונג. אינסעקטן, וואָס זוכן שטויב און האָניג, רוקן פֿונאַנדער די שופֿעלעך און העלפֿן דערמיט די באַשטויבונג. פֿון פעסטל אַנטוויקלט זיך די קליינע פֿרוכט, וואָס צעפֿאלט זיך אויף פֿיר קליינע ניסעלעך. די פֿרוכט בלייבט אין האָריגן בעכערל פֿון שיסעלע, די האָריגע בלעמעלעך שטייען צו צו די האָר פֿון די פֿאַרביי־גייענדיגע חיות און בהמות און ווערן אויף אַזא אַויפֿן פֿאַרשפּרייט.

וואַסערראָר.

וואַסערראָר וואַקסט זיך געדיכט פֿונאַנדער אויפֿן ברעג און אין וואַסער לעבן ברעג, אויף אָזערעס און סאַזשקעס. אויב אייך אינטערעסירט, פֿונ־וואַנען עס נעמט זיך דער נאַמען, רייסט אָפּ זיין הויכן שמענגל און קוקט זיך איין אינווייניג. ער איז פּוסט אַזוי ווי א רער. דער שמענגל פֿון אַ וואַסער־ראָר איז אַ שטרוי. ער איז צעטיילט דורך קניפלעך אויף עטליכע טיילן. אַזאַ שמענגל איז זעהר שטאַרק און האָט ניט קיין מוראַ פֿאַרן ווינט, וואָס הערשט אַזוי פֿריי אויפֿן וואַסער. ער בייגט זיך איין און גלייכט זיך אויס, אָבער ער ברעכט זיך ניט. די לאַנגע און שמאַלע בלעמער פֿלאַמערן ווי בענדער אויפֿן ווינט און רייסן זיך ניט; מיט זייערע שטילן כאַפּן זיי אַרום דעם שטאַם און שיצן אים. וואַסערראָר איז אויך אַ תּבוּאה. די קליינע זאַנגעלעך זיינען צוזאַמענגעקליבן אין בעזעמעלעך, די פעסטלעך האָבן פֿעדערדיגע פֿעדעס, מיט וועלכע זיי כאַפּן אָן דעם בלומענשטויב. דער ווינט איז דאָ דער באַשטויבער. בעת די קערנער ווערן פֿאַרטיג, רייסן זיך די זאַנגעלעך אָפּ פֿון שטרוי, זייערע שטילן זיינען באַדעקט מיט געדיכטע ווייסע הערעלעך, דער ווינט כאַפּט זיי אונטער און צעטראַגט זיי ווייט אין אלע זייטן. די

קערנער זיינען פֿאר דער וואסערראָר ניט דער איינציגער מיטל זיך צו פֿאר-
מערן. דער לאנגער וואָרצלשטאם אנקערט זיך איין טיף אין שליימיגן גרונט
און לאָזט פֿונאנדער אָפֿלויפֿער אין אלע זייטן. דערפֿאר וואקסט זיך די וואסער-
ראָר אזוי געדיכט פֿונאנדער.

צווישן די אָפֿלויפֿער פֿארהאלט זיך וואסערשליים (פֿון צעפֿולטע גע-
וויקסן און היות), ווערט פֿארטראָגן שטויב און זאמר, אזוי שאפט זיך א באָדן
פֿאר אנדערע געוויקסן, וואָס גייען אויף און אנטוויקלען זיך גוט אין שליים
און פֿייכטקייט. וואסערראָר קען זיך אָבער פֿארשפרייטן אין וואסער נאָר
ביז א געוויסער טיף, ווייל זיינע בלעטער נויטיגן זיך אין לופֿט. זיי קענען
זי אָבער ניט ציהען אין זיך, אויב זיי ליגן אונטערן וואסער.


אויף זייערע בלעטער פֿארהאלט זיך ניט קיין טוי און קיין רעגנוואסער,
עס רינט באלד אראָפֿ. (דערקלערט, פֿארוואס איז דאָס וויכטיג פֿאר אזא
געוויקס, ווי וואסערראָר).

די בלעטער פֿון וואסערראָר זיינען הארט, זיי האָבן אין זיך פֿיל
מינעראלישע שטאָפֿן. בהמות עסן זיי ניט. אויב מען וויל פֿון זיי מאכן היי,
מוז מען זיי אפשניידן, בעת זיי זיינען נאָך גאָר יונג. מיט די שטרוי דעקט
מען דעכער און מען פֿארטינקעוועט ווענט.

די וואסערליליע.

אין שטילפֿליסיגע טייכן און נאָכמער אין אָוערעס וואקסט זיך פֿונאנדער
די שיינע וואסערליליע. אירע גרויסע בלעטער און שנייזייסע בלומען זעהען זיך

פֿונווייטן און דערפֿרייען דאָס אויג.
דערנרייבן צו איר אין וואסער
און אָפֿרייסן זי איז ניט גרינג, ווייל זי
וואקסט אויף א שליימיגן גרונט.
איר וואָרצלשטאם איז זעהר גראָב,
ער צעצווייגט זיך און פֿארפֿעסטיגט
זיך אין שליים; אויף אים זיינען
קענטיג קארבן פֿון בלעטער. פֿון
די קנאָספֿן אויפֿן שפיץ וואקסן אויס
בלעטער און בליהונג. די וואסער-
ליליע בליהט אומגעפֿער פֿון יוני
ביז סעפטעמבער.



(א) פֿרוכט, (ב) בליהונג.
די וואסערליליע.

פֿון „דערעפֿליק, לייטפֿ. פֿ. ד. באַשאַנ. אינטער.
פֿלן B. G. Teubner אין לייפֿציג און בערלין.

ווען דאָס וואסער איז טיף, האלטן זיך די שטילן כמעט גלייך; אויב דאס וואסער איז פלאכער, שפרייטן זיי זיך אויס אונטערן וואסער. די גרויסע הארצי-פאָרמיגע לעדערדיגע בלעמער שווימען אויפֿן וואסער. דער שטיל איז אזוי ווייך, אז בעת מען נעמט אים ארויס פֿון וואסער, קען ער זיך אליין ניט האלטן און בייגט זיך אראָפֿ. אין טייך האלט אים דאָס וואסער אונטער. אזא ווייכער שטיל לאזט זיך בייגן און קערן אין אלע זייטן און ברעכט זיך ניט.

שוין מיטן אויג קען מען זעהן, אז אין שטיל זיינען דא אפֿולע לופֿט-קאנאלן; נאָך בעסער קען מען זיך אין דעם איבערזייגן דורך אזא פרוב: מען האלט דעם בלאט אונטערן וואסער און דורכן אפגעשניטענעם עק פֿון שטיל בלאָזט מען אריין לופֿט. דער בלאט הייבט אָן צו פערלען, דאָס גייע ארויס קליינע בלעזעלעך לופֿט דורך די פאָרן פֿון בלאט. די לופֿט מאכט דעם בלאט גרינג, דערפֿאר קען ער שווימען; אויסערדעם נויטיגט זיך אזא געוויקס אין א גרויסן זאפאס לופֿט, ווייל צו די טיילן, וואָס ליגן אונטערן וואסער, קומט דאָך צו ווייניג לופֿט. אינטערעסאנט איז אויך צו באמערקן, אז די בלעזעלעך לופֿט גייען ארויס דורכֿן אויבערשטן פֿלאך פֿון בלאט; דאָס איז א באווייז, אז די פאָרן געפֿינען זיך פֿונאויבן, בשעת ביי אנדערע געוויקסן געפֿינען זיי זיך פֿונאונטן. דורך די פאָרן דעמפֿן אויס די געוויקסן דאָס וואסער. די וואסערליליע דעמפֿט אים מער וואסער פֿאר אנדערע גע-וויקסן, ווייל זי איז דאָך אינגאנצן איינגעטונקט אין וואסער. די בלעמער רירן אָן מיטן אונטערשטן פֿלאך דאָס וואסער. אויב די פאָרן וואָלטן געווען אויף דער אונטערשטער זייט, וואָלטן זיי איר ניט געקענט נוצן. קיין וואסער-טראָפֿנס קענען זיך אויפֿן בלאט ניט פֿארהאלטן, דער מיטלסטער טייל איז אויפֿגעהויבן, און די ברענעס אראפגעלאָזן, דערפֿאר רינען די טראָפֿנס אראָפֿ. ווי לאנג די בלעמער זיינען יונג און געפֿינען זיך נאָך אונטערן וואסער, זיינען זיי צוזאמענגעדרייט; שפעטער ווערן זיי גרויס און פֿלאך.

אירער אָטדי גרויסע בלעמער אנטוויקלען זיך, האָט די וואסערליליע "צייטווייליגע בלעמער". דאָס זיינען שמאָלע צארטע לופֿטבלעמער; אז די גרויסע בלעמער אנטוויקלען זיך, פֿאלן די לופֿטבלעמער אראָפֿ; אָבער אין א הייסן זומער, בעת דאָס וואָסער איז פֿלאך, בלייבן זיי, ציהען אין זיך אריין לופֿט פֿון וואסער און האלטן אונטער דעם געוויקס.

די בלומענקאָספֿ איז אונטערן וואסער פֿארדעקט מיט די בלעמער פֿון שיסעלע, איבערן וואסער בויגן זיי זיך אָפֿ און לייגן זיך אויפֿן וואסער. די ווייסע בלומענבלעמער זיינען צוניפֿגעשטעלט אין עטליכע ראָנדן, די אויסער-ליכע זיינען קלענער פֿאר די אינווייניגסטע, וואָס גייען ביסלעכווייז אריבער אין שטויבבלעמער און שטויבפֿעדים. אינמיטן געפֿינט זיך דער גרויסער פעסטל, וואָס ווייזט אויס, ווי א קעפל מאָן. אינדערפֿריה עפֿנט זיך די בלום


און ציהט צו אינסעקטן, וואָס נאשן דעם בלומענשטויב און העלפֿן מיט דער באשטויבונג; פֿארנאכט מאכט זיך די בלום צו, און דער שטויב ווערט ניט צענעצט פֿון טוי און נעפל, וואָס הייבט זיך אויף איבערן וואסער. די קיילעכדיגע פֿרוכט לאָזט זיך אראָפּ אין וואסער. ווען די פֿרוכט-שייד ווערט צעפֿוילט, שיטן זיך די קערנער ארויס און פֿאלן אריין אין וואסער, זיי שווימען אָבער פֿונאויבן, ווייל זיי זיינען אָנגעטאָן אין לופֿטיגע העמדעלעך. שווימענדיג פֿארשפּרייטן זיי זיך. ווען די העמדעלע ווערט צעפֿוילט, לאָזן זיי זיך אראָפּ אויפֿן גרונט און וואקסן דורך אין פֿריהלינג. אָפֿטמאָל שטייען די קערנער צו צו די פֿעדערן און פֿליגלען פֿון וואסערפֿויגלעך און ווערן פֿאַר-טראָגן זעהר ווייט. די בלעטער שטארבן אָפּ אין הארבסט; דער שטאם אָבער ווינטערט איבער אונטערן וואסער און הייבט אין פֿריהלינג ווידער אָן צו וואקסן.

די געלע וואסערלייע איז קלענער פֿאַר דער ווייסער, אָבער אין איר בוי און איר לעבן איז זי זעהר ענליך צו איר. (געפֿינט נאָך וואסערנער-וויקסן און קוקט זיך איין, ווי זיי זיינען צוגעפּאסט צום לעבן אין וואסער.)

די וואסערלינו.

די וואסערלינו איז זעהר פֿארשפּרייט, איר האָט זי געוויס געזעהן. זומער פֿארציהט זי כמעט אינגאנצן קליינע שטייעדיגע וואסערן. דאָס גאנצע געוויקס איז א קליינער בלעטעלע, וואָס שווימט ארום אויפֿן וואסער. מען רופֿט זיי אויכעט ענטלגרינס.

דער קליינער בלעטעלע שפּילט די ראָלע הן פֿון א שטאם און הן פֿון א בלאט. נעמט אים ארויס פֿון וואסער, וועט איר זעהן, אז פֿונאונטן האָט ער א קליינעם וואָרצעלע, ווי א דינעם פֿעדימל, מיט א קליינע הייבעלע אויפֿן שפיץ. מיטן גרינעם גוף ציהט דאָס דער קליינער געוויקס שפּייז פֿון



די וואסערלינו.

פֿון „קרעפּליון, לייטפֿאדן פֿ. ד. באַטאַנישן אונטערריכט“ פֿאַרלאַג: B. G. Teubner אין לייפּציג און בערלין.

דער לופט, מיטן וואַרצל ציהט ער שפייז פֿון וואסער. אין וואסער זיינען אלעמאָל פֿארהאָנען פֿארשיידענע זאלצן. די וואסערליניז באגענונגט זיך מיט דעם קליינעם ביסל מינעראלישע שטאָפֿן, וואָס געפֿינען זיך אין וואסער. עס פֿארמערט זיך דורך קליינע זיימיגע שפּראַצן. אמאָל טיילט זיך דאָס נייע געוויקסעלע אָפּ פֿון דער מוטער, אמאָל בלייבן זיי אינאיינעם. די וואסער-ליניז בליהט זעהר זעלטן. אין הארבסט אנטוויקלען זיך אויף דער וואסערליניז קנאָספּן, אזוי ווי קליינע ציבעלעס. זיי ווינטערן איבער אויפֿן גרונט. אין פֿריהלינג אנטוויקלט זיך פֿון זיי א נייע געוויקס.

לייגט אריין עטליכע ליניז אין א טעלער מיט וואסער, אין א קורצער צייט ארום וועלן זיי געבן נייע שפּראַצן.

די וואסערפעסט אָדער די עלאָדעע.

די עלאָדעע שווימט אונטערן וואסער, זי פֿארמערט זיך דורך שפּראַצן; יעדער צווייגעלע, אפֿילו דער קלענסטער, וואקסט ווייטער. דאָס גאנצע געד-וויקס איז זעהר צארט און דורכזיכטיג; עס האָט ניט קיין וואַרצלען; די עלאָדעע ציהט אירע שפייז פֿון וואסער. די שפייז גייט אריין אין געוויקס דורך זיינע דינע ווענטלעך. דער נאמען „וואסערפעסט“ נעמט זיך דערפֿון, וואָס זי פֿארמערט זיך זעהר גיך און זי פֿילט אן אזוי געדיכט די וואסערן, אז אין קאנאלן פֿארשווערט זי דעם שווימען פֿון שיפֿן.

זי איז היימיש אין די וואסערן פֿון אמעריקע, מיט שיפֿן האָט מען זי פֿארטראָגן אין אייראָפּע. די עלאָדעע איז אן איינגעשלעכטיג און צוויי-הויז געוויקס; אזויווי אין אייראָפּע טרעפֿט זיך נאָר איין מין, זוערט זי ביי אונז קיינמאָל ניט פֿארמערט דורך פֿרוכט, נייערט אלעמאָל דורך שפּראַצן.

די וואסערגעוויקסן און די חיות.

די וואסערגעוויקסן האָבן דעם גרעסטן באמייט פֿאר די קליינע און גרעסערע חיות, וואָס לעבן לעבן וואסער און אין וואסער. צווישן די געד-וויקסן באהאלטן זיי זיך פֿון די שטארקערע חיות, וואָס יאָגן זיך נאָך זיי. און די שטארקע נואָה באהאלטן זיך אויך אין די געוויקסן, כדי אויסצושפירן רויב. אזוי טוט דער גרעסטער רויבער, דער העכט. אונטער די בלעמער בא-האלטן אפֿולע באשעפֿענישן זייערע אייער. מיט וואסערגעוויקסן און מיט דער פֿוילעכץ, וואָס ווערט פֿון זיי, שפייזן זיך אפֿולע באשעפֿענישן. די וואסער-געוויקסן ציהען אריין אין זיך קוילנוייערס און לאָזן ארויס זייערשטאָף. אויף

אזא אויפן רייניגן זיי די וואסערן און מאכן מעגליך דעם לעבן פאר די היות, וואָס קענען ניט אויסקומען אָהן זייערשטאַף.

דערמאָנט זיך וועגן דעם לעבן פֿון א פֿראַש און זיין אנטוויקלונג אין וואסער. וועלכע פֿיש טרעפֿן זיך אין אונזערע וואסערן און ווי זיינען זיי צוגעפאסט צום לעבן אין וואסער? וואָספֿאַר א פֿאַרמע האָט זייער גוף? ווי באוועגן זיי זיך? ווי עמעמען זיי? מיט וואָס שפייזן זיי זיך? ווי פֿאַר- מערן זיי זיך?


דערמאָנט זיך, ווי די ענטל איז צוגעפאסט צום שווימען אין וואסער? וויאזוי זיינען נעבויט אירע פֿיס? וויאזוי איז דער גוף אירער געשיצט פֿון צו שטארקע אפּקילונג? פֿאַרוואָס געצן אירע פֿעדערן ניט דורך? מיט וואָס שפייזט זי זיך? וועלכע וואסערפֿויגל זיינען אייך נאָך באוואוסט?

דער קאָמאר אָדער דער מוק.

איר האָט געוויס באמערקט, אז אין פֿייכטע וועלדער און לעבן וואסער איז דאָ מער קאָמארעס, איידער אין טרוקענע ערטער. דאָס איז ניט אומיוסט. דער קאָמאר ווערט געבאָרן און פֿאַרברענגט זיינע קינדערשע טעג אין וואסער. די ווייבעלע ווינטערט איבער אין טונען פֿון רעגנוואסער, אין קעלערן; אין מארט אָדער אין אפריל הייבט זי אָן צו לייגן אייער אין וואסער. די אייער פֿון א קאָמאר ווייזן אויס, ווי קליינע פלעשעלעך מיט די העלזעלעך פֿונאויבן. צוזאמענגעקלעפטע שווימען זיי אויפֿן וואסער, ווי א קליינע שיפֿל. אין עט- ליכע טעג ארום קומט ארויס די לארוו. זי באשטייט פֿון רינגען, האָט האָרענע בערשטעלעך פֿון די ווייטן, וועלכע העלפֿן איר שווימען. זי האלט זיך אין וואסער מיטן קאָפּ אראָפּ; אויפֿן וואסער לאָזט זי ארויס אזוי ווי א שטערנדל פֿון הערעלעך. זיי רינגלען דאָס ארום די לופֿטראָר, וואָס זי שמעקט ארויס פֿון וואסער, כדי אריינצוועמען לופֿט. זי שפייזט זיך מיט צעפֿילטע וואסערגעוויקסן, זי נעמט זיי אריין מיט די טאפּערס און די מוילצווענגלעך. די לארוו הויטלט זיך עטליכע מאָל און פֿאַרוואנדלט זיך אין א פּאָפקע, וואָס זעהט אויס ווי א קאָמאר.

די פּאָפקע האלט דעם קעפל אויפֿאויבן און שווימענדיג אין וואסער, רודערט זי מיטן דינעם בייכל. זי שמעלט אויכעט ארויס פֿון וואסער צוויי רען, כדי אריינצוועמען לופֿט. אין צעהן טעג ארום פלאצט אויף איר די הויט, און עס קריכט ארויס א פֿאַרטיגער קאָמאר, וואָס האלט זיך נאָך אייניגע מינוטן אויפֿן הייטל פֿון דער פּאָפקע, ווי אויף א שיפֿל, ביוואונגען עס ווערן טרוקן זיינע דינע פֿליגלען.

דער קאָמאר האָט דינע פֿיס, צוויי לענגליכע, דורכויכטיגע פֿליגלען, א



דער קאמאר.

פֿון „מינדאלים טריבילדער“, פֿלג. C. C. Meinhold & Söhne און דרעדניץ.

לאנגע און א שלאנקע בייכל. דערהויפט פֿליהט ער ארום פֿארנאכט און איז דעמאָלט באזונדערס לעסטיג. די מאנעלעך פֿליהען ארום אינדערלופטן הונדערטערווייז, ווי וואלקנס, אָבער זיי שמעכן זיך ניט און לעבן ניט לאנג. די ווייבעלע לעבט לענגער, לייגט אייער און גויטיגט זיך אין קרעפֿטיגע שפייז. איר מויל איז צוגעפאסט צום שמעכן און זייגן. די ליפן אירע זיינען אויסגעצויגן און בילדן צוזאמען א לאנגע שמאלע רערעלע, וואָס אין איר ליגן פֿינגר שמעכהאָר. מיט די האָר שמעכט די ווייבעלע דורך די הויט פֿון א מעגשן אָדער א חיה און זייגט זיך אָן מיט בלוט. דערביי לאָזט זי נאָך אריין אין וואונד אירע שפייטעך, וואָס עסט און שמארצט. דעם איינגע- ביסענעם אָרט איז גוט איינצורייבן מיט שטינקשפירעמעס (גאשאטיר), מיט זייף אָדער מיט קארבאָל. ערגער איז, ווען מען הרגעט צו דעם קאמאר ביים

ווינגן. די שמעכערס ברעכן זיך אפ, בלייבן אין וואונד און פֿארשמארקן דעם ווייטאג. מען פֿארטרייבט די קאָמארעס מיט רויך אָדער דורכדעם, וואָס מען שמירט אין די הויט מיט קאמפֿעראייל אָדער נעגעלעכאייל; דער שמארקער ריח פֿארטרייבט זיי. זעהר שעדליך איז דער פֿיבערקאָמאר, ער טרעפֿט זיך אין זומפיגע ערטער. ווען ער בייסט אין, ווערט דער מענש קראנק אויף א שווערן פֿיבער (מאלאַריע).

די ליבעלע.

די ליבעלע איז איינע פֿון די שענסטע אינסעקטן. פֿלינג פֿליהט זי ארום אויפֿן ברעג און איבערן וואסער, ציטערנדיג מיט די גרויסע דורכזיכטיגע



די ליבעלע.

פֿון „מינדהאלדס טיכילדער“, פֿלג. C. C. Meinhold & Söhne אין דרעזדען.

פליגלען. די פליגלען האלט זי אלעמאל פונאנדערגעשפרייט, זיי זיינען דורכ-געצויגן מיט א געדיכטע נעץ פון אדערן. זי האָט א גרויסן קאָפּ מיט צוויי גרויסע האלבקיילעכדיגע אויגן; די לאנגע און דינע בייכל איז אזוי ווי א שטייער, מיט וועלכן זי קירעוועט זיך. אינדערלופטן.


די דיקע ברוסט איז געל געפֿלעקט, די שווארצע בייכל בלוי אָדער גרין געפֿלעקט, די שיינע בלויע פליגלען האָבן אויך אַפֿט געלבליכע פֿלעקן. צום ברוסט זיינען צוגעוואקסן דריי פּאָר קליינע פֿיס, מיט זיי קען זי זיך האלטן אויף וואסערראָר אָדער אנדערע געוויקסן. זי איז א שוואכע גייערקע און גאָרניט קיין לויפֿערקע, אָבער דערפֿאר איז זי א גוטע פֿליהערקע. דאָס זעהט מען שוין נאָך די גרויסע פליגלען. די ליבעלע שפייזט זיך מיט אלערליי קליינע אינסעקטן, זי כאפט זיי פֿליהענדיג. דערביי העלפט זי זיך מיט דער לאנגער אונטערלופ, וואָס ציהט זיך אויס און ענדיגט זיך מיט צוויי פֿאנגערס. אַפֿטמאל האלט זי צו די רויב מיט די פֿאָדערשטע פֿיס און עסט זי אויף, זיצנדיג אויף א וואסערגעוויקס.

מיר זעהען זי אָבער אויפֿן וואסער ניט נאָר צוליב כאַפֿן רויב, גייערט צוליב נאָך איין וואָך: זי לייגט אירע אייער אויף וואסערגעוויקסן, און אירע לארוועס לעבן אין וואסער עטליכע יאָר. די ליבעלע אנטוויקלט זיך פֿון לארוו, ניט דורכמאכנדיג דעם צושטאנד פֿון א פּאָפּקע. די לארוו פֿון דער ליבעלע האָט אן אויסגעצויגענעם גוף, דריי פּאָר פֿיס, מיט וועלכע זי גייט ארום אויפֿן גרונט פֿון די וואסערן. זי איז א גרויסער רויבער: זי גנבעט זיך צו צו קליינע אינסעקטן, פֿיש, ווערים — זי דערזעהט זיי מיט אירע גרויסע אויגן, כאפט זיי אָן מיט איר לאנגער אונטערלופ און צעגריזעט זיי מיט אירע שארפע מוילצווענגלעך. די לארוו עטעמט מיט דער לופֿט, וואָס געפֿינט זיך אין וואסער. ווען עס פֿארענדיגט זיך די צייט פֿון איר אנטוויקלונג, קריכט זי ארויס אויף א וואסערגעוויקס, די הויט שפאלט זיך ביי איר, און עס קריכט ארויס א פֿארטיגע ליבעלע. די פוסטע היימלעך קען מען אַפֿט געפֿינען אויף וואסערגעוויקסן.

פֿליהענדיג און ציטערנדיג מיט די פליגלען, גיט זי ארויס א באזונדערס סקרופנדיגן קלאנג, נאָך וועלכן מען קען זי דערקענען, אפילו ווען מען זעהט זי ניט.

דער געלראנד.

דער געלראנדיגער וואסערזשוק, געלראנד, לעבט אין וואסער. דאָ געפֿינט ער זיינע שפייז: ווערים, וואסעראינסעקטן, קליינע פֿישעלעך; ער איז א גרויסער פֿרעסער און בעת מען לאָזט אים אריין אין אַן אַקוואַריום, עסט ער אויף אלע איבעריגע איינוואוינער.



דער געלאראנד.

דעם געלאראנד איז גרינג צו דערקענען. פֿונאויבן איז דער גוף טונקלגרוין, די פֿליגלען האָבן א געלן ראנד, פֿונאונמן איז ער ברוין; דער גאנצער גוף איז פֿלאציג; די הינטערשטע פֿיס זיינען לאנג, באדעקט מיט האָר און זעהר בעווענליך — דאָס זיינען שווימ פֿיס; מיט זיי רודערט ער גע-שווימט אין וואסער.

ער עמעמט, ווי אלע אינסעקטן. מיט פֿרייע לופֿט און שמעקט צוליבדעם ארויס פֿון צייט צו צייט די בייכל פֿון וואסער, הייבט אויף די פֿליגלען און נעמט אריין אין זיך לופֿט. ווען ער עמעמט אריין גענוג לופֿט, קען ער זיך ווידער אראפֿלאָזן אין וואסער.

ווען דאָס וואסער ווערט אויסגעטריקנט, אָדער בעת עס פֿארוועלט זיך אים בייטן דעם אָרט, שפּרייט ער אויס די אונטערשטע דינע פֿליגלען און פֿליהט אוועק.

ער לייגט אייער צווישן וואסערגעוויקסן; פֿון די אייער קומען ארויס גרינע לארוועס מיט צוויי אָטעמערען פֿונהינטן, מיט דריי פּאָר האָריגע פֿיס. די לארווע שווימט, שלענגלענדיג זיך. זי איז נאָך א גרעסערע פֿרעסערקע און מערדערקע, ווי דער זשוק גופא. זי פֿאלט אָן אפֿילו אויף גרעסערע פֿיש. זי האָט ניט קיין אָפֿענע מויל, אנשטאָט דעם האָט זי צוויי שפיציגע מויל-צווענגלעך, ווי הערנער; זי שמעכט דורך די הויט פֿון דער חיהלע, וואָס זי באפֿאלט און לאָזט אריין אין וואונד איר גיפֿט. די פֿלייש פֿון דער חיהלע צעגייט דערפֿון און דאן זויגט זי עס אויס. !


די לארווע פֿארקריכט אין שליים אָדער אין זאמד און פֿארוואנדלט זיך

דארטן אין א פאָפּקע. אמאָל גייט ארויס א זשוק נאָך אין דעמוזעלביגן זומער, אָפּטמאָל אָבער ווינטערט די פאָפּקע איבער אין שליים. ווען דאָס וואסער ווערט צוגעפֿראָרן, פֿארקריכט דער זשוק אין מאָך און ווינטערט איבער אויף דער טריקעניש, גאָר זעלמן בלייבט ער אונטערן אייז.

דער ראק.

דער ראק האָט האַלט קלאַרע ריינע וואסער, דערפֿאר געפינט מען אים ניכער אין טייכן, איידער אין שטייעדיגע וואסערן. בייטאָג באהאלט ער זיך אונטער שטיינער, צווישן וואסערגעוויקסן אָדער אפֿילו אין קליינע נאָרקעס אין גרונט; ביינאכט קריכט ער ארויס פֿון זיין באהעלטעניש און זוכט שפייז. ער עסט אלץ, וואָס עס מאכט זיך: אינסעקטן, שגעקעס, פֿישלעך, ער בראקירט אָבער אויך ניט מיט קיין פֿלאנצנשפייז; וואָרצלשטאמען און יונגע שפראַצן פֿון וואסערגעוויקסן.

זיין גוף איז באדעקט מיט א הארטן פאנצער פֿון כימין און קאלד. זומער היטלט ער זיך, בייט די הארטע קאָרע. אכטצעהן טעג ביזוואנען עס וואקסט אים אויס דער נייער פאנצער, איז ער ווייך און אָהן א שויץ, צוליבדעם קריכט ער דעמאָלט זעלמן ארויס פֿון זיין באהעלטעניש. דער פאנצער איז



דער ראק.

פֿון „מיידעלדס טריבילדער“, פֿלג. C. C. Meinhold & Söhne אין דרעזדען.

העלגות אין קלארע דורכויכטיגע וואסערן און טונקלגרוין, כמעט שווארץ, אין טונקעלע וואסערן. בעת מען קאכט אפ א ראק, ווערט זיין פאנצער רויט. זיין גוף באשטייט פֿון צוויי טיילן, די קאָפּברוסט וואָס איז צוגעדעקט מיט איין גרויסן האַרמן שילד, און די לענגליכע בייכל, וועלכע באשטייט פֿון איינצלנע רינגען, וואָס האָבען יעדערער א באַזונדערן שילד. א דאנק דעם, איז די בייכל זעהר באַוועגליך און העלפֿט אים ביים שווימען. דערהויפּט דער לעצטער רינג, וואָס האָט עטליכע פּלאַציגע כימינפּלאַטן. מען רופֿט אים דערפֿאַר: "שווימעק".

אויפֿן קאָפּ האָט ער א פֿאַר גרויסע זעהר באַוועגליכע אויגן. איידער ער גייט ארויס פֿון זיין באַהעלטעניש, פֿאַרשט ער אויס גוט דעם אַרמ מיט זיינע אויגן. אויסצופֿאַרשן דעם אַרמ און דערשפּירן רויב אָדער א געפֿאַר העלפֿן אים אויך די צוויי פֿאַר טאַפּערס, וואָס ער האָט אויפֿן קאָפּ און וועלכע ער בעוועגט שמענדיג.

מערקווירדיג זיינען דעם ראַקס פֿיס. פֿון ערשטן קוק באַמערקן מיר פֿינף פֿאַר, וואָס זיינען צוגעוואַקסן צום קאָפּברוסט; באַזונדערס וואַרפֿט זיך אין די אויגן די ערשטע פֿאַר. זיי פֿאַרענדיגן זיך אזוי ווי מיט א שער, דאָס זיינען פֿאַנגערס, מיט זיי כאַפּט ער די רויב. די צווייטע און דריטע פֿאַר פֿיס האָבן אויך שערן, אָבער קלענערע; די פֿירטע און פֿינפטע האָבן גאַרניט קיין שערן. אויב מיר וועלן זיך אָבער צוקוקן אויפֿמערקזאם צו זיין מויל, וועלן מיר געפֿינען אפֿולע מוילצווענגלעך, וועלכע זיינען ווידער טאַקע קליינע פֿיס.

מיט די שערן פֿון די גרויסע פֿיס כאַפּט אָן דער ראַק זיין רויב, און צע-קוועטשט זי. מיט די איבעריגע פֿיס צעברעקלט ער זי, און שטופּט אריין אין מויל. אויף די רינגען פֿון זיין בייכל געפֿינען זיך ווידער פֿיס, שוין גאָר קליינע. זיי העלפֿן דעם ראַק גיין און שווימען, און אויף זיי טראָגט די ווייבעלע די אייער און שפעטער די יונגע ראַקעס, ביזוואָגען עס אַנטוויקלט זיך ביי זיי דער פּאַנצער.

בעת דער ראַק דערשרעקט זיך און וויל וואָס גיכער באַהאַלטן זיך אין זיין גאָרקע, קריכט ער אָדער שווימט הינטערוויילעך.


דער ראַק איז אן אמתע וואסערחה, ער עטעמט מיט די לופֿט, וואָס געפֿינט זיך אין וואסער. פֿון ביידע זייטן ברוסט אונטערן פּאַנצער האָט ער א באַזונדערן אָטעמאַרגאַן, די זשאַברעס. ער האָט אויך א האַרץ און בלוטאָדערן. איר קענט שוין אליין זעהן, נאָכן צודעק, נאָך די צעגלידערטקייט פֿון גוף און פֿון די פֿיס, אז דער ראַק פּונקט ווי די אינסעקטן און שפינען געהערט צו דעם קלאַס גלידער פֿיס יגע, אָבער שוין פֿון ערשטן קוק וואַרפֿן זיך אין די אויגן זיינע באַזונדערע איגנשאַפֿטן, און נאָך דייטליכער זעהט מען

דאָס, בעת מען פֿאַרשט אויס נעהענטער זיין לעבן און דעם אינערליכן בויו פֿון זיין גוף.

דער ראק האָט פֿיל קרובים אין אונזערע וואסערן און דערהויפּט אין ים; אנדערע דערגרייכן א באדייטנדיגע גרויס. אנדערע זיינען אזוי קליין, אז מען קען זיי זעהן נאָר דורך א שטארקע פֿאַרנערסערגלאַז. די געלערנטע נאטורפֿאַרשער פֿאַראייניגן זיי אלעמען אין א באזונדערן קלאס ראקעס.

די וואסערשנעק.

די וואסערשנעק באהאלט זיך צווישן וואסערגעוויקסן און שפּייזט זיך מיט זיי. זי האָט געוויס צוגעצויגן אייער אויפֿמערקזאמקייט מיט איר שפּיראל-פֿארדרייטער הייזעלע פֿון קאלך. אויב איר ווילט זיך נעענטער באקענען מיט דער קליינער באשעפֿעניש, לאָזט זי אריין אין א גלעזערנע כלי מיט וואסער, פֿאַרנעסט ניט אריינצולייגן א וואסערגעוויקסן. זי וועט נעמען קריכן



שנעקן.

(1) מעלערשנעק, (2) וואסערשנעק.

פֿי „קרעמעלינס לייטשײַט“. פֿ. ד. זואל. אינטערריכטײַט, פּאַרלאַנ B. G. Teubner אין לייפּציג און בערלין.

אויף די גלעזערנע ווענטלעך, זיך באוועגנדיג זעהר פאמעלעך אויף איר איינציגן פֿוס. אינדעראמתן, איז דאָס גאָר ניט קיין פֿוס, דאָס איז דער הינטערשטער טייל פֿון איר גוף, וואָס זי רוקט ארויס פֿון הייזעלע, בעת זי נעמט זיך באוועגן. דער פֿוס קנייטשט זיך כוואלעסווייז, און אזוי רוקט זי זיך לאנגזאם פֿאַרויס. זי האלט זיך אויף גלאטע גלאָז, ווייל איר פֿוס איז שליימיג און מיטן שליים קלעפט זי זיך צו צו אימליכן אויבערפֿלאַך.

פֿונפֿאַרנט איז דער קאָפּ. ער טיילט זיך גאָרניט אָפּ פֿון די איבעריגע טיילן פֿון גוף. אויפֿן קאָפּ האָט זי א פֿאַר אויגן, צוויי טאפּערס און א מויל.

זי שפייזט זיך מיט וואסערגעוויקסן, דערביי שמעקט זי ארויס פֿון מויל א הארט בלעטעלע און א האָרנדיגע צונג. די צונג איז ווי א ריבאייזן; מיטן הארטן בלעטעלע רייסט זי אָפּ די פֿלאַנץ און מיטן צונג צערייבט זי די שפיז. אויפֿן רוקן טראָגט זי איר הייזעלע. ביי די ברענעס פֿון הייזעלע זעהט זיך א געלע הייטל, דאָס איז דער מאנטל, וואָס כאפט ארום דעם אויבערשטן טייל פֿון גוף. לעבן מאנטל אָנאזייט געפֿינט זיך א לאַך, דאָס איז די אָטעמ-לאַך, דורך איר ציהט אריין די שנעק לופֿט אין אירע לונגען. אין א סכנה אָדער אין א טריקעניש באהאלט זי דעם גאנצן גוף אין הייזעלע און בא-וועגט זיך ניט. די שנעק לייגט קלוינע אייעלעך אויף וואסערגעוויקסן; זיי זיינען צוזאמענגעקלעפט איינע צו די אנדערע מיט דורכזיכטיגע שליים. אויף דער אונטערשטער זייט פֿון די גרויסע בלעטער ביי דער וואסערליליע קען מען אָפט געפֿינען אפֿולע אזוינע שליימיגע אייער. ביסלעכווייז אנט-וויקלען זיך פֿון די אייער אָהן פֿארוואנדלונגען יונגע שנעקעס. די הייזעלע אנטוויקלט זיך ביסלעכווייז פֿון די הארטע מינעראלישע שטאָפֿן, וואָס טיילן זיך אויס פֿון איר גוף.


פֿארהאנען זעהר פֿיל מינים שנעקעס, זיי אונטערשיידן זיך איינע פֿון די אנדערע מיט דער פֿאַרמע פֿון זייער הייזעלע, מיטן ארט לעבן. אזוי איז די הייזעלע ביי דער טעלערשנעק, אָדער שפולקע, א פלאציגע, ביי דער שליימ-שנעק איז זי אויסגעצויגן אין א לאנגן שפיץ; אפֿולע מינים שנעקעס לעבן ניט אין וואסער, נייערט אויף דער טריקעניש, אויף בלעטער פֿון געוויקסן אויפֿן ברעג פֿון וואסער, אין סאָד און אין וואלד. זיי נויטיגן זיך אין פֿייכטע לופֿט און קריכן ארום ביינאכט אָדער אין א גאסן וועטער. זיינטערצייט פֿאַר-קריכן זיי אין מאַך, פֿאַרמאכן די הייזעלע מיט א דעקל און פֿאלן אריין אין ווינטערשלאַף. ס'זיינען גאָר דאָ שנעקעס, וואָס האָבן ניט קיין הייזעלע, א-שטאט איר האָבן זיי מערניט, ווי א קלוינעם קאלכיגן פאנצער אויפֿן רוקן. די שנעק געהערט צו א באזונדערן טיפּ חיות, וואָס די נאטורפֿאַרשער רופן „ווייכנאָפֿיע“, ווייל זיי האָבן ניט קיין אינווייניגסטן סקעלעט, ווי די

רוקנוייליגע, און ניט קיין אויסערליכן, ווי די גלידער־פייסגע (אינסעקטן, שפיגען, ראקעס). אין דער נאטור זיינען דא זעהר פיל מינים ווייכנאפגע.

די שטרָאָממושל.

איר געפֿינט אָפֿט אויפֿן ברעג פֿון טייך אָדער אין וואסער גופא לענג-ליכע שיסעלעך. פֿונאויבן זיינען די קאלכיגע שיסעלעך טונקלערין, פֿונאויבן-ווייניג בליסמשענדיג, באדעקט מיט פערלמוטער. אין די שיסעלעך לעבן ווייכנאפגע היהעלעך, שטרָאָממושלען. בעת איר נעמט אזא היהעלע ארויס

פֿון וואסער, ליגט זי צווישן צוויי אועלכע שיסעלעך, און ביידע העלפֿטן זיינען צוגע-מאכט. ווי א טייסטערל. מען קען זיי עפֿענען נאָר מיט דער גרעסטער אָנשטרענגונג. דאָס האלט די היהעלע צוגעמאכט איר הייזל מיט צוויי בא-זונדערע שטארקע מוסקולן. אין וואסער לאָזט זי פאמעלעך ארויס איר ווייסן מוסקולדיגן פֿוס און גראָבט זיך איין מיט אים אין זאמד, זי באוועגט זיך כמעט ניט. די מושלען



שטרָאָממושל.

פֿון „קרעפֿעלין, לייטפֿארן פֿ. ד. זאָל, אינטעררייכט.“
פֿאַרלאַג B. G. Teubner אין לייפֿציג און בערלין.

זיינען אביסל געעפֿנט, און דורכן שפאלט גייט אריין וואסער. זי עמעמט מיט דער לופֿט, וואָס געפֿינט זיך אין וואסער און שפייזט זיך מיט דעם, וואָס דער וואסערשטראָם ברענגט אריין אין גוף. געוואוינליך זיינען דאָס נאָר קליינע וואסערגעוויקסן און היהעלעך, וואָס מען קען זיי אפילו מיטן אויג ניט זעהן. אויב ס'וועט זיך אייך אמאָל איינגעבן צו עפֿענען א לעבעדיגע מושל און זיך אויפֿמערקזאמער איינצוקוקן אויף איר, וועט איר ניט געפֿינען ניט קיין קאָפּ און ניט קיין אויגן. איר וועט נאָר גע-פֿינען א קליינע מויל לעבן פֿוס; דער גוף איז צוגעדעקט מיט צוויי דינע בלעטעלעך פֿון ביידע זייטן, דאָס איז דער מאנטל, אונטערן מאנטל ליגן פֿון ביידע זייטן די זשאברעס און צווישן זיי דער גוף. דער באוואוסטער נאטור-פֿאָרשער שמייל באשרייבט אזוי איר גוף: שמעלט זיך פֿאָר א בוך — ביידע טאָולען פֿון אייבונד זיינען די שיסעלעך, וואָס זיינען פֿון איין זייט פֿאַראייניגט דורך א שלאָס, ווי די טאוולען דורכן רוקן; דער ערשטער און

לעצמער בלאט פֿון בוך זיינען די ביידע העלפֿטן פֿין איר מאנטל; דער צווייטער און דער דריטער בלאט פֿון יעדער זייט בוך זיינען די זשאברעס פֿון ביידע זייטן, וואָס זעהען אויס ווי צארמע בלעטעלעך. די איבעריגע בלעטער פֿון בוך צוזאמענגענומענע אלע אינאיינעם — דאָס איז דער גוף פֿון דער חייהלע.

וועלכע איינוואוינער, געוויקסן און חיות, פֿון דער גרויסער לעבנסגע-
מיינשאַפֿט אין וואסער זיינען אייך באוואוסט?

דער אקוואריום.

אן אקוואריום איז א קינסטליכע וואוינונג פֿאַר פֿאַרשידענע וואסער-
חייהלעך. דער איינפֿאַכסטער אקוואריום איז א גלעזערנער סלאיק מיט
וואסער. בעסער איז אָבער א פֿירקאנטיגער גלעזערנער קאסטן. אויפֿן דעק
שיט מען אן א שיכט ערד (וומפערד), אויף איר א שיכט ריינע זאמד, אין
גרונט אָדער אין קליינע טעפעלעך פֿלאנצט מען איין וואסערגעוויקסן,
צווייגעלעך פֿון דער עלאָדעע לאָזט מען פֿראַסט שווימען אין וואסער. ווען
דאָס וואסער שטייט זיך אָפֿ, לאָזט מען אריין פֿישעלעך, וואסעראינסעקטן
און אנדערע וואסערחייהלעך. וואָספֿאַר א באטייט עס האָבן דאָ די וואסער-
געוויקסן, קענט איר שוין אליין פֿאַרשטיין. מען דארף ניט אריינגלאָזן אין
אקוואריום אוינע חיות, וואָס קענען זיך ניט איינלעבן צוזאמען. ווען מען
לאָזט אריין למשל אן אקוואריום א געלראנד, וועט ער אויפֿעסן אלע
איבעריגע איינוואוינער. אויב אייך איז טייער דאָס לעבן פֿון אלע איינ-
וואוינער, האלט אוינע גולנים אין א באזונדערן אקוואריום. באזונדערס פֿיל
פֿרייד וועט איר האָבן, אויב אין פֿריהלינג וועט איר אריינגלאָזן אין אקוואריום
אייער פֿון א פֿראַש. איר וועט זעהן, ווי זיי וועלן זיך אנטוויקלען. וועגן
שפּייז פֿאַר זיי וועט איר אויך ניט דארפֿן זאָרגן. פֿריהער שפּייזן זיי זיך מיטן
שליים, וואָס די אייער זיינען אין אים איינגעוויקלט, שפעטער מיט די קלענסטע
טיילן פֿון פֿלאנצן, וואָס געפֿינען זיך אין וואסער. וואסערשנעקעס לעבן זיך
אויך גוט איין אין אקוואריום, זיי שיערן שמענדיג מיטן פֿוס און מיטלמיויל
די פֿאַרגרינטע ווענטלעך פֿון אקוואריום און אויף אזא אופֿן רייניגן זיי אים.
אין אפֿולע גרויסע שמעט זיינען דאָ אקוואריוםס, וואו מען האלט און מען
האָדעוועט אפֿילו נמפֿיש און אנדערע וואסערחיות. זיי זיינען איינגעאָרדנט
און ווערן אויסגעהאלטן לויט די אנווייזונגען פֿון נאטורפֿאַרשער. זעהר א
רייכן אקוואריום פֿאַרמאָגט די שמאָט בערלין. ער געפֿינט זיך אין דעמזעלביגן
אַרט, וואו דער טערראריום, און איז אויך אָפֿן פֿאַר אלעמען. אין א יום-
טובדיגן טאָג קען מען זעהן לעבן די גלעזערנע ווענט פֿון אקוואריום

הונדערטער מענשן, גרויסע און קליינע, וואָס באוואונדערן דעם אינטערעסאנטן לעבן פֿון פֿיש און אנדערע וואסערחיות.


אין דייטשלאנד געפֿינט איר כמעט אין יעדער שול א קליינעם אקוואריום. די פֿיש און די חיהעלעך געפֿינען שוין די קינדער אליין. דאָס איז גאָרניט שווער: אין איטליכן גראָבן, אין יעדער סאזשלקע וויבלט און גריבלט מיט אלערליי חיהעלעך. א נעץ צו כאפֿן זיי, איז זעהר גרינג צו מאכן אליין. נייט אויף א זעקעלע (מען קען אים מאכן מיט א שפיץ, ווי א קעזיק) פֿון מערלע, טול, אָדער אן אנדער שיטערן שטאָף, ציהט אָן דעם ברייטן עק אויף א דראַטענעם רינג און בינדט אָן דעם נעץ אויף א שטעקן. פֿאַרנעסט ניט מיטצונעמען א גלעזערנע כלי, וואו איר זאָלט קענען אריינגלאָזן אייער פֿאַנג.

ניטבלומיגע אָדער ספֿאַרנפֿלאַנצן.

די גראז אין וואלד באשטייט פֿון פֿאַרשיידענע פֿלאַנצן. בעת מיר קוקן זיך צו אויפֿמערקזאמער צו זייער לעבן, באמערקן מיר, אז סזיינען דאָ פֿלאַנצן, וואָס בליהען קיינמאָל ניט און אנטוויקלען זיך אויף גאָר א באזונדערן אופן. מיר געפֿינען ביי זיי ניט קיין בליהונג און ניט קיין זאָט אין פֿולן זין פֿון וואָרט. מיר האָבן געזעהן, אז די פֿלאַנצן אונטערשיידן זיך איינע פֿון די אנדערע דורך זייער זאָט, און פֿונדעסטוועגן האָבן מיר אין אלע זאָטן געזעהן א שפראַצער און שפראַצ-אָדער-זאָטבלעטער, ביי תבואות און גרעזער — איין שפראַצבלאט, ביי באָב, ארבעס און אפֿולע אנדערע — צוויי. ביי נאדל-געוויקסן זיינען דאָ עטליכע שפראַצבלעטער. ביי די ניטבלומיגע געוויקסן אָבער געפֿינען מיר ניט, ניט קיין שפראַצער און ניט קיין שפראַצבלעטער.

דער פאפערעט.

דער פאפערעט איז זעהר קענטיג אין דער נאטור. אין פֿייכטע און שאַטנדיגע וועלדער האָט איר געוויס באמערקט זיין ראָזעמע פֿון גרויסע פֿיין געשניטענע און געפֿעדערטע בלעטער, וואָס הויבן זיך אויף גלייך פֿון דער ערד; קיין שטאם איז ניט קענטיג. פרובט אָפֿרייסן די בלעטער, שוין אין א קורצער צייט ארום וועלן זיי פֿאַרדאַרן, זיי נויטיגן זיך שטאַרק אין פֿייכט קייט. דער פאפערעט איז א שאַטנגעוויקס. איר האָט דאָס שוין געוויס אליין א טראכט געטאן, בעת איר האָט דערזעהן זיינע גרויסע און דינע בלעטער. מיט זיי קלייבט ער צונויף די שטראלן פֿון דער זון, וואָס דרינגען קיים דורך דורך די בויער. אין דער ראָזעמע זיינען די בלעטער אזוי צו זאמענגעשטעלט, אז זיי פֿאַרשמעלן ניט איינער דעם אנדערן די ליכטיקייט.



פאפערעט.

(1) א ספאראנגיע, ארויסלאזנדיג ספאָרן.

(2) קליינער פאפערעט.

פֿון „פֿראַנקשמייל, לייטפֿ. פֿ. ד. באַט. אינטער.“, פֿלנ. B. G. Teubner אין לייפּציג און בערלין.

די פֿיינע צעטיילטקייט פֿון בלאט האָט אויך א געוויסן באטייט: דער ווינט צערייסט ניט דעם גרויסן און דינעם בלאט, ווייל ער גייט דורך דורך די שפאלטן פֿון די קליינע בלעטעלעך.

דער יונגער בלאט גייט ארויס פֿון דער ערד שפיראליג צונויפֿגעוויקלט אויפֿאינווייניג און באהאָרט מיט ברוינע שופֿעלעך. שפעטער פֿאלן די שופן אראָפֿ.

אין דער ערד האָט דער פאפערעט א גראָכן און א הארטן וואָרצל-שטאַם מיט שפורן פֿון אלטע בלעטער; איין זייט שטארבט אפֿ, אָבער דער שפיץ פֿון דער אנדער זייט אנטוויקלט זיך און וואקסט אלץ ווייטער; דער פאפערעט איז צוליבדעם א פֿיליאריגער געוויקס. דער וואָרצלשטאַם פֿאַר-פֿעסטיגט זיך אין דער ערד דורך אפֿולע וואָרצלען, דערפֿאַר איז אים שווער ארויסצורייסן פֿון דער ערד.

די בלעטער האָבן אדערן, דאָס זיינען קאנאלן פֿאַר זאפֿטן, דער פאפערעט ציהט שפיז פֿון דער ערד און גאזן פֿון דער לופֿט, און ארבעט דאָס איבער אין זיינע גרויסע גרינע בלעטער, פונקט אזוי ווי די בלומיגע געוויקסן.

דער אונטערשייד ווייזט זיך ארויס, בעת מען פֿאַרגלייבט די פֿאַרמערונג און די אנטוויקלונג פֿון פאפערעט מיט די פֿאַרמערונג פֿון די איבעריגע געוויקסן.

סוף זומער באווייזן זיך אויפֿן אונטערשטן פֿלאך פֿון בלאט הייטעלעך. זיי דעקן דאָס צו די קליינע ברוינע הייפֿעלעך פולווער, וואָס נעמט זיך שיטן, בעת מען טרייסלט דעם בלאט. לייגט אוועק פאפערעטבלעטער אויף א בויגן ווייסע פאפיר, וועט זיך אָנשיטן א מאסע דינע, ברוינע פולווער. יעדער קערנדל פולווער איז זעהר קליין און גארניט ענליך צו א זאָט, אָדער א פֿרוכט-קערנדל. מען רופט זיי ספֿאַרן. דער וויגט צעווייהט זיי אין אלע זייטן.


אויף זעהר פֿייכטע ערד גייט די ספֿאַרע אויף. פֿון איר אנטוויקלט זיך א הארצעפֿאַרמוגער גרינער בלעטעלע, וואָס לאָזט ארויס פֿון זיך דינע וואָרצלען, ווי האָר. מיט די וואָרצלען און דעם גרינעם גוף קלייבט אָן דאָס יונגע געוויקסעלע שפיז; דאָס איז דער פֿאַרשפראַצער. די ספֿאַרע גופא איז צו אָרעם מיט שפיז, פֿון איר קען זיך דער פאפערעט ניט אנטוויקלען. ער וואקסט אויס פֿון פֿאַרשפראַצער.

אין אונזערע וועלדער טרעפֿן זיך עטליכע מינים פאפערעט. זעהר פֿאַר-שפרייט איז דער ווערימפאפערעט מיט זיינע דינע דאָפלט געפֿעדערטע בלעטער. פֿון זיין וואָרצלשטאַם באקומט מען א מימל אָפצוטרייבן ווערים; דערמיט דערקלערט זיך זיין גאָמען.

זיסוואָרצל הייסט א צווייטער מין, מיט האַרטערע בלעטער, וואָס זיינען געשניטן איין מאָל און ניט דאָפלט.

דער אָדלערפאפערעט האָט זעהר גרויסע געצווייגטע בלעטער.

דאָס הארטע שאכטלגראז, וואָס ווייזט אויס ווי א קליינע יאָדלע, איז אויך



שאכטלגראָז.

- פ. פֿרוכפערדיגע פֿריהלינגדיגע שפראַצן.
- ז. אומפֿרוכפערדיגע זומערדיגע שפראַצן.
- ס. ספֿאָראַנניען.

פֿון „קדמפֿעלין, לייטפֿ. פֿ. ד. כּאָט. אונטערר.“ פֿלנ. B. G. Teubner אין לייפּציג און בערלין.


א ספֿאָרנגעוויקס. זיינע ספֿאָרן אנטוויקלען זיך נאָר פֿריה אין פֿריהלינג אויף א באזונדערן שטאם און זיינען צוזאמענגעקליבן אין א העלברוינע סעסקעלע.

אין די וואַרעמע לענדער וואַקסן ריזיגע פּאפּערעטן מיט א גראָבן האַלציגן שטאם, וואָס איז אינגאנצן באַדעקט מיט נארבן פֿון אַראָפּנעפֿאלענע בלעטער. ער האָט ניט קיין צווייגן און טראַגט אויפֿן שפּיץ א ראָעטקע פֿון שיינע לאנגע בלעטער. אוא פּאפּערעט וואַקסט הונדערטער יאָרן. ער נויטיגט זיך אין פֿיל פֿייכטקייט און וואַרעמקייט. די געלערנשע מיינען, אז די ערד האָט זיך שטאַרק געביטן. אמאָל, מיט טויזנטער יאָרן צוריק, איז אויף דער נאַנצער ערד געווען הייס, אזוי ווי איצטער אין די הייסע לענדער. די ערד פֿלעגט אין יענע צייטן אויך באַקומען גענוג פֿייכטקייט פֿון שטאַרקע און אָפֿטע גוס־רעגנס. דעמאָלט איז אויך געווען אויף דער ערד אפֿולע געדיכטע וועלדער, וואָס אין זיי זיינען געוואַקסן ריזיגע ביימער פֿון דעם מין פּאפּערעטן און שאַכטלגראָז.

בוימער פֿלעגן איינפאלן אויף דער פֿייכטער ערד, דער ווינט פֿלעגט אָפּברעכן צווייגן און בלעטער און אויסבעטן דעם וואלד מיט א גרָאָבן שיכט פֿוילעכץ. וואסער פֿלעגט פֿארפֿלייצן די וועלדער און אָנטראָגן זאנד און ערד אויף די געפֿאלענע ריין. ליגנדיג אָהן לופט אונטער דעם דרוק פֿון דער ערד, פֿלעגן זיי פֿוילן וואר אויף א באַוונדערן אָפּן; זיי פֿלעגן פֿאַמעליך פֿאַרקוילט ווערן און ווערן דערביי שוואַרץ און דארט, ווי שפּייז, אזוי האָבן זיך געשאפֿן די שטיינקוילן, וועלכע די מענשן גרָאָבן איצט אויס פֿון די טיפֿענישן פֿון דער ערד. אין די קוילנדיבער געפֿינט מען פֿאַרשטיינערטע שמאַמען פֿון בוימער, אינם זאמד צווישן די שיכטן שטיינקוילן און אויף די שטיינקוילן גופֿא געפֿינט מען שפורן פֿון בלעטער, וואָס ווייזן אויס ווי אפּערעטבלעטער.

מאָך.

מיט מאָך איז אויסגעבעט דער באָדן פֿון אונזערע וועלדער; דאָס איז א קליינער ניט קענטיגער געוויקס, אָבער זיין ראָל אין דער נאַטור איז זעהר גרויס; לאָמיר זיך דערפֿאַר נעהענטער באקענען מיט זיין לעבן. ס'זיינען פֿאַרהאן זעהר פֿיל מינים מאָך. מיר וועלן זיך אָפּשטעלן אויף איין מין, וואָס איז זעהר פֿאַרשפּרייט און קענטיג. דאָס איז דער גאַלדענער צאָפּ אָדער קוקאווקע פֿלאַקס. דער דינער שטענגעלע איז געדיכט באזעצט מיט לענגליכע דרייקאַנטיגע בלעטער לעך. קיין אָדערן זיינען אין די בלעטעלעך ניטאָ. פֿונאַונטן איז דער שטענגל באַוואַקסן מיט ברוינע הערעלעך, מיט זיי פֿאַרפֿעסטיגט זיך די מאָך אין באָדן און ציהט אריין פֿייכטקייט און שפּייז פֿון דער ערד. קיין וואַרצלען זיינען ניטאָ.



גאלדענער צאָפּ.
 (1) הייבל.
 (2) קאָפּל מיט הייבל.
 (3) געעפֿנטע קאָפּל.

פֿון „פֿראַנקע־שטייל, רעאליענבוך“;
 ב. I. אויסג. A.
 פֿלג. B. G. Teubner אין לייפּציג און בערלין.

דער אונטערשטער טייל פֿון שטענגל שטאַרבט אָפּ, דער אויבערשטער אָבער וואַקסט ווייטער; אַנשטאַט די הערעלעך, וואָס שטאַרבן אָפּ צוזאַמען מיטן אונטערשטן טייל, וואַקסן אויס העכער גייע הערעלעך

אויפֿן לעבעדיגן טייל פֿון שטענגל.

מאָך וואַקסט זעהר געדיכט, דער גאַנצער באָדן ווערט אויסגעבעט מיט זייער ווייכן געפֿלעכט; די בלעטער, דער שטענגל און די הערעלעך קענען

אריינגעמען אין זיך זעהר פיל וואסער. אפולע וואסער פארהאלט זיך צווישן די בלעטער און די הערעלעך און ווערט זעהר פאמעליך אויסגעדעמפט. דער מאַכקישן זופט זיך אָן מיט וואסער, ווי א שוואם.

מאָך ווערט אָהן וואסער אויסגעטריקנט, אָבער ווינאָר מען ברענגט דעם שטענגעלע ווידער אין וואסער אריין, לעבט ער ווידער אָפּ און זיינע בלעטעלעך ווערן ווידער גריין. מאָך בלייבט גריין אפילו ווינטער אויך.

סוף זומער וואקסט אויס אויפֿן שטענגעלע א לאנגער רוימליכער שטיל מיט א קאפּסעלע, וואָס איז פֿריהער צוגעדעקט מיט א צארטע געפֿרענזלמע קאפע. דערנאָך פֿאלט די קאפע אראָפּ, פֿון קאפּסעלע פֿאלט אויך אראָפּ זיין רונדער דעקעלע, און עס שיט זיך ארויס א דינער גרינליכער פולווער. דאָס איז נישט קיין אנדער זאך, ווי ספּאָרן. פֿון די ספּאָרן אנטוויקלט זיך אויף פֿייכטע ערד א פֿאַרשפּראַצער, ער זעהט אויס ווי דינע גרינע פֿעדים; אין דער ערד לאָזט ער אריין דינע הערעלעך. פֿון דעם פֿאַרשפּראַצער וואקסט אויס מאָך.

מאָך וואקסט ביי אזעלכע באדינגונגען, ביי וועלכע קיין שום אנדערע פֿלאנצונג וואָלט נישט געקענט וואקסן: אויף פֿעלזן און שטיינער, אויף דער קאָרע פֿון אלטע בוימער, אויף דעכער, אויף זומפּן און אין וואסער.

לאָמיר זיך קלאר מאכן דעם באטייט פֿון מאָך אין לעבן פֿון דער נאטור. די מאָך פֿון אונזערע וועלדער זופט גיריג אריין דאָס וואסער, וואָס טריפט אראָפּ פֿון די בוימער, דעמפּט עס פאמעליך אויס, דערפֿאר איז די לופט אין וואלד שטענדיג פֿייכט.

די מאָך פֿארהאלט דאָס וואסער אין א גוסרענן, אפילו אין בארגיגע ערטער, און די ערד ווערט נישט אזוי ניד אויסגעטריקנט. איר קענט שוין אליין פֿארשטיין, וואָספֿאר א גרויסן באטייט דאָס האָט פֿאר אלע גע-וויקסן.


אין געדיכטן מאָך ווינטערט איבער די זאָט, וואָס פֿארווייט זיך אין הארכסט. דאָ געפֿינט זי אויך די פֿייכטקייט, אָהן וועלכע זי קען זיך נישט באגיין, בעת זי הייבט אן אויפֿצוגיין.

דער אונטערשטער טייל פֿון מאַכשטענגל שטארבט אָפּ, ווערט צעפֿוילט און שאפט הומוס.

דעם גרעסטן באטייט האָט אויך די מאָך, וואָס פֿארשפּרייט זיך אויף פֿעלזן און שטיינער. יעדער מאַכעלע פֿאר זיך איז שוואך, אָבער אין גרויסע מאסן טוען זיי אויף א ריזיגע ארבעט. זיי באגענוגענען זיך מיט די ערנסטע באדינגונגען אויף די היילע שטיינער. זאמלענדיג וואסער, צעשמערן זיי די שטיינער. פֿארהאלטנדיג שטויב און פֿוילנדיג, שאפֿן זיי הומוס און גריימן צו

א פֿרוכפערדיגן באָדן. די ארבעט גייט פאמעליך, זי געדויערט מויזונטער יאָרן, אָבער זי בייט אום דעם פֿנים פֿון דער ערד. אפֿולע אינסעקטן געפֿינען אין מאָך א באהעלטעניש, אהין פֿארקריכן זיי אויפֿן לאנגן קאלטן ווינטער. אפֿולע היהעלעך לייגן אין מאָך זייערע אייער, באהאלטן זיך פֿון אַ שטארקערן שונא אָדער לויערן אויס רויב. פֿויגל פֿאַר- פֿלעכטן און בעטן אויס מיט מאָך זייערע געסטן.

טאָר פֿמאָך איז בלייבנדיג, וואקסט אין זומפיגע וועלדער און דערהויפֿט אויף אָפֿענע זומפֿן. זי נעמט אריין אין זיך דורך די בלעטער און דורכן שטענגל נאָך מער וואסער, ווי אלע איבעריגע מינים מאָך און וואקסט זיך זעהר גיך פֿונאנדער. די אונטערשטע טיילן שטארבן אָפֿ. אויף זיי וואקסן אויס נייע, און אזוי פֿון יאָר צו יאָר, ביזוואגען דער גאנצער זומפֿ ווערט אויסגעבעט מיט א גראָבן שיכט אָפֿגעשטאָרבענע מאָך. דער וואקס איז אזא גיכער און רייכער, אז די אָפֿ געשטאָרבענע טיילן באווייזן ניט פֿאַרפֿוילט צו ווערן. די פֿרישע מאָך, וואָס וואקסט אויס, לאָזט גיט צו קיין לופֿט, און די אָפֿגעשטאָרבענע מאָך ווערט צוגעפרעסט אזוי ווי מיט א מעכטיגן פרעס, זי ווערט אזוי ווי פֿארקוילט. פֿון איר שאפֿט זיך א הארטע שווארצע אָדער ברוינליכע מאסע, וואָס ברענט און גיט אפֿולע היץ. די מאסע רופֿט מען טאָרף. אין אפֿולע זומפיגע געגנטן איז טאָרף א וויכטיגער הייצמאטעריאל, דער- הויפֿט אין פֿאַבריקן.



טארפֿמאָך.
פֿון „קרעטעלין, לייטפֿ. פֿ. ד.
באָט. אונטערד., פֿלינ.
B. G. Teubner אין לייפֿציג
און בערלין.

טאָרף ווערט אויסגעגראָבן פֿון דער ערד, גע- פרעסט, געטריקנט און צעשניטן אויף שטיקער, ווי ציגל. וואָס טיפֿער דער טאָרף ליגט, אלץ הארטער איז ער, אלץ שווערער איז אין אים צו דערקענען די פֿארטריקנטע אָפֿגעשטאָרבענע מאָך; אין די אויבערשטע שיכטן איז דער טאָרף ווייכער און מען קען אפֿילו אונטערשיידן די אָפֿגעשטאָרבענע מאַכפֿעדיים. דערמאָנט זיך, ווי עס האָבן זיך געשאפֿן שטיינקוילן און פֿאַרגלייכט ביידע פֿראַצעסן. דער מענש באנוצט זיך אָפֿט מיט מאָך. מיט מאָך פֿאַרשטאָפט מען די שפאלטן, בעת מען בויט הילצערנע הייזער, אין מאָך פֿאַקט מען איין ברעכיגע זאכן, מיט טרוקענעם מאָך שטאָפט מען אָן קישנס, אין נאָסן מאָך פֿירט מען אריבער לעבעדיגע בלומען און געוויקסן.

שוועמלעך.

שוועמלעך באווייזן זיך אין אונזערע וועלדער סוף זומער. באזונדערס רייך מיט שוועמלעך זיינען פייכטע וועלדער, דערהויפט אין א רעגנדיגן זומער. פיל שוועמלעך געפינט מען אין ווארעמע טעג נאך א רעגן. זיי וואקסן זעהר גיך. היינט איז נאך פון זיי קיין סימן ניטא, און אויפמארגן קענען מיר אויפן זעלבדיגן אָרט געפינען א גאנצע מאסע. היינט קלייבן מיר צונויף נאָר, און אויפמאָרגן געפינען מיר זיי ווידער אויף דעם אייגענעם אָרט. א שוועמל באשטייט פון צוויי טיילן. מיר אינטערעסירן זיך געוואוינטליך נאָר מיטן אויבערשטן טייל; דער אונטערשטער ליגט אין דער ערד און בא- שטייט פון צארטע פֿעדערס, דאָס איז טאקע דער שוועמל גופא. דער אויבערשטער טייל איז נאָר זיין פֿרוכטטרעגער. בעת מען רייסט אָפּ דעם אויבערשטן טייל, וואקסט דער אונטערשטער ווייטער.

דער אויבערשטער טייל באשטייט פון א פֿיסעלע און א הימעלע. די הימעלע זעהט אויס ביי אפֿולע שוועמלעך ווי א שירעמל, ביי אנדערע ווי א קיילעכדיגע אָדער שפיציגע קעפעלע, ביי א טייל איז דער גאנצער שוועמל אזוי ווי א קנאָל.

דער אויבערשטער טייל איז א פֿרוכטטרעגער, ווייל אין שירעמל שאפֿן זיך ספֿאָרן. די ספֿאָרן זיינען אויך א שיטיגער פולווער. דער ווינט צעווייטה זיי אין אלע זייטן, און זיי גייען אויף אין פֿייכטער ערד, וואָס איז רייך מיט הומוס.

ביי אפֿולע שוועמלעך געפינען זיך די ספֿאָרן צווישן די צארטע בלעטעלעך אונטערן שירעמל. די בלעטעלעך גייען זיך פֿונאנדער ווי שמראלן פון מיטן צום ברעג; ביי אנדערע שוועמלעך איז דער שירעמל געדיכט בא- זעצט מיט קליינע רערעלעך. מיר זעהען מערניט ווי אפֿולע קליינע לעכעלעך, וואָס די ספֿאָרן שיטן זיך פון זיי ארויס; ביי די קנאָליגע שוועמלעך זיינען די ספֿאָרן אין קעפעלע גופא; ס'איז אייך אפשר אויסגעקומען צו זעהן דעם פולווערשוועמל, ער זעהט אויס ווי א ווייסער קייל. שפעטער ווערט ער טונקל און טרוקן. בעת מען צעקוועטשט אים, שיסט ארויס א גרינליכער פולווער, דאָס זיינען זיינע ספֿאָרן.

ביי אפֿולע שוועמלעך איז דער אויבערשטער טייל פֿריהער איינגעדעקט אין א שיד. שפעטער פלאצט ער, און עס בלייבט פון אים איבער נאָר א הויטיגער רינג ארום פֿיסל. שוועמלעך זיינען פֿארהאָנען ווייסע, ברוינע, רויטע, געלע, נאָר קיין גרינע טיילן באמערקן מיר ביי זיי ניט. זיי קענען וואקסן אינדערפֿינסטער אויך. זיי האָבן ניט קיין גרינס (כלאָראָפֿיל); דערפֿאַר קענען זיי אויך ניט צעלייגן אויף דער זון קיין קיילנזויערן גאו אויף קיילנ-

שמאָף און זויערשמאָף. די שוועמלעך קענען זיך אליין גוט שאַפן קיין בוישמאָפן פֿון גאון און מינעראלישע שמאָפן, זיי מוזן באקומען פֿארטיגע בוישמאָפן. דערפֿאר קענען שוועמלעך וואקסן גאָר אויף פֿוילעכץ, וואו די שמאָפן געפֿינען זיך. די ערד אין וואלד איז רייך מיט פֿוילשמאָף. אין ווארעמע און גאסע מעג קומט פֿאר גיכער די פֿוילונג, און דעמאלט קענען די שוועמלעך זיך גוט אנטוויקלען. דער גוף פֿון שוועמל באשטייט פֿון צארטע, ווייכע פֿלייש, וואָס איז זעהר געשמאק און זעטיג און ווערט אויסגענוצט פֿון מענשן, ווי אַ שפּייז. אפֿולע שוועמלעך אָבער זיינען גיפֿטיג און קענען ווערן גיפֿטיג, אויב זיי ווערן אלט. ס'זיינען גיטאָ קיין שום באשטימטע סימנים, ווי צו דער- קענען גיפֿטיגע שוועמלעך, דערפֿאר מוז מען זיין זעהר פֿאָרויכטיג מיט זיי.

גיפֿטיג איז דער פֿלינגשוועמל (מוכאָמאָר). ער האָט אַ ווייסן פֿיסל, א פּורפורוויסן שירעמל מיט ווייסע פֿלעקן. די ספּאָרן געפֿינען זיך צווישן די בלעטעלעך אונטערן שירעמל. לייגט אים אוועק אויף אַ בויגן פּאפּיר מיט די בלעטעלעך אראָפּ, און עס וועלן זיך אָנטישן ספּאָרן. דער יונגער שוועמל

איז איינגעהילט אין אַ שייד, וואָס שפעטער פּלאנצט זי, און עס בלייבן פֿון איר גאָר ווייסע פֿלעקן אויפֿן שירעמל און דער הויטגער רינג אויפֿן פֿיסל. זעהר געשמאק און נוצליך איז דער ווייסער שוועמל (שאַמֿד פיניאָן). ער וואקסט אפֿילו אויף לאַנקעס, דערהויפּט אויף פּוטערלאַנקעס, ווייל ער אנט- וויקלט זיך גוט אויף ערד, וואָס איז פֿעט באמיסטיגט מיט פֿערדישע מיסט. דער פֿיסל און דער שירעמל זיינען ווייס. די בלעטעלעך מיט די ספּאָרן אונטערן שירעמל זיינען פֿונ- אנהייב ראָזליך, דערנאָך בריוו, שפעטער ווערן זיי כמעט שוואַרץ. גאָך דעם סימן קען מען אים דערקענען.

צו די נוצליכע שוועמלעך געהערט אויך דער שמיג-



שאמפיניאָן.

פֿון „פֿיאנקע-שטייל, רעאליענבור, בר. I, אויסג. A. פֿלג B. G. Teubner אין לייפציג און בערלין.



שטיינשוועמל.

פֿון „פֿראַנקע־שטייל, רעאליענבוך“, ב.ד. I, אויסג. A.
פֿל. B. G. Teubner אין לייפציג און בערלין.

שוועמל. ער האָט א העלברוינעם קנאַלפֿאַרמיגן פֿיסל און א טונקלברוינעם קעפל. די ספּאָרן געפֿינען זיך ביי אים אין רערעלעך. פֿריהער זיינען די רערן ווייס, דערנאָך געל, און שפעטער גאָר ווערן זיי גרין. דעמאָלט איז דער שוועמל שוין אלט און מען דארף אים ניט עסן, ער קען זיין שעדליך.

עס זיינען דאָ שוועמלעך־פֿאראויסן, וואָס וואקסן אויף אנדערע געוויקסן און שפייזן זיך מיט זייערע זאפֿטן. צו דעם מין געהערט דער פֿייערשוועמל (טרומ), וואָס צעוואקסט זיך אויפֿן שטאם פֿון אלטע בוימער; דער שאָדן, וואָס ער מאכט אָן דעם אלטן בויים,

איז ניט גרויס. שעדליכע פֿאראויסן זיינען די שוועמלעך, וואָס פֿארשפרייטן זיך אויף די בלעטער און קערנער פֿון תבואה. דאָס זיינען די שוועמלעך, וואָס מיר קענען זיך מיט זיי באקענען אויפֿן תבואה־פֿעלד — מוטערהאַרנד־שוועמל, תבואהבראנד און תבואהרֶאָסט.

אנדערע שוועמלעך פֿארשפרייטן זיך אויף נאסע צעפֿוילטע האָלץ, אין פֿייכטע דירות. וואקסן זיי אויס אויף די ווענט; אויף אלטע פֿלייש, אויף קעז, ברויט, טיגט אנטוויקלען זיך שימלשוועמלעך. אויסערדעם זיינען נאָך דאָ שוועמלעך, וואָס זיינען אזוי קליין, אז מען קען זיי זעהן נאָר דורך א שמארקע פֿאַרגרעסערנלאָז. מיט זיי וועלן מיר זיך נאָך באקענען באזונדער.

שוועמלעך איז אן אינטערעסאנטע דערשיינונג אין דער נאטור. זיי באַ־וויון, אז אין דער נאטור גייט קיין זאך ניט אינוועזן, אז פֿון איין שטאָף ווערט אן אנדער שטאָף. פֿון די ארַאָפּגעפֿאלענע צווייגן, בלעטער, נאָדלען, וואָרצלען און אנדערע געוויקסטילן ווערט פֿוילעכץ, אויף דער פֿוילעכץ און פֿון איר גופא ווערן די וואונדערליכע שוועמלעך; אזוי רייניגן די שוועמלעך די נאטור. אָט אזוי זעהען מיר, ווי פֿון פֿוילעכץ און טויט ווערט געשאפֿן א ניי לעבן.

וואסערוואקסן (אלגען).


אין וואסער זיינען אויכעט פֿאַרהאַנען געוויקסן, וואָס פֿאַרמערן זיך דורך ספּאָרן. אין אונזערע וואסערן, דערהויפּט אין די שטייעדיגע, איז זעהר פֿאַר־

שפרייט איין מין וואסערוואוקס, די פֿעדימוואוקס. זי זעהט אויס ווי דינע, גרינע פֿעדים אָדער האָר. אנדערע פֿארציהען, ווי א דינער גרינער הויך, שטיינער און ברעטער אונטערן וואסער, זיי פֿארציהען אויך די גלעזערנע וועגטלעך פֿון אקוואריום. די גרינע פֿארב באַווייזט, אז זיי האָבן כלאַרפֿיל און צעלייגן קוילנזויערן גאז אויף קוילנשטאָף און זויערשטאָף. די איבעריגע שטאָפֿן באַקומען זיי פֿון וואסער. זיי האָבן ניט ניט קיין וואַרצלען, ניט קיין שטאם און ניט קיין בלעטער. דער גאנצער גוף באשטייט פֿון איין גרינער צארטער מאסע, וואָס שווימט ארום אין וואסער און נעמט אריין שפייז מיטן גאנצן גוף. אָפֿטמאָל פֿארמערן זיי זיך אזוי שטארק אין קליינע שטייעדיגע וואסערן, אז דאָס וואסער ווערט פֿון זיי אינגאנצן גרין. געהענטער קען מען זיך באקענען מיט זויער לעבן נאָר דורך א זעהר שטארקע פֿארגרעסערגלאָז. וואסערוואוקס שפילט א געוויסע ראָלע אין לעבן פֿון וואסער. אפֿולע וואסעררחיהעלעך שפייזן זיך מיטן וואסערוואוקס, ער רייניגט די לופֿט אין וואסער און שמעלט צו זויערשטאָף.

א מערקווירדיגער וואסערוואוקס וואקסט אין ים. עס טרעפֿן זיך גרינע, ברוינע און אפֿילו רויטע ימטאנגען. זיי זעהען אויס, ווי לאנגע, אָפֿטמאָל צעצווייגטע בענדער, זיי משעפענען זיך צו מיטן אונטערשטן ווייט צו שטיינער און פֿעלן אונטערן וואסער. זעהר פֿארשפרייט איז די ברוינליכע בלאַוואוקס מיט שווימבלאָזן אויף די לאנגע בענדער. פֿון איר אש באקומט מען יאָד.

דער מיקראַסקאָפּ.

ווער עס וויל פֿארשמיין דאָס לעבן פֿון דער נאטור, מוז קענען קוקן אויף איר מיט אויפֿמערקזאמע אויגן. אָבער דעם מענשנס אויג איז צו שוואך, זעהר פֿיל דערשיינונגען קען זי ניט דערוועהן; שוין פֿון פֿארצייטן אָן זוכט דער מענש מיטלען צו פֿארשארפֿן זיין בליק. אזא מיטל איז דער מיקראַסקאָפּ, וואָס פֿארגרעסערט יעדע זאך אין עטליכע הונדערט מאל. דער מיקראַסקאָפּ האָט פֿאר אונז געעפֿנט א נייע וועלט פֿון וואונדערליך קליינע באשעפֿענישן, וואָס שפילן זעהר א וויכטיגע ראָלע אין דעם לעבן פֿון דער גרויסער וועלט, וואָס מיר זעהען מיט אונזערע אויגן. איר האָט געוויס געזעהן געוואוינטליכע פֿארגרעסערגלעזער. רונדע גלעזער, אויסגעבויגן פֿון ביידע זייטן, אזוי ווי גרויסע לינזן. מיט זיי באנוצט זיך א זיינערמאכער, בעת ער דארף זיך איינקוקן אויף די קלענסטע רעדעלעך פֿון א זיינער. פֿרובט זיך איינקוקן דורך אזא גלאָז אויף אַן אות אָדער אויף א פֿליגעלע. די זאך וועט אייך פֿאַרקומען גרעסער, איר וועט זי זעהן דייט ליכער, אָבער קיין נייע וועלט וועט זיך נאָך פֿאר אייך ניט עפֿענען. דער



מיקראסקאפ.

פֿון דער אָפטישער פֿאַבריק קאַרל צייס אין יענאַ.

מיקראַסקאָפּ באַשטייט פֿון עט-
ליכע אזוינע גלעזער, דערפֿאַר
איז זײַן ווירקונג זעהר אַ שטאַרקע,
ער פֿאַרגרעסערט איטליכע זאַך
אין עטליכע הונדערט מאל.

דער מיקראַסקאָפּ באַשטייט
פֿון צוויי מעשענע רערן, אַ
גרעסערע און אַ קלענערע, וואָס
שרויפֿן זיך אַרײַן איינע אין די
אַנדערע. די גרעסערע גלאָז
פֿונאַויבן הייסט אָקולאַר, צו איר
לייגט מען צו די אױג, די
קלענערע גלאָז פֿונאַונטן הייסט
אָביעקטיוו (זאַכגלאָז). אָט די גלאָז
שטעלט מען אָן אױפֿן געגנ-
שטאַנד, וואָס מיר ווילן באַטראַכטן.
די רערן מיט די גלעזער
זײַנען צוגעשרויפֿט באַוועגליך צו
אַ שווערן מעטאַלענעם פֿוס, וואָס
אױף אים האַלט זיך דער מי-
קראַסקאָפּ.

צו דעמועלבינן פֿוס איז
צוגעשרויפֿט אַ קליינער מעטאַ-
לענער טישעלע מיט אַ רונדער
לעכל אינמיטן, די לעכל קומט
אױס פֿונקט אַנטקעגן דעם אָב-
יעקטיוו. אונטערן טישעלע געפֿינט

יך אַ באַוועגליכער שפּיגעלע. דעם שפּיגעלע קען מען אזוי איינשטעלן, אַז
ער זאָל ווערן גוט באַלויכטן פֿון דער זון אָדער פֿון אַ לאַמפּ, און די שטראַלן
זאָלן זיך אָפּשלאַגן צוריק פֿון שפּיגעלע און דורכגיין דורכן לעכל פֿון טישעלע.
אין מיקראַסקאָפּ קען מען זעהן נאָר קליינע גוט באַלויכטענע דורכזיכטיגע
זאַכן. די זאך, וואָס מען וויל זעהן, לייגט מען אוועק אױף אַ שטיקל גלאָז,
מען באַנעצט זי מיט אַ טראָפֿן וואַסער, מען דעקט זי צו מיט אַ קליינע
דינע גלעזעלע (דעקגלעזעלע) און מען לייגט זי אַרױף אױפֿן טישעלע איבערן
לעכל.

אידער מען לייגט אוועק די זאך, דאַרף מען אוועקשטעלן דעם מיק-

ראַסקאַפּ אויף א מיט לעבן א ליכטיגן פֿענסטער אָדער לעבן א גוטע לאַמפּ, אַנשמעלן דעם שפיגעלע און זיך איינקוקן דורכן אָקולאר; עס דארף זיך זעהן א רונדע, זעהר ליכטיגע פֿעלד. כל זמן אין מיקראַסקאָפּ איז פֿינסטער, איז ניטאָ וואָס צו קוקן. מען דארף קוקן אין מיקראַסקאָפּ און דרייען דעם שפיגעלע אזוי לאנג, ביזוואנען ס'וועט ווערן ליכטיג. דאן ערשט לייגט מען אוועק די גלעזעלעך מיט דער זאך, וואָס ווערט באלויכטן פֿון צוויי זייטן, פֿונאויבן און פֿונאונטן דורך דעם שפיגעלע.

סקען זיין, אז איר וועט פֿונאנהייב נאָרניט זעהן, אָבער האָט געדולד. דער מיקראַסקאָפּ מוז ווערן אנגעשטעלט נאָך אייער אויג נאָך. די רערן לאָזן זיך דאָך אראָפּ און הויבן זיך אויף, באוועגט זיי פאמעליך ביזוואנען איר וועט די זאך דערזעהן.

די קליינע באשעפֿענישן, וואָס מען קען זעהן נאָר דורכן מיקראַסקאָפּ רופֿן אָן די געלערנטע מיקראַגאָניזמען. אָרגאניזם הייסט א קערפֿער, און מיקראָ הייסט זעהר א קליינער. עס זיינען דאָ מיקראָאָרגאניזמען חיות און מיקראָאָרגאניזמען פֿלאַנצן.

דורכן מיקראַסקאָפּ איז אויך וויכטיג צו זעהן טיילן פֿון גרויסע אָרגאניזמען. דאן גיט זיך אונז איין צו זעהן און צו פֿארשטיין, ווי זיי זיינען אויפֿגעבויט, צו באנעמען זעהר וויכטיגע דערשיינונגען פֿון לעבן, וואָס אָהן מיקראַסקאָפּ וואַלטן זיי געבליבן פֿאַר אונז אויפֿאייביג פֿאַרבאָרגן.


זיך באנוצן מיט א מיקראַסקאָפּ איז ניט שווער, מען מוז זיך אייגניטן און האָבן אפֿולע געדולד. שווערער איז אָבער צוצוגרייטן די זאכן, מען זאָל זיי קענען זעהן אין מיקראַסקאָפּ. די זאכן, וואָס מען באטראכט אין מיקראַסקאָפּ, הייסן פֿרעפֿאַראַטן. פֿרעפֿאַראַטן הייסט צוגרייטן. די פֿרעפֿאַראַטן מוזן זיין דין און דורכזיכטיג.

מיקראַסקאָפּישע היהעלעך.

די קלענסטע היהעלעך לעבן אין וואסער. אמאָל גיט זיך שוין איין צו געפֿינען זיי אין א טראָפּן רעגנוואסער, וואָס איז עטליכע טעג געשטאנען. אָבער אויב איר האָט א מיקראַסקאָפּ און ווילט זיי זעהן, נעמט אביסעלע צעריבענע היי, באניסט עס מיט וואסער און לאָזט עס שטיין אקורצע צייט. אין א טראָפּן פֿון אזעלכע וואסער וועט איר דערזעהן דורכן מיקראַסקאָפּ זעהר פֿיל קליינציקע היהעלעך. זיי זיינען אזוי איינפֿאַך געבויט, אז די געלערנטע רופֿן זיי אָן אורחיות, ערשטגעשאפֿענע אָדער געבאָרענע. אזויווי מען געפֿינט זיי מאסנווייז אין וואסער, וואָס איז געווען אויפֿגענאָסן אויף

פּוילנדיגע שטאַפּן, רופט מען זיי נאָך אַן אינפּוּזאָריעס ד. ה. אויפגע-
גאַסענע.

אין דעם טראָפּן הייזאסער וועלן מיר באמערקן א באשעפּעניש, וואָס
איז ענליך צו א שיכעלע, און רופט זיך אַן דערפאַר פּאַנטאָפּעלע. איר גאַנצער
גוף באשטייט פֿון איין שטיקעלע דורכזיכטיגע
שליים. אינווייניג זעהט זיך א קליינער קערנדל
אָדער יאדרע, אויכעט פֿון דיזעלביגע שליים. אינ-
ווייניג זעהען זיך נאָך אפֿולע קליינע בלעזעלעך
(בלאָטערס). די פּאַנטאָפּעלע שווימט אַרום אין
וואסער, באזענדיג מיט אירע הערעלעך, מיט
וועלכע זי איז אינגאנצן באזעצט. דורך א ברייטע
לאַך (די מויל) נעמט זי אריין שפּייז, נאָך קלענערע
פֿלאַנצן און חיות ווי זי אליין, און די קלענסטע
ברעקעלעך פֿון פֿאַרשיידענע שטאַפּן.



פּאַנטאָפּעלעך.

(ב) בלאָטער, (מ) מויל.

(ה) הינטנרינג.

פֿון „קרעסעלין, לייטפֿ. פֿ. ד. זאָל. אונטערד.

פֿל. B.G. Teubner אין לייפּציג און בערלין.

זי פֿאַרמערט זיך, טיילנדיג זיך אויף צוויי
חלקים. פֿון אן איינאונאיינציג היהעלע קען אין
א קורצער צייט געשאפֿן ווערן א מיליאָן נייע.
זיי קענען לעבן נאָר אין וואסער; בעת דאָס
וואסער ווערט אויסגעטריקנט, דעקן זיי זיך צו
אזוויי מיט א האַרטער קאפּסל. דער ווינט
צעטראָגט זיי אין אלע זייטן. ווינאָר זיי פֿאלן
אריין אין וואסער, הויבן זיי ווידער אָן צו לעבן.
איצט קענט איר פֿאַרשטיין, פֿונוואנען זיי
האָבן זיך גענומען אין די היי. דער ווינט האָט
אין שטויב פֿאַרטראָגן פֿאַרטריקנטע אינפּוּזאָריעס
אויף די היי, און אין וואסער האָבן זיי אויפֿ-
געלעבט.

עס זיינען דאָ אין דער נאטור זעהר פֿיל

מינים איינפֿאַכע היהעלעך. ביי אפֿולע פֿון זיי

האָט אפֿילו דער גוף קיין באשטימטע פֿאַרמע גיט.

דאָס איז א שטיקעלע שליים, וואָס זעהט אמאָל


אויס, ווי א טראָפּן פֿליסיקייט, אמאָל לאָזט עס ארויס אזוי ווי א

שליימיגן פֿיסעלע, אמאָל צעניסט עס זיך אין אלע זייטן מיט אזעלכע

פֿיסעלעך און נעמט זיי ווידער אריין. זי האָט גיט קיין מויל, ווי די

פּאַנטאָפּעלע, און נעמט אריין קליינע ברעקעלעך מיט אירע שליימיגע


פֿיסעלעך. אויך זי פֿאַרמערט זיך, טיילנדיג זיך. אזוינע שליימיגע היהעלעך



אמעבע.

(ק קערן. ב) בלאַטער.

פֿון „קרעפּעליון, לייטפֿ. פֿ. ד. זאָל. אונטערר. פֿלנ. B. G. Teubner אין לייפּציג און בערלין.



אמעבע.


(ק קערן. ב) בלאַטער.

הייסן אמעבעס. מען קען זיי אויך געפינען אין היי וואסער. אויף דער יבשה שמארבן זיי.

מיקראַסקאָפֿישע פּלאַנצן.

באקטעריעס אָדער שפּאלטשוועמלעך.

באקטעריעס זיינען די קלענסטע לעבעדיגע באשעפֿענישן, מען קען זיי באמערקן נאָר דורך די שטארקסטע מיקראַסקאָפּן. יעדע באקטעריע איז ניט מער, ווי א שטיקעלע שליים, וואָס איז דאָס רוב באצויגן מיט א הייטעלע. דאָס מערקווירדיגסטע ביי די באקטעריעס איז זייער פֿאַרמערונג, וואָס קומט פֿאַר מוראדיג גיך. זיי טיילן זיך אויף צוויי חלקים. באקטעריעס האָבן די פֿאַרמע פֿון קייקעלעך, שטעקעלעך און פֿעדימלעך.



טובערקולאז
(אויסצערונג)



טיפוס



דיפטעריע



אינפלוענצא



כאלערע



פעסט



סאפ

באקטעריעס.

פֿון „פֿאָנקע־שטייל, רעאלענבוכ ברו. I, אויסג. A. פֿלנ. B. G. Teubner און לייפציג און בערלין.

אוויווי די פֿאַרמע פֿון אַ שמעקעלע טרעפֿט זיך זעהר אָפֿט, האָט מען זיי אלעמען אָנגערופֿן מיטן נאָמען באַקטעריע, וואָס הייסט שאַעקעלע. באַקטעריעס קענען לעבן אויף פֿוילשמאָף און ווי פֿאראויסן אויף אנדערע לעבעדיגע באַשעפֿענישן. אליין זיך שאַפֿן שפּייז און בוֹישמאָפֿן קענען זיי ניט. באַקטעריעס זיינען זעהר לעבנספֿעהיג, טראָגן אריבער קעלט, טריקעניש און לעבן אָפֿ, ווען זיי פֿאַלן ווידער אריין אין גוטע באַדינגונגען. אין שלעכטע באַדינגונגען ווערט גאָר זייער הייטל דיקער; זיי זיינען פֿול אומעטום, אין וואַסער, אין דער לופֿט און אין דער ערד.

דערזעהן אַ באַקטעריע אין מיקראָסקאָפֿ איז שווערער ווי אַן אינפּוזאָריע. ערשטנס, איז זי פֿיל קלענער, אנדערע באַקטעריעס זיינען אָהן אַ פֿאַרב, גיסן זיך צונויף מיט דער פֿאַרב פֿון דער פֿליסיקייט אָדער פֿון דעם שאַפֿף, אין וועלכן זיי לעבן. כדי זיי צו דערזעהן, מוז מען זיי באַפֿאַרבן; מען שפּריצט אריין אַ טראָפֿן פֿאַרב אין דער פֿליסיקייט, וואו מען רעכנט, אַ זיי געפֿינען זיך.

ניט קוקנדיג אויף דעם, וואָס זיי זיינען אווי קליין, שפּילן זיי די גרעסטע ראָלע אין דער נאַטור.

יעדע באַקטעריע שפּייזט זיך, ארייננעמענדיג אין זיך שמאָפֿן פֿון דער אַרומיגער וועלט. אָמדי שמאָפֿן אַרבעט זי איבער אין איר קליינעם איינפֿאַכן גוף און לאָזט זיי ווידער אַרויס שוין אנדערע איבערגעביטענע. אויף אזא אָפֿן בייט זי איבער אַרום זיך די וועלט.

דורך ועהר גענויע אויספארשונגען האָט זיך איינגעגעבן צו דערוויסן, אז מילך ווערט זייער דערפֿון, וואָס אין איר פֿאלן אריין אזוינע באקטעריעס. זיי ארבעטן אויס אין איר אזוינע נייע שטאָפֿן, וואָס די מילך ווערט פֿון זיי פֿארוייערט.

דאָסזעלבע קומט פֿאַר מיטן זייערטייג, פֿון וועלכן מען באקט ברויט, מיט אונערקעט, ווען זיי ווערן פֿארוייערט.

מיר ווייסן, אז נאָך זייער טויט ווערן די שטאָפֿן פֿון לעבעדיגע בא-שעפענישן, פֿלאנצן און חיות, צעפֿילט, צעפֿאלן אויף איינפֿאכערע שטאָפֿן; אין א לעבעדיגן אָרגאניזם זיינען די שטאָפֿן געווען פֿאראייניגט צווישן זיך, געבונדן. איצט צעטיילן זיי זיך, באפֿרייען זיך, צעמישן זיך מיט דער לופֿט און מיט דער ערד; נייע און יונגע פֿלאנצן ציהען זיי ווידער אריין אין זיך און בויען אויף נייע שטאָפֿן; אָבער, כדי דאָס זאָל קענען פֿאַרקומען, מוזן די אָפֿגעלעבטע שטאָפֿן צעפֿאלן, באפֿרייען זיך. מיר רופֿן אָן דעם פֿראָצעס פֿון צעפֿאלונג—פֿילונג. אָטדי פֿילונג רופֿן ארויס געוויסע פֿוילבאקטעריעס; אָהן זיי קען די צעפֿאלונג ניט פֿאַרקומען.

בעת מען וויל פֿארהיטן פֿלייש אָדער פֿרוכט פֿון פֿילונג, דערהיצט מען עס שטארק און מען פֿארמאכט עס פֿעסט, עס זאָל ניט צוקומען קיין לופֿט. אין דער לופֿט טראָגן זיך אלעמאָל ארום באקטעריעס, מיט דער היץ טויט מען זיי.

אויסער אָטדי באקטעריעס זיינען אָבער דאָ נאָך באקטעריעס-פֿאראויסן, וואָס באועצן זיך אין קערפער פֿון מענשן און חיות, פֿארמערן זיך שטארק אין א קורצער צייט און רופֿן ארויס די שווערסטע און געפֿערליכסטע קראנקייטן. פֿון קראנקן מענשן פֿארשפרייטן זיך די באקטעריעס אויף אנדערע מענשן, וואָס ווערן אויך קראנק. דערפֿאר זאָגט מען, אז אזוינע קראנקייטן זיינען קלעפֿיג.

צו אזוינע באקטעריעס געהערט די באקטעריע פֿון טובערקולאָז, וואָס זעהט אויס ווי א קליינער דינער שמעקעלע. זי באועצט זיך אין פֿארשיידענע טיילן פֿון קערפער, דערהויפֿט פֿארשפרייט זי זיך אין די לונגען און רופֿט ארויס די געפֿערליכע קראנקייט פֿון אויסצערונג. די באקטעריע פֿון כאַלערע זעהט אויס ווי א קאָמא, זי רופֿט ארויס א שרעקליכע קראנקייט אין די נעדערס; די באקטעריע פֿון דיפֿטעריט רופֿט ארויס א האַלוקראנקייט.

כמעט אלע קראנקייטן ווערן ארויסגערופֿן פֿון באקטעריעס, נאָר ניט אלע באקטעריעס האָט זיך איינגעגעבן צו געפֿינען. געלערנטע לייבן פֿיל מיה, כדי צו געפֿינען די באקטעריעס פֿון אלע קראנקייטן.

ווען מען געפֿינט שוין די באקטעריע, באקענט מען זיך דורכן מיקראָס-קאָפֿ מיט איר לעבן, מען געפֿינט ארויס, ביי יועלכע באדינגונגען זי אנטוויקלט

זיך גוט און וואָס עס ווירקט אויף איר שלעכט. אַטדאָס וויסנדיג, קען מען געפֿינען מיטלען, ווי זיך פֿון איר צו פֿאַרהיטן, ווי זי אומצוברענגען.
אזוי האָט מען זיך איבערצייגט דורך אסך פֿרוּבן, אז געוויסע מינים באַקטעריעס שטארבן אויס פֿון גרויס היץ. מיר ווייסן, אז וואסער קאָכט ביי 100°, אזא מעמפּעראַטור טויט אפֿולע באַקטעריעס. אסך באַקטעריעס פֿאלן אריין אין מעגשליכן קערפּער מיטן וואסער, וואָס ער טרינקט, דערהויפּט באַקטעריעס פֿון טיפּוס און כאַלערע. דערפֿאַר דאַרף מען טרינקען נאָר געד קאָכטע וואסער. אנדערע באַקטעריעס שטארבן אויס, אויב זיי ווערן שטאַרק באַשטראַלט פֿון דער זון, דערפֿאַר איז וויכטיג, אין אונזערע הייזער זאָל אריינגי קומען די זון. דערהויפּט איז דאָס א גוטער מיטל קעגן טובערקולאָז.
כמעט אלע באַקטעריעס שטארבן אין שפּירעטעס, דערפֿאַר איז גוט אָפּגעוואשן מיט שפּירעטעס די הענט, אויב מיר האָבן זיך אָנגערירט אָן א קראַנקן אָדער אָן זיינע זאַכן.

דיעלביגע ווירקונג האָט אויף די באַקטעריעס קאַרבאָל און נאָך אנדערע מיטלען.

אין שטויב געפֿינען זיך אלעמאָל אפֿולע באַקטעריעס, דערפֿאַר זעהט מען צו פֿאַרהיטן די הייזער און די גאַסן פֿון שטויב.

איר האָט געוויס געהערט דעם אויסדרוק «דעזינפֿעקציע», דאָס הייסט טויטן די באַקטעריעס. אין א שטוב, וואו ס'איז געווען א קראַנקער, מאַכט מען א «דעזינפֿעקציע»: מען קאָכט אויס דעם קראַנקנס וועש, זיינע אויבערשטע קליידער און בעמגעוואנט דערהינט מען אין באַזונדערס טרוקענע אויוונס; די בעט און די דילן וואשט מען מיט קאַרבאָל, די ווענט ווייסט מען מיט קאַלך. קאַלך טויט אויך באַקטעריעס.

ריינקייט איז דער וויכטיגסטער מיטל קעגן געפֿערליכע באַקטעריעס.

די צעלע.


מיר האָבן שוין געזעהן, אז אלע באַקטעריעס, צו וועלכן מין זיי זאָלן ניט געהערן, באַשטייען פֿון א שטיקעלע שליים, זיי ווייזן אָבער ארויס אלע סימנים פֿון לעבן: זיי באַוועגן זיך, שפּייזן זיך, נעמען אריין אין זיך שטאַפֿן, אַרבעטן זיי איבער, לאָזן זיי ווידער ארויס, פֿאַרמערן זיך און שטאַרבן. דאָס שטיקעלע שליים איז א לעבעדיגער קערפּער, אן אָרגאַניזם. אמת, זעהר א קליינער. דאָס מערקווירדיגסטע אָבער איז, אז אַטדער קליינער אָרגאַניזם געפֿינט זיך אין דער געהענסטער קרובהשאַפֿט מיט אלע לעבעדיגע אָרגאַניזמען אין דער נאַטור, קליינע און גרויסע, פֿלאַנצן און חיות.

אַטדי דערשיינט עפֿנט פֿאַר אונזערע אויגן דער מיקראָסקאָפּ. אז מיר

קוקן זיך איין אויף א טייל פֿון א לעבעדיגן אָרגאניזם (פֿון א פֿלאַנצונג אָדער א חיה) אין מיקראַסקאָפּ, זעהען מיר, אז ער איז ניט ווי פֿון איין שטיק, ווי איז אָדער גלאָז, נאָר ער איז צוזאמענגעשטעלט פֿון באַזונדערע טיילן, פונקטווי א וואנט פֿון ציגל; די טיילן האָבן דאָס רוב די פֿאַרמע פֿון קליינע קעסטעלעך, קעמערלעך. דערפֿאַר רופֿט מען זיי צעלן.


מיר ווייסן, וועלכע זאכן מען קען זעהן דורכן מיקראַסקאָפּ: דאָס מוזן זיין גאנץ דינע דורכזיכטיגע שטיקעלעך; מיט דער גרעסטער פֿאַרזיכטיקייט שניידט מען אפּ מיט א גאָלמעסער א שטיקעלע פֿון א בלאט, פֿון א וואַרצל, פֿון א שטאם, אָדער א דין הייטעלע פֿון א גליד פֿון א חיה אָדער א מענשן. גרינגער איז צו באַקומען א פרעפֿאראט פֿון א געוויקס, דערפֿאַר איז אויך גרינגער געווען זיך צו באַקענען פֿריהער מיט א פֿלאַנצנצעלע. די אויס־פֿאַרשונגען האָבן באַוווּן, אז דער אונטערשייד צווישן א פֿלאַנצנצעלע און א היצעלע איז זעהר א קליינער.

איטליכע צעלע איז א שטיקעלע שליימיגע זיך ציהענדיגע שטאָף, וואָס די געלערנטע רופֿן אַן פֿראַטאָפּלאַזמע, ד. ה. אורשטאָף, ערשט געבאַרענע אָדער געשאַפֿענע. אין דער פֿראַטאָפּלאַזמע איז דאָ א קערנדל אָדער א יאָדער פֿון דעמזעלביגן שטאָף. ביי די פֿלאַנצנצעלן איז די צעלע באַצויגן, אזוי ווי מיט א האַפֿטיגערע הייטל, ביי די היצעלן איז דאָס רוב קיין הייטל ניטא. די אמעבע איז א חיה, וואָס באַשטייט נאָר פֿון איין צעלע, זי האָט ניט קיין הייטל, און מיר האָבן שוין געזעהן, אז די פֿראַטאָפּלאַזמע ציהט זיך ביי איר אויס אין אלע זייטן, לאָזט ארויס אזוי ווי פֿיסעלעך. די באַקטעריע איז א געוויקס, וואָס באַשטייט נאָר פֿון איין צעלע, און האָט ארום זיך א דין הייטל. ביי גרעסערע חיות און געוויקסן באַשטייט דער אָרגאניזם פֿון



אפולע אוויגע צעלן. מיר זעהען דאָס דייטליך, בעת מיר קוקן זיך איין אין מיקראַסקאָפּ אויף א דורכזיכטיגן בלאט פֿון א עלאָדעע אָדער פֿון מאַך, אויף א דיגעס פֿאָדים פֿון א וואסער־וואַקס. דאסזעלביגע זעהען מיר, אויב מיר קוקן זיך איין אויף א דיגע דורכזיכטיגע הייטעלע, וואָס מען צופט אפּ פֿון א בלאט. די פֿאַרמעס פֿון די צעלן בייטן זיך, זיי זייגען אנדערס אין בלאט, אנדערס אין שטאם, אנדערס אין וואַרצל; דאָסזעלביגע באַמערקן מיר, בעת מיר באַקענען זיך מיט די צעלן אין פֿאַרשיידענע טיילן פֿון קערפּער פֿון א חיה. צעלן זייגען דאָ פֿירקאנטיגע, רונדע, לענגליכע, פֿילקאנטיגע מיט שפיץ, ווי שמערנדלעך, א. א. וו. די צעלן לעבן, זיי נעמען אריין אין זיך שפיץ, פֿאַרמערן זיך, זיך טיילנדיג. אין א פֿרישן בלעטעלע פֿון דער עלאָדעע קען מען אפֿילו אין מיקראַסקאָפּ באַמערקן, ווי די פֿראַטאָפּלאַזמע באַוועגט זיך אין צעלע.

וועגן לעבעדיגע געוועבן.



פֿעדימדיגער
וואסער־וואַקס.

פֿון „קרעעלין. לייפּס.
פֿ. ד. באַשאַנ אונטערד.“
פֿאַרל. B. G. Teubner
אין לייפּציג און בערלין.

בעת אן אמעבע אָדער א באַקטעריע פֿאַרמערט זיך, טיילט זי זיך. פֿון איין צעלע ווערן צוויי; די נייע צעלע טיילט זיך אָפּ פֿון דער אלטער און הייבט אן צו לעבן באַזונדער. ביי די גרעסערע אָרגאַניזמען, ביי פֿלאַנצן און חיות, טיילן זיך אויך די צעלן, אָבער די צעטיילטע חלקים זייערע טיילן זיך ניט אָפּ אייגע פֿון די אנדערע, די נייע פֿאַראייגיגן זיך מיט די אלטע און אזוי שאַפֿן זיך גאַנצע געוועבן. יעדער אָרגאַניזם באַשטייט פֿון געוועבן. אזא איינפֿאַכער אָרגאַניזם, ווי דער פֿעדימדיגער וואסער־וואַקס, באַשטייט נאָר פֿון איין געוועב, וואָס איז צוזאַמענגעשטעלט פֿון לענגליכע האַלציגע צעלן. ביי אנדערע געוויקסן און חיות באַשטייט דער אָרגאַניזם פֿון עטליכע פֿאַרשיידענע געוועבן, וואָס אונטערשיידן זיך אייגע פֿון די אנדערע מיט דער פֿאַרמע פֿון זייערע צעלן. ביי איינצעליגע אָר-גאַניזמען קומט פֿאַר דאָס גאַנצע לעבן אין דער איינציגער צעלע. זי פֿירט אויס אלע אַרבעטן, וואָס האַלטן אויף דעם לעבן. אין א אָרגאַניזם מיט אפֿולע צעלן און געוועבן, איז דאָס לעבן פֿון איין צעלע ענג פֿאַרבונדן מיטן לעבן פֿון דער אנדערער, איין געוועב איז פֿאַרבונדן מיט דעם אנדערן, אָבער איטליכער פֿירט אויס אַר א געוויסע אַרבעט. די אַרבעט איז אזוי ווי צעטיילט. אזוי זעהען


מיר, אז די צעלן פֿון בלאטגעוועב נעמען אריין און לאָזן ארויס גאזן, די צעלן פֿון וואַרצלגעוועב נעמען אריין פֿליסיקייטן, די צעלן פֿון שטאמגעוועב זיינען קאנאלן פֿאַר זאפֿטן א. א. וו.

די פֿלאנצנצעלע.

אז מען באקענט זיך נעהענטער מיט דער פֿלאנצנצעלע אין מיקראסקאפ, פֿאַרשטייט מען אויך בעסער דאָס גאַנצע לעבן פֿון די פֿלאנצן.

יונגע צעלן זיינען כמעט אינגאנצן אנגעפֿילט מיט פֿראַטאָפּלאַזמע. די פֿראַטאָפּלאַזמע האָט אין זיך אייווייס, דעמועלביגן שטאָף, פֿון וועלכן עס באשטייט די ווייסל פֿון אן איי. אין יונגע צעלן קען מען גרינג זעהן דעם קליינעם קערנדל, די יאדרע. די יאדרע האָט א גרויסן באטייט. צעלן, וואָס פֿאַרלירן די יאדרע, הערן זיך אויף צו טיילן, צו פֿאַרמערן זיך. אין דער פֿראַטאָפּלאַזמע פֿון די בלאטצעלן געפֿינען זיך קליינע גרינע קערנדלעך, בלאטגרינס (כלאָראַפֿיל), פֿון זיי איז דאָס דער בלאט גרין. די הייטל פֿון פֿלאנצנצעלע באשטייט פֿון א האַפֿטיגערן שטאָף, וואָס מען רופֿט

אן צעלוליאָזע. די הייטל לאָזט דורך גאזן און פֿליסיקייטן, און דערפֿאַר קומט פֿאַר א שמענדיגער אויסבייט צווישן די שטאָפֿן אין צעלע און די שטאָפֿן פֿון דער אַרומיגער סביבה, און צווישן די שטאָפֿן פֿון איין צעלע מיט די שטאָפֿן פֿון די איבעריגע צעלן. די צעלע נעמט אריין שטאָפֿן, אַרבעט זיי איבער און טיילווייז גיט זי זיי אויך צוריק ארויס. זי בייט זיך. די פֿאַרענדערונגען קען מען באמערקן דורכן מיקראַסקאָפּ. אין די עלטערע צעלן ווערן אין פֿראַטאָפּלאַזמע אזוי ווי בלויון, פּוסטע ערטער, וואס פֿילן זיך אָן מיט פֿאַרשידענע זאפֿטן. די פֿראַטאָפּלאַזמע רוקט זיך אלץ מער אָפּ צו דער הייטל, נאָר איינציגע פֿעדים ציהען זיך דורך דער נאַנצער צעלע. די זאפֿטן, וואָס פֿילן אָן די צעלע, זיינען רייך מיט צוקער, זאלצן, פֿאַרשידענע זויערקייטן. די הייטל בייט זיך



פֿלאנצנצעלן.

פֿון „פֿראַנקעדישמײל, רעאליענכד“.

בד. 1. אויסג. A.

פֿאַרלאַ B. G. Teubner אין ליפּציג און בערלין.

אויך. זי ווערט דיקער, אויף איר לייגן זיך אָפּ פֿאַרשידענע הארטע שטאָפֿן. אין דער הארטער גראַבער הייטל בלייבן אָבער דינע טיילן, וואָס דורך זיי

קענען נאך אלץ דורכגיין גאון און פליסיקייטן, די צעלן ווערן פֿארהאָלצט. אזוי ווערן ביי אפֿולע געוויקסן פֿארהאָלצט די צעלן פֿון שטאם. די פֿלאַנצן ווערן פֿון דעם פֿעסטער, קענען זיך בעסער האַלטן. ביי געוויסע געוויקסן בייטן זיך די הייטלעך פֿון די צעלן אזוי, אז זיי לאָזן אינגאנצן ניט דורך ניט קיין פֿליסיקייטן, ניט קיין גאון, די צעלן ווערן פֿאַרקאָרקט. (דערמאָנט זיך ביי וועלכע געוויקסן און אין וועלכע טיילן אַרבעט זיך אויס קאָרקגעוועב. וואָספֿאַר א באַטייט האָט דאָס פֿאַרן געוויקס?)

וויאזוי עס קומט פֿאַר דער אויסבייט פֿון פֿליסיקייטן דורך דער צעלנהייטל, קען מען קלאָר מאַכן דורך א פֿרוב.

מען נעמט פֿערנאמענטפֿאַפיר, וואָס איז אויסגעאַרבעט כמעט פֿון ריינע צעלוליאָזע און מען פֿאַרבינדט מיט איר שטייף א גלעזערנעם צילינדער (א גלאָז פֿון א לאָמפּ). אין צילינדער ניסט מען אָן שאַרפֿע זאלצוואַסער אָדער צוקערוואַסער, פֿונאַויבן פֿאַרמאכט מען אים מיט א גוטן קאָריק, דורך וועלכן מען לאָזט דורך א שמאַלע גלעזערנע רערעלע. דעם צילינדער לאָזט מען אַריין אין א שיסל מיט וואַסער. אין א קורצער צייט אַרום הייבט זיך אויף די פֿליסיקייט אין רערעלע. דאָס וואַסער אין שיסל ווערט אַביסל געזאַלצן אָדער זיסליך. דאָס וואַסער איז אַריין אין צילינדער, דערפֿאַר האָט זי זיך אויפֿגעהויבן אין רערעלע, אָדער די פֿליסיקייט פֿון צילינדער איז אַריין אין שיסל, דערפֿאַר האָט זיך געביטן דער טעם פֿון דעם וואַסער: אין צילינדער איז פֿון שיסל אַריין מער וואַסער, אַיידער פֿון צילינדער אין שיסל. אויב מען זאָל מאַכן פֿאַרקערט: דאָס זאַלצוואַסער אין שיסל און דאָס ריינע וואַסער אין צילינדער, וועט מער פֿליסיקייט אַריינגיין אין שיסל. עס קומען פֿאַר צוויי שמראָמען. שטאַרקער איז דער, וואָס גייט פֿון דעם שיטערן וואַסער צום געדיכטערן. דיזעלביגע דערשיינונג קומט פֿאַר, בעת מיר נעמען א הייטל פֿון א חיה, למשל, די הייטל פֿון א חזירשן אָדער א שעפֿסענעם פענכער. דער-מיט דערקלערט זיך אויך דער אויסבייט פֿון פֿליסיקייטן צווישן די צעלן אין אָרגאַניזם פֿון א חיה. אַטדי דערשיינונג (דער אויסבייט פֿון פֿליסיקייטן דורך הייטעלעך) הייסט אָסמאָס. אַטדאָס וויסנדיג, וועלן מיר פֿאַרשטיין אפֿולע דערשיינונגען אין לעבן פֿון געוויקסן און חיות.

דער בלאַט אין מיקראָסקאָפּ.

אז מען קוקט זיך אַיין אין מיקראָסקאָפּ אויף א בלעטעלע פֿון דער עלאָדע אָדער פֿון מאַך, זעהט מען, אז ער באַשטייט פֿון צעלן. כדי זיך צו באַקענען מיט די גרעבערע ניט דורכזיכטיגע בלעטער פֿון אַנדערע גע-וויקסן, דאַרף מען נעמען א גאַנץ דיגעם קווערשניט. דערמאָלט זעהט מען,


אז דער בלאט באשטייט פֿון עטליכע שיכטן צעלן. דער אויסערליכער שיכט באשטייט פֿון פלאציגע צעלן, וואָס ליגן געדיכט איינע לעבן די אנדערע. אונטער זיי געפינען זיך גרעסערע לענגליכע צעלן מיט אפֿולע כלאַר־פֿיל-קערנער און נאָך טיפֿער ליגן צעלן רונדליכע און אויסגעצויגענע, וואָס ליגן ווייט אָפּגערוקט איינע פֿון די אנדערע. צווישן זיי געפינען זיך לופֿט-קאנאלן.

אין דעם אויסערליכן שיכט, וואָס נעמט זיך אראָפּ פֿון בלאט, ווי א דינע היימעלע, קען מען זעהן אפֿולע פֿאַרן. וואָספֿאַר א באטייט האָבן זיי פֿאַר די פֿלאנצן? יעדע פֿאַרע איז א לענגליכער שפעלמעלע, וואָס איז בא-גרענעצט מיט צוויי האלבקיילעכדיגע צעלן. די שפאלטן קענען ווערן שמעלער און ברייטער. ביי דעם גרעסטן טייל געוויקסן געפינען זיך די שפאלטן פֿונ-אונטן; אראנג דעם ווערן זיי ניט פֿאַרשטאַפּט. נאָר ביי וואסערגעוויקסן מיט שווימענדיגע בלעטער, למשל ביי דער וואסערליליע, געפינען זיך די שפאלטן פֿונאויבן. פֿאַרוואָס איז דאָס אזוי וויכטיג פֿאַר די וואסערגעוויקסן?

דער מיקראַסקאָפּ ווייזט אונז, ווי דער געבוי פֿון בלאט איז צוגעפאסט צו דער וויכטיגער ארבעט, וואָס דער בלאט פֿירט אויס. דער אויסערליכער געדיכטער שיכט צעלן שיצט דעם בלאט, דערהויפּט די כלאַר־פֿילקערנער, וואָס קענען צעשמערט ווערן פֿון א צו שטארקער באשטראלונג און זיינען אזוי גויטיג פֿאַרן געוויקס. די פֿאַרן לאָזן דורך גאון און וואסערדאמף; די קאנאלן, וואָס געפינען זיך צווישן די צעלן פֿון מומלסטן שיכט, זיינען גוטע וועגן פֿאַר גאון, וואָס גייען אריין און טיילן זיך אויס פֿון בלאט.

דער וואַרצל אין מיקראַסקאָפּ.

א וואַרצל פֿון א יונגער תבואה איז אזוי צארט, אז מען קען אים בא-טראכטן אין מיקראַסקאָפּ. ער באשטייט פֿון צעלן. אויפֿן שפיץ האָט ער אזוי ווי א הויב אָדער א פֿינגער, וואָס באשטייט פֿון גרעסערע צעלן מיט פֿעסטע ווענטלעך; די הויב שיצט די איבעריגע קלענערע און צארמערע צעלן; מיטן שפיץ בויערט דער וואַרצל די ערד. אויף יוגן וואַרצל זעהט מען שוין מיט א ניט באוואָפֿנטן אויג קליינע און דינע הערעלעך; גוט קען מען זעהן די הערעלעך אויף געוויקסן, וואָס מען לאָזט דורכוואקסן אויף פֿייכטע לעש-פאפיר; אויפֿן הויב זיינען קיין הערעלעך ניטאָ. אין באָדן שטייט צו די ערד אזוי פֿעסט צו די הערעלעך, אז עס איז שווער זי אָפּצושווענקען אפֿילו מיט וואסער. אין מיקראַסקאָפּ זעהט מען, אז די הערעלעך זיינען נאָר דער אויסגעצויגענער טייל פֿון די וואַרצלצעלן. צו דער גלאטער הייטל פֿון דער צעלע, וואָלט די ערד אזוי ניט צוגעשטאנען, ווי צו די הערעלעך. וואָס מער



וואַרצלען.

פֿון „קרעמעלין, לייטפֿארן פֿ. ד. באַטאנישן אונטערריכט“, פֿארלאַג B. G. Teubner אין לייפציג און בערלין.

און ענגער די וואַרצלען באַרירן זיך מיט דער ערד, אלץ לעבעדיגער קומט פֿאָר דער אויסבייט צווישן דעם אינהאלט פֿון דער צעלע און די זאפֿטן פֿון באַדן. דאָס וואַסער פֿון באַדן גייט אַרײַן אין די צעלן פֿון וואַרצל, און די זאפֿטן פֿון די צעלן גייען אַרויס אין באַדן. דאָ קומט פֿאָר דערזעלביגער אָסמאָס, ווי אין דעם עקספּערימענט מיטן גלעזערנעם צילינדער. אזוי ווי די פֿליסיקייט פֿון צעלע איז געדיכטער, איז דער שטראָם פֿון באַדן אין וואַרצל שטאַרקער, ווי דער שטראָם, וואָס גייט פֿון די צעלן אין באַדן. מען קען זיך גרינג איבערצייגן, אז די וואַרצלעלן לאָזן עפעס אַרויס פֿון זיך. אין אַ וואַזאַנטעפֿל לייגט מען

אוועק א פאָלירטע מאַרמאַרפלאַטע, אויף איר שיט מען אָן פֿייכטע זאמד און מען פֿאַרזייט בעבלעך. אויב מען זאָל שוין אין פֿערצן טעג ארום אַרויסנעמען די פלאַטע און אָפּוואַשן זי, וועלן מיר באַמערקן, אז זי איז אזוי ווי אויסגעגעסן אין די ערטער, וואו די וואַרצלען האָבן זי באַרירט. דאָס האָבן די וואַרצלען אַרויסגעלאָזן פֿון זיך א זויערקייט, וואָס האָט צעלאָזן, צעשטערט דעם מאַרמאַר. אַטדאָס עפֿנט אונז די אויגן אויף א זעהר וויכטיגן פּראָצעס, וואָס קומט פֿאַר פּאַמעליך, אָבער כּסדר אין דער נאַטור. די פֿלאַנצן שאַפֿן זיך פֿון האַרטע מינעראַלישע שטאַפֿן שיטערע, וואָס זיי דאַרפֿן האָבן צו זייער וואַוקס. דער אַלטער גראָבער טייל פֿון וואַרצל האָט ניט קיין הערעלעך, זיינע צעלן זיינען פֿאַרהאַלצט אָדער פֿאַרקאָרט. ער שפּילט שוין דערפֿאַר ניט קיין גרויסע ראָלע אין דער שפּייזונג פֿונם געוויקס. די אַרבעט פֿירן אויס די יונגע און דינע וואַרצלען, דערהויפּט יענע טיילן זייערע, וואָס האָבן הערעלעך.


דער שטאַם אין מיקראַסקאָפּ.

באַקענענדיג זיך נעהענטער מיטן לעבן פֿון די פֿלאַנצן, האָבן מיר זיך דערוואַוסט, אז דער שטאַם איז דער פֿאַרמיטלער צווישן דעם וואַרצל און די בלעטער. ער איז א וועג פֿאַר די זאַפֿטן, וואָס גייען פֿון אונטן אויף אויבן און פֿון אויבן אויף אונטן. די רערן, דורך וועלכע די זאַפֿטן גייען, זיינען זעהר דין. אז מען שניידט דורך אינדערלענג א שטאַם פֿון א גראַזיגן גע-וויקס אָדער א יונגן צווייגעלע פֿון א בויס, באַמערקט מען שוין מיט ניט קיין באַוואַפֿנטן אויג, אז עס ציהען זיך דורך אים אזוי ווי לאַנגע פֿעדיס. בעת מען נעמט א גאַנץ דינעם שניט דורכלענג און מען קוקט זיך איין אין מיקראַסקאָפּ, זעהט מען, אז דער שטאַם באַשטייט פֿון צעלן. די צעלן פֿון אינווייניגסטן טייל זיינען גרעסערע, רונדליכע, די צעלן פֿון דער אויסערליכער הייטל (פֿון דער קאָרע) ליגן געדיכט איינע לעבן די אנדערע און האָבן גראָבע ווענטלעך. דאָס איז דער שוצשיכט. צווישן די צעלן פֿון דעם אינווייניגסטן טייל און דער אויסערליכער הייט ציהען זיך לאַנגע רערן-קאַנאַלן. די קאַנאַלן, וואָס זיינען נעהענטער צום אינווייניגסטן טייל, זיינען גרעסער און האָבן גרעבערע ווענטלעך, ווי די, וואָס געפינען זיך נעהענטער צו דער אויסערליכער הייטל, צו דער קאָרע. די אינווייניגסטע קאַנאַלן זיינען די האַלצקאַנאַלן, דורך זיי גייען די זאַפֿטן פֿון וואַרצל צו די בלעטער. די קלענערע רערן, וואָס געפינען זיך נעהענטער צו דער קאָרע זיינען די לובקאַנאַלן. דורך זיי גייען די זאַפֿטן פֿון די בלעטער אויף אונטן.

אין א קווערשניט זעהען די קאַנאַלן אויס ווי רונדע לעכעלעך צווישן די איבעריגע צעלן פֿון שטאַם. זיי ליגן געדיכט איינע לעבן די אנדערע. דער-

פֿאַר זאָגט מען, אז אין שטאם זיינען דא בינמלעך געפֿעסן, אָדער געפֿעס־
 בינמלעך. פֿאַרן באַטראַכטן אין מיקראַסקאָפּ, קוקט זיך איין אויף א קווער־
 שניט מיט ניט באַוואַפֿנטע אויגן. ביי דעם גרעסטן טייל גראַזיגע געוויקסן,
 וועט איר דערזעהן אינמיטן ווייסע אָדער גאָר העלגרינע גרונטגעוועב, און
 ארום דעם גרונטגעוועב א גרינעם רעדעלע און אין אים העלע פֿונקטן. אין
 מיקראַסקאָפּ זעהט מען דייטליך, אז יעדער פינטעלע איז א גאנצע גרופע
 לעכעלעך, גרעסערע צום מיטן און קלענערע צו דער אויסערליכער זייט. דאָס
 זיינען די לעכעלעך פֿון די איבערגעשניטענע רערן, פֿון די געפֿעסבינמלעך.

אויפֿן קווערשניט פֿון א האַלציגן געוויקס, פֿון א בוים, זעהען זיך רינגען
 אין שטאם. אויב עס זאָל זיך איינגעבן צו מאַכן א גאנץ דינעם שניט און
 מען זאָל זיך אויף אים איינקוקן אין מיקראַסקאָפּ, וועלן מיר זעהן, אז די
 רינגען באַשטייען פֿון די לעכעלעך פֿון די רערן. אין גראַזיגן געוויקס זיינען
 נאָך די געפֿעסבינמלעך געווען אָפֿגעטיילט איינע פֿון די אנדערע, און דאָ
 איז דאָ אויפֿפֿיל רערן, אז פֿון זיי שאַפֿט זיך שוין א פֿאַרמאכטער רינג ארום
 דעם גרונטגעוועב (דאָס האַרץ פֿון בוים), און אזוינע רינגען געפֿינען זיך אין
 שטאם אפֿולע, איטליכן יאָר קומט צו א נייער רינג. בעת מיר קוקן זיך איין
 אויפֿמערקזאם, באַמערקן מיר אויך, אז דער רינג לעכעלעך, וואָס געפֿינט זיך
 נעהענטער צו דער קאָרע, באַשטייט פֿון שמעלערע רערן מיט דינערע ווענטלעך.
 דאָס זיינען די לוב, אָדער די באַסטרערן. און אזוי באַקומט זיך אין מיקראַס־
 קאָפּ אזא בילד: אינמיטן דאָס האַרץ אָדער דער גרונטגעוועב פֿון גרויסע
 צעלן מיט דינע ווענטלעך, ארום און ארום רינגען, לעכעלעך פֿון רערן, איין
 רינג ארום דעם אנדערן, איין רינג אלץ גרעסער פֿון דעם אנדערן. די לעכעלעך
 ווייזן אונז, אז די רערן האָבן גראַבע און שטייפֿע ווענטלעך, דאָס זיינען



קווערשניט פֿון א זאָג

די האַלצערן. די רינגען, וואָס געפֿינגען זיך געהענטער צו דער קאַרע באַ-
שטייען פֿון קלענערע לעכעלעך, דאָס זיינען די לוברערן. אזוי אונטערשיידן
מיר דייטליך אין מיקראַסקאָפֿ די האַלצערן פֿון די לוברערן לויט דער גרויס
און לויט דער גרעב פֿון די רערן. אז איר וועט זיך גוט איינגעוואוינען צום
מיקראַסקאָפֿ, וועט איר באַמערקן, אז צווישן די האַלצערן און די לובצערן
געפינט זיך אַ זעהר דייטליכע גרעניץ: דאָס איז אַ באַזונדער רינג, וואָס
באשטייט פֿון צארטע פֿירקאנטיגע צעלן, אַנגעפֿילמע מיט שטאַפֿן. דער רינג
רופֿט זיך אָן דער קאַמביומרינג, ער האָט זעהר אַ גרויסן באשטייט. זיינע
צעלן טיילן זיך, אַדאנק דעם קומען צו נייע רינגען, און דער בוים ווערט
גרעסער. פֿון די קאַמביומצעלן אנטוויקלען זיך די רערן. די רערן ציהען זיך
פֿון וואָרצל און צעצווייגן זיך אין די בלעטער.
דער שטאַם פֿון מאַך און פֿון וואַסער-וואַקס האָט ניט קיין געפֿעס. דער
מיקראַסקאָפֿ באַווייזט, אז זיי באשטייען נאָר פֿון צעלן, וואָס נעמען אַריין און
גיבן אַיבער אַינע די אַנדערע פֿליסיקייטן.

אַן אלגעמיינער אַיבערבליק אַיבער דער נאַטור אַרום אונז.

מיר האָבן זיך באַקענט מיט אפֿולע חיות און פֿלאַנצן און האָבן אַרויס-
געפֿונען, אז פֿלאַנצן און חיות האָבן אַסך ענליכקייטן צווישן זיך, ווי פֿאַר-
שיידן זיי זאָלן ניט אויסווייזן פֿון ערשטן קוק. דאָס איז איין גרויסע וועלט
פֿון לעבעדיגע באשעפֿענישן אָדער אָרגאַניזמען, וואָס ווערן געבאַרן, נעמען
אַריין אין זיך פֿאַרשיידענע שטאַפֿן, אַרבעטן זיי אַיבער, פֿאַרמערן זיך און
שטאַרבן. די ענליכקייט איז זעהר דייטליך ביי די קלענסטע און איינפֿאַכסטע
אָרגאַניזמען, וואָס באשטייען פֿון איין צעלע: ביי דער באַקטעריע און דער
אַינפֿאָזאָריע. ביי די גרעסערע אָרגאַניזמען באשטייט שוין דער גוף פֿון אפֿולע
צעלן, וואָס שאפֿן פֿאַרשיידענע געוועבן, און די ענליכקייט איז אלץ שווערער
צו באַנעמען מיט איין קוק. פֿאַרהאָנגען אין דער נאַטור שוואַך אנטוויקלטע און
שטאַרק אנטוויקלטע אָרגאַניזמען. אזוי איז, למשל, דער רעגנוואַרעם מער
אנטוויקלט פֿאַר דער אינפֿאָזאָריע, די שנעק מער פֿאַר דעם רעגנוואַרעם, און
אזוי ווייטער; דער פֿלינגשוועמל איז מער אנטוויקלט פֿאַר דער באַקטעריע,
מאָך מער פֿאַר יעדער שוועמל, פּאַפּערעט מער פֿאַר מאַך און אזוי ווייטער;
אנטוויקלטער זיינען די אָרגאַניזמען, וואָס זיינען גרעסער, האָבן מער טיילן
אָדער אָרגאַנען, פֿירן אויס אַ גרעסערע און שווערערע אַרבעט. אזוי למשל,
פֿאַרמערט זיך די באַקטעריע, טיילנדיג זיך אויף צוויי חלקים. ביי דעם פּאַפּערעט
שאפֿן זיך פֿריהער ספּאָרן, פֿון די ספּאָרן ווערט דער פֿאַרשפּראַצער, און פֿון
אים אנטוויקלט זיך שוין אַ יונגער פּאַפּערעט; אָדער לאַמיר פֿאַרנלייכן, ווי

עם שפייזט זיך די אינפֿוואַריע און ווי עס שפייזט זיך א מילכוויגנע חיה. די אינפֿוואַריע נעמט אריין פֿארטיגע שפייז מיט אלע טיילן פֿון איר גוף, די חיה נעמט אריין אין זיך שפייז און ארבעט עס איבער אין פֿארשיידענע אָרגאנען פֿון איר גוף.

די נאטורפֿאָרשער צעטיילן אלע פֿלאנצן און חיות אין גרופעס, אָפטיילונגען, קלאסן און פֿאמיליעס לויט זייער אנטוויקלונג און ענליכקייט.

א פֿולן בילד פֿון אלע חיות און פֿלאנצן קען מען באקומען, אז מען באקענט זיך מיט דער נאטור פֿון דער גאנצער ערד. אָבער אפֿילו אין דער נאטור ארום אונז האָבן מיר געפֿונען פֿארטרעטער פֿון אפֿולע גרופעס, אָפֿטיילונגען און קלאסן; די פֿלאנצן ארום אונז קען מען איינטיילן אין צוויי גרויסע אָפטיילונגען: I אָפטיילונג — זאָמיגע אָדער בלומיגע פֿלאנצן; II אָפֿטיילונג — ניטבלומיגע אָדער ספֿאַרנפֿלאנצן.

די I אָפטיילונג טיילט זיך אויף צוויי קלאסן: 1-טער קלאס — פֿלאנצן מיט באדעקטע זאָטקנאָספֿן, און 2-טער קלאס — פֿלאנצן מיט ניט קיין באדעקטע זאָטקנאָספֿן. ניט קיין באדעקטע זאָטקנאָספֿן האָבן אלע גאָדלבויםער; באדעקטע זאָטקנאָספֿן האָבן אלע בלומיגע בלעטערנעוויקסן. יעדער קלאס טיילט זיך נאָך אין פֿאמיליעס. דערמאָנט זיך וועגן די פֿאמיליעס: רויזנבלומיגע (אן עפֿלבוים און אנד.); שמעטערלינגבלומיגע (ארבעס); ליפֿנ־בלומיגע (קאלטע קראַפֿיווע); קאָרבֿלומיגע (די קאָרנבלום) און נאָך פֿיל אנדערע פֿאמיליעס. פֿון דער II-טער פֿלאנצנאָפטיילונג, פֿון די ספֿאַרנ־פֿלאנצן, האָבן מיר זיך באקענט מיט די גרופעס: 1) פּאפּערעט, 2) מאָך; 3) שוועמלעך און מיט די קלענסטע פֿון די שוועמלעך, מיט די באקטעריעס. די חיות ארום אונז קען מען איינטיילן אין אזויגע טיפֿן: I רוקנזייליגע; II גלידערפֿיסניגע; III ווייכגופֿיגע; IV ווערים; V אורחיות אָדער אינפֿוואַריעס.

דער I-טער טיפֿ, די רוקנזייליגע טיילן זיך אין קלאסן: 1. מילכוויגער; 2. פֿויגל; 3. קריכניגע אָדער רעפֿטיליען (שרצים); 4. וואסערערדיגע אָדער אנפֿיביעס; 5. פֿיש.

פֿונדאמענטלעך נעמט זיך דער גאָמער פֿון אימליכן טיפֿ? רופֿט אן פֿאָרשטייער פֿון יעדן קלאס און רעכנט אויס זייערע באזונדערע אייגנשאַפֿטן.

פֿון דעם II-טן טיפֿ, פֿון די גלידערפֿיסניגע, האָבן מיר זיך באקענט מיט 1) אינסעקטן; 2) שפּיגען; 3) ראקעס אָדער קרעבסן.

פֿונדאמענטלעך נעמט זיך דער נאמען „גלידערפֿיסניגע“ און מיט וואָס צייכנט זיך אויס דער גאנצער טיפֿ; וואָס ווייסט איר וועגן די פֿאָרשטייער פֿון יעדן קלאס? וועלכע פֿאָרשטייער זיינען אייך באוואוסט פֿון די איבעריגע טיפֿן?

דער מענש.

דער מענשליכער גוף און זיינע אָרגאנען.

דער מענש איז א טייל פֿון דער נאטור. נאָכן בוי פֿון זיין גוף און נאָך דער גרויסער ארבעט, וואָס קומט פֿאַר אָהן אן אויפֿהער אין אַטדעם גיף, געהערט ער צו די אנטוויקלטסטע באשעפֿענישן; צו די רוקנזויליגע. געהענטער ווי אלע חיות זיינען אים די מילכוויגע. דער מענשליכער גוף באשטייט פֿון אפֿולע טיילן, וואָס מען רופֿט זיי אָרגאנען. יעדער אָרגאן פֿירט אויס א באזונדערע ארבעט. די ארבעט פֿון איינעם איז ענג פֿאַרבונדן מיט דער ארבעט פֿון אלע איבעריגע. אויב עס ווערט געשטערט די ארבעט פֿון איין אָרגאן, קען ווערן געשטערט אויך די ארבעט פֿון אלע איבעריגע, און בעת עס שטעלט זיך אָפֿ דאָס לעבן פֿון איין אָרגאן קען זיך אָפֿשטעלן דאָס לעבן פֿון גאנצן אָרגאניזם. לאָמיר זיך פֿריהער באקענען מיט דער ארבעט פֿון איטליכן אָרגאן באזונדער און דערנאָך וועלן מיר זעהן, ווי זיי ארבעטן אלע צוזאמען. כדי אָבער צו באנעמען די ארבעט פֿון אן אָרגאן דארף מען בעסער וויסן, ווי ער איז געבויט.


דער סקעלעט.

די טיילן פֿון סקעלעט.

פֿונאויבן איז דער מענשליכער גוף באצויגן מיט א גלאטער הויט, אונטער איר געפֿינט זיך ווייכע פֿלייש (מוסקולן); אונטער די מוסקולן געפֿינען זיך הארטע ביינער אָדער דער סקעלעט. דער סקעלעט איז דער געשטעל פֿון מענשליכן גוף, ער גיט צו דעם גוף א באשטימטע פֿאָרמע, מאכט אים האפֿטיג, אויף אים האלטן זיך אלע אָרגאנען. דער סקעלעט באשטייט פֿון אפֿולע ביינער, וואָס זיינען דייטליך אָפֿ־געטיילט איינער פֿון דעם אנדערן. די וויכטיגסטע זיינען די ביינער פֿון קאָפֿ, אָדער דער שארבן. דער רוקנזויל מיט די ביינער פֿון ברוסטקאסטן, די ביינער פֿון די הענט און פֿון די פֿיס.

ווי זיינען געבויט די ביינער און פֿון וואָס באשטייען זיי?

דער סקעלעט באשטייט פֿון פלאציגע און רעריגע ביינער. פֿונאויבן זיינען אלע ביינער באצויגן מיט א הארטער און גלאטער בינהויט; אינ־ווייניג זיינען זיי ניט מאסיוו, נאָר אזוי ווי געלעכערט, שוואַמיג. די רעריגע ביינער זיינען אָנגעפֿילט מיט א לייכטער און ווייכער מאסע, דאָס איז די



דער סקעלעט.

פֿון „פראַג. דאנשטיג, נאטורלעכע וויסנשאַפֿט דעם טיררייכעם“, פֿאַל־אָ: F. F. Schreiber אין מינען און עסלינגען.

ביינערמאָרד. אין ביינהויט געפֿינען זיך אפֿולע קליינע לעכעלעך, וואָס דורך זיי גייען אַרײַן אין די ביינער די דינסטע בלוטאָדערן. שפעטער, אז מיר וועלן זיך געהענטער באקענען מיט דער בלוט, וועלן מיר זעהן, וואָס פֿאַר אַ גרויסן באטייט דאָס האָט פֿאַרן לעבן פֿון אָרגאַניזם.

פֿאַרדערצײט פֿון זײַן לעבן ענדערט זיך ביים מענשן אײַנגע מאָל דער שטאַף פֿון זײַנע ביינער. בײַ אַ קינד זײַנען די ביינער ווײַך און בײַגעוודיג, שפעטער ווערן זײ אַלץ האַרטער. בײַ אַלטע לײַט פֿאַרלירן זײ כמעט אײַנגאַנצן זײער בײַגעוודיקײַט, זײ ווערן האַרט און ברעכיג. די ווײַכע בײַגעוודיגע מאַסע, וואָס פֿון איר באַשטייען די ביינער אין דער ערשטער צײַט פֿון מענשנס לעבן, הײסט „כראָמסקע“. (סײַז אײַך געוויס אױסגעקומען צו זעהן כראָמסקע פֿון בהמות און עופֿות. אָפֿטמאָל געפֿינט זיך כראָמסקע אױך אױף די ענדן פֿון האַרטע ביינער.) שפעטער ענדערט זיך די כראָמסקע, עס קלײַבן זיך אין איר צוואמען האַרטע מינעראלישע שטאַפֿן, דערהויפֿט קאַלץ, פֿאַראײַנגיט מיט פֿאַספֿאָר, און פֿאַרשײדענע זאַלצן; וואָס עלטער דער מענש ווערט, אַלץ מער ווערן פֿאַרקאַלט זײַנע ביינער. אין דער שפּײַז, וואָס דער מענש עסט, און דערהויפֿט אײַנס וואַסער, וואָס ער טרינקט, געפֿינען זיך פֿאַרשײדענע מינעראלישע שטאַפֿן און זאַלצן. זײ לײַגן זיך דאָס אָפֿ אין די ביינער. אין מאַנכע טײלן פֿון

אונזער מקעלעט ווערט די כראַמסקע דאָס גאַנצע לעבן ניט פֿאַרביינערט.
אזוי, למשל, לאָזט זיך פֿילן כראַמסקע (קנאַרפל) אין אונזער אויערמושל
און אין נאָז.

ביי קליינע קינדער ברעכן זיך זעלטן די ביינער פֿון א פֿאל אָדער א
קלאַפּ, ווייל די כראַמסקע איז ווייך און ניט ברעכיג; דערפֿאַר אָבער געפֿינט
זיך א קינד אין אן אנדער סכנה: די ווייכע ביינער קרימען זיך גרינג און
קענען בלייבן קרום אויפֿן גאַנצן לעבן; דערפֿאַר מוז מען זיך פֿאַרויכטיג
באגייזן מיט קליינע קינדער, בעת מען נעמט זיי אויף דער האַנט. גרעסערע
קינדער דארפֿן זיך האַלטן גלייך, ניט זיצן צופֿיל איינגעבויגן, ווייל דערפֿון
קענען זיי אויסוואַקסן מיט א קרומען רוקן.

ביי אלטע לייט, פֿאַרקערט, ברעכן זיך גרינג זייערע האַרמע ביינער פֿון
א פֿאל אָדער א קלאַפּ, דערפֿאַר מוז מען זיי שטאַרק היטן פֿון אזא צופֿאל.

ווי זיינען צווישן זיך פֿאַראייניגט די ביינער פֿון סקעלעט?

א טייל פֿון אונזערע ביינער זיינען פֿאַראייניגט צווישן זיך אויף אזא
אופֿן, אז זיי קענען זיך ניט באוועגן איינער לעבן דעם אנדערן. דער גרעסטער
טייל אָבער איז פֿאַראייניגט באוועגליך, און אדאנק דעם קען דער מענטש
אויספֿירן זעהר פֿאַרשיידענע און פֿלינקע באוועגונגען.

די באוועגליכע ביינער זיינען ניט צוגעוואַקסן, נייערט צוגעשמעלט איינער
צום אנדערן. די ערטער, וואו די ביינער זיינען אַט אזוי פֿאַראייניגט, זעהען זיך
אפֿילו דורכן הויט. דאָס זיינען די געלענקען. אזא געלענק געפֿינט זיך
אין פֿלייצע, אין איילנבויגן, אין די פֿינגער, אין קני א. א. וו.

אז מיר באַקענען זיך אויפֿן סקעלעט מיט איינעם פֿון די געלענקען,
זעהען מיר אין איין ביין א גריבל, אין דעם אנדערן — א קעפל. דער
קעפל שטעלט זיך אריין אין גריבל, און אזוי קען זיך איין ביין דרייען לעבן
אנדערן. די גריבל איז אויסגעבעט, און דער קעפל איז באַדעקט מיט גלאַטע
כראַמסקע, זיי זאָלן זיך ניט רייבן; די כראַמסקע איז נאָך דערצו באַנעצט
מיט א באַזונדערער פֿליסיקייט. (דערמאָנט זיך, אז מען שמירט אויס א שלאָס
אָדער א זאוועסע פֿון א טיר. צו וואָס טוט מען דאָס?) אָבער וויאזוי האַלט
זיך איין ביין לעבן אנדערן?

די ביינהויט פֿון ביידע ביינער איז אויסגעצויגן אין לאַנגע שטאַרקע
און ציהענדיגע בענדער, וואָס כאַפֿן ארום דאָס אָרט פֿון דער פֿאַראייניגונג
און וואַקסן זיך צונויף מיט דער ביינהויט פֿון צווייטן ביין. אזוי שאַפֿט

זיך א געלענק בייטל אָדער א געלענקקאפּסל, וואָס בינדט צונויף יד ביינער, אָבער לאָזט זיי פֿריי באַוועגן זיך.


אמאָל טרעפֿט זיך, אז פֿון א קלאַפּ אָדער פֿון א ניט פֿאָרויכטיגער באַוועגונג גייט דער ביין ארויס פֿון זיין אָרט און שמעלט זיך אליין ווידער אריין. מיר פֿילן דערביי א שטארקן ווייטאַג, ווייל די בעגדער באַקומען א שטארקן שטויס, און עס צערייסן זיך דיגע בלוטאָדערן. דער בעסטער מיטל איז ניט באַוועגן דעם קראַנקן איבר און צולייגן קאַלטע וואַסער.

ערנסטער איז די געפֿאר, בעת מען לינקט זיך אויס אן איבר; דער ביין גייט ארויס פֿון זיין אָרט און שמעלט זיך אליין צוריק ניט אריין. דאן דארף מען אויך צולייגן קאַלטע וואַסער און זיך ווענדן וואָס גיכער צו א דאַקטער, וואָס וועט דעם ביין צוריק אַריינשמעלן.

זעהר שטאַרק איז דער ווייטאַג, בעת א ביין צעברעכט זיך. די צע-בראַכענע טיילן וואַקסן זיך ווידער צוזאַמען. דער צעבראַכענער איבר מוז אָבער א לאַנגע צייט ליגן אין פֿולער רוה און זיך ניט בעוועגן.

דער שאַרבן.

דער סקעלעט פֿון קאָפּ באַשטייט פֿון אפּולע ביינער. נאָר איין ביין,



דער שאַרבן.

דער אונטערשטער מוילבין, קען זיך באַוועגן. די איבעריגע זיינען פֿאַר-אייניגט אומבאַוועגליך; אויפֿן שאַרבן זעהט מען צווישן די איינציגע ביינער אזוי ווי געט. די ביינער זיינען ביי די ברענעס געציינדלט, יעדער ציינדל איז אַריינגעשמעלט צווישן צוויי ציינדלעך פֿון דעם אנדערן. דאָס איז זעהר א פֿעסטער צונויפֿשמעל; פֿון אלע ביינער איז צוזאַמענגעשמעלט א גוט פֿאַר מאַכטער קיילעכדיגער קאַסטן, וואָס אין אים ליגט דער צאַרטער קאָפּמאַרך.


די וויכטיגסטע ביינער פֿון קאָפּ זיינען דער שמערנבין, די צוויי שיימל-ביינער, די שלייפֿנביינער, דער הינטער-ביין (די פֿאַטעלניצע) מיט א קיילעכדיגער לאַך און צוויי בערגליגע אָפּוואַקסן פֿונאַונטן, דער גרונטבין. פֿונפֿאַרנט

פֿון פֿראַנק. האַנטיין, נאַטורגעשיכטע דעם טורריכס, פֿאַרלאַג F. F. Schreiber אין מינכען און עסלינגען.

(אין פנים) — די באקנבײנער, די נאזבײנער און די מוילבײנער, מיט די גריבעלעך, וואָס אין זיי זײנען אריינגעשטעלט די צײנער. דורך דער קײלעכדיגער לעכל אין הינטערבײן פֿאַראײניגט זיך דער קאָפּמאַרק מיט דעם רוקנמאַרד. מיט די צוויי אפּוואקסן שטעלט זיך דער הינטערבײן אריין אין רוקנזײל. אַדאנק דעם געלענק, קען זיך דער קאָפּ באוועגן. בײ קלײנע קינדער זײנען נאָך צווישן די בײנער פֿין קאָפּ קײן נעט נײאָ. אײן בײן איז אָפּגעשײלט פֿון דעם אנדערן מיט א וויכער מאסע (בראָמסקע). דערפֿאַר קען זיך דער מארד אנטוויקלען און גרעסער ווערן; בעת דער מארד פֿאַרענדיגט זײן אנטוויקלונג, ווערט דער גאַנצער שארבן פֿאַרביינערט. דערפֿאַר מוז מען זײן זעהר פֿאַרויכטיג מיט קלײנע קינדער, מען זאָל נײט געבן א צו שטאַרקן דרוק אָדער טרײסל דעם מארד.

דער רוקנזײל.

דער סקעלעט פֿון קאָפּ איז צוזאַמענגעגלידערט מיטן רוקנזײל (חוט־השררה). דער רוקנזײל האלט אײן אונזער גוף אין דער ווערטיקאלער לאגע. אויף אים שטיצן זיך די וויכטיגסטע אָרגאַנען. ער איז באוועגליך, ווייל ער באשטייט נײט פֿון אײן שטיק, נײערט פֿון דרייאונדרייסיג אײנציגע בײנדלעך, (ווארבֿלען). צווישן די אײנצלע בײנדלעך געפֿינען זיך בלעטעלעך כראָמסקע (קנאַרפל). דערפֿאַר איז דער גאַנצער רוקנזײל בײגעוודיג און באוועגליך. נײט אלע ווארבֿלען זײנען גלייך. די אויבערשטע זײנען קלענער, די אונטערשטע גרעסער, ווייל אויף זיי האלטן זיך די איבעריגע. דער רוקנזײל איז געקרימט, אין האלז (די האלזווארבֿלען) איז ער אריינגעבויגן, אין רוקן (די ברוסט־ווארבֿלען) — אויסגעבויגן, אין גארטל ווידער אריינגעבויגן, אין קרײז ווידער אויסגעבויגן. יעדער רוקנבײנדל אָדער ווארבֿל באשטייט פֿון א מאסיוון טײל,



אײנצלע ווארבֿלען.

פֿון „פראַם־דאנשטיין. נאַטורגעשיכטע דעם מיררייכס“, פֿאַרלאַג F. F. Schreiber אין מינֿען און עסלײנקען.

פֿון קערפער און פֿון א רינג מיט איין הינטערשטן און צוויי זייטיגע אָפּ וואוקסן. אָדער שפיצן. די רינגען זיינען אויפֿגעלייגט איינע אויף די אנדערע, און אויף אזא אופן שאפט זיך א קאנאל פֿאר דעם רוקנמארך. דורכן לאָך פֿון הינטערביין פֿאראייניגן זיך ביידע מארכן, דער קאָפּמארך און דער רוקנ-מארך. דער ביינערנער קאנאל איז א זיכערער אָרט פֿאר דעם מאַרך.

דער ברוסטקאסטן.

דער ברוסטקאסטן שמעלט זיך צונויף פֿון די ריפּן, וואָס זיינען פֿונהינטן צוגעגלידערט צו די ביינדלעך פֿון רוקנזייל (צום ברוסטזייל) און פֿונפֿאָרנט פֿאראייניגט מיטן ברוסטביין דורך כראָמסקע. אינגאנצן האָט דער מענש צוועלף פֿאַר ריפּן. דאָס זיינען שמאַלע און פלאציגע ביינער, וואָס זעהען אויס ווי האלבע רייפֿן. די אונטערשמע צוויי פֿאַר זיינען ניט פֿאַרבונדן מיטן ברוסטביין און הענגען אראָפּ פֿריי. ביי דארע מענשן זעהען זיך דייט-ליך די ריפּן אונטער דער הויט. ס'איז אויך קענטיג, ווי זיי באוועגן זיך, בעת דער מענש עטעמט: זיי הייבן זיך און לאָזן זיך אראָפּ.

אין ברוסטקאסטן ליגט די ברוסטזייל מיט אוינע וויכטיגע אָרגאנען, ווי די לונגען און דאָס האַרץ. דאָ זעהען מיר ווידער, אז די ביינער זיינען א שוין פֿאַר אונזערע וויכטיגסטע אָרגאנען.

די ברוסטזייל טיילט זיך אָפּ מיט א ווענטל פֿון דער בויכהייל, וואו עס ליגן דער מאָגן, די געדערס און נאָך אנדערע אָרגאנען. די בויכהייל איז געשיצט פֿון סקעלעט גאָר פֿונהינטן (דער רוקנזייל) און טיילווייז פֿונאונטן (די ביינער פֿון שיסלגארטל).

די ביינער פֿון די הענט.

די הענט זיינען די באוועגליכסטע גלידער, דערפֿאַר באשטייען זיי אויך פֿון אפֿולע ביינער און האָבן אפֿולע געלענקען. די וויכטיגסטע טיילן זיינען דער אויבעראַרעם, דער אונטעראַרעם און די האנטלעפֿל מיט די פֿינגער. די הענט זיינען פֿאראייניגט מיטן גוף דורכן פלייצעגארטל, וואָס באשטייט פֿון די פלאציגע, דרייקאנטיגע לאָפעטקעס פֿונהינטן און די דינע אויסגע-בויגענע שליסלביינער פֿונפֿאָרנט. דער גארטל שמעלט אָפּ די הענט פֿון די ריפּן, דערפֿאַר קענען זיי זיך פֿריי באוועגן, זיך ניט רייבנדיג אָן גוף. די האנט שמעלט זיך אריין מיט א קעפל אין דער פֿלאכער גריבל פֿון דער לאָפעטקע, דערפֿאַר קען זיך די האַנט פֿריי דרייען.

דער אונטערארעם באשטייט פֿון צוויי ביינער (דער שטראל און די אייל), זיי זיינען אזוי צוזאמענגעגלידערט מיט דעם אויבערשטן ביין פֿון דער האנט, אז די האנט קען זיך אויסציהען און צוגויפֿלייגן. די האנטלעפֿל באשטייט פֿון אפֿולע ביינער, פֿון זיי איז באוועגליך נאָר דער, וואָס אויף אים האלט זיך דער גרויסער פֿינגער. די פֿינגער זיינען זעהר באוועגליך אדאנק דעם, וואָס זיי באשטייען פֿין דריי טיילן, נאָר דער גרויסער פֿינגער האט צוויי טיילן (געלענקען).

דער סקעלעט פֿון די פֿיס.

די ביינער פֿון די פֿיס פֿאראייניגן זיך מיטן רוקנזייל דורך גרויסע ביינער, וואָס צוליב זייער פֿאָרמע רופֿט מען זיי שיסלביינער. פֿון זיי שאַפט זיך דאָס דער שיסלגארטל. אויף זיי שפארן זיך אָן די אָרגאנען, וואָס געפֿינען זיך אין בויכהייל.


אין איטליכן שיסלביין געפֿינט זיך א טיפֿע גריבל, וואָס אין איר איז אריינגעשמועלט דער קעפל פֿון אויבערפֿוס (פֿאָלקע); צוליב אזא געלענק קען זיך דער פֿוס פֿריי באוועגן. דער פֿוס באשטייט אויך פֿון דריי טיילן: דער אויבערפֿוס (פֿאָלקע), די אונטערפֿוס, וואָס באשטייט פֿון גרויסן און קליינעם שינביין, און די טריט. די ביינער פֿון די פֿיס זיינען לאנגע שטארקא רערן, ווייל אויף זיי האלט זיך דער גאנצער גוף. די טריט באשטייט פֿון אפֿולע ביינער; די טריט און אירע קורצע פֿינגער זיינען ניט אזוי באוועגליך, ווי די האנטלעפֿל. דער מענש שפארט זיך אָן אויף דער ערד מיט די פֿינגער און מיט דער פֿיאטע. אינמיטן איז די טריט אויסגעבויגן; אדאנק דעם איז דעם מענשנס גאנג לייכט און זיכער. קוקט זיך איין, ווי עס גייט א קאץ, א הונט, זיי שפארן זיך אָן נאָר מיט די שפיצפֿינגער, אָבער דערפֿאר שטיצט זיך זייער גוף אויף פֿיר פֿיס. ביי א מענשן מוזן צוויי פֿיס אויסהאלטן די גאנצע משא פֿון דעם גוף. און דערפֿאר מוז יעדער פֿוס האָבן צוויי שטיצפונקטן.

פֿארוואָס איז שווער צו גיין אין שיד מיט הויכע און שמאָלע קנאפֿל? מיט וואָס שפארט זיך דאן אָן דער פֿוס צו דער ערד?

די מוסקולן.

פֿון וואָס באשטייען די מוסקולן?

אונטערן הויט פֿילט זיך אָן מיט פֿלייש. ביי אן אָפֿגעשונדענער הון קען מען זעהן, אז די פֿלייש באשטייט ניט פֿון איין שטיק, נאָר פֿון בא-



מוסקולאטור פֿונם מענשליכן קערפער.

פֿון „פראם. האנשטיין, נאטורגעשיכטע דעם מיררייכס“,
פֿלג. F. F. Schreiber אין מינכען און עסלינגען.

זונדערע דיימליך אָפגעזונדערטע
טיילן, וואָס הייסן מוסקולן. דאָס
גלייכן ביי אלע מילכזוויגער און
ביים מענשן אויך. אין מענשליכן
גוף זיינען דאָ זעהר פיל מוסקולן,
קליינע און גרויסע, ברייטע און
שמאַלע, ווי פאסן. יעדער מוסקול
איז באצויגן מיט א דינער דורכ-
זיכטיגער הייטל. איר קענט דאָס
גוט באמערקן אויף רויהע פֿלייש.
אז מען קאָכט פֿלייש, צעגייט די
הייטל און דער מוסקול צעטיילט
זיך אויף לאנגע שמאַלע פֿעדים.
אזוי איז יעדער מוסקול א בינטל
לאנגע פֿעדים. די מוסקולפֿעדים
זיינען עלאסטיש ד. ה. זיי זיינען
פֿעהיג זיך אויסצוציהען און זיך
ווידער צונויפֿצוציהען. אראנק
דעם איז אויך דער גאנצער
מוסקול עלאסטיש. די עלאסטישע
מוסקולן באוועגן אונזערע ביינער.

ווי אזוי די מוסקולן
באוועגן די ביינער?

כדי דאָס צו פֿארשטיין, דארף
מען פֿריהער זעהן, ווי די מוסקולן
זיינען צוגעוואקסן צו די ביינער.
די מוסקולשמאָף איז ווייך און
זאפֿטיג, ווייל זי האָט אין זיך
פיל בלוטאָדערן. ביי די ברעגעס
אָבער זיינען די מוסקולן אויס-
געצויגן אין הארטע און שטייפֿע
מוסקולבענדער (קאָשקע). יעדער
מוסקולבאנד איז צוזאמענגעוואקסן
מיטן ביינהויט פֿון דעם ביין,


וואָס מיט אים איז דער מוסקול פֿאַראייניגט. לאָמיר ווי א משל נעמען דעם מוסקול, וואָס געפֿינט זיך אויף דער אינווייניגסטער זייט פֿון דעם אויבערפֿאַרעם. מיט צוויי בענדער איז ער צוגעוואקסן צו דעם פֿלייצעגארטל, מיט נאָך א באנד (דעם אונטערשטן), איז ער צוגעוואקסן צום ביין פֿון דעם אונטערפֿאַרעם. בעת דער מוסקול ציהט זיך צונויף, ציהט ער מיט דער אונטערפֿאַרעם, און ער בויגט זיך איין; בעת דער מוסקול ציהט זיך אויס, לאָזט זיך דער אונטערפֿאַרעם אראָפֿ. דויעלביגע דערשיינונג וועלן מיר באמערקן אויף די מוסקולן פֿון די פֿיס און אין אלע באוועגליכע טיילן פֿון אונזער גוף. די מוסקולן פֿאַרקירצן זיך און ציהען זיך ווידער אויס. אָט אזוי טוען זיי א גרויסע ארבעט: זיי באוועגן אונזערע אָרגאנען. דאָס הארץ, דער מאָגן, און נאָך אנדערע וויכטיגע טיילן פֿון אונזער גוף זיינען אויפֿגעבויט פֿון מוסקולשטאָף. די מוסקולן אנט- וויקלען זיך פֿון דער ארבעט. גוט אנטוויקלט זיינען די מוסקולן ביי ערד- ארבעטער, ביי זענער, שמידן און אנדערע האנטארבעטער. אָהן ארבעט און באוועגונג ווערן די מוסקולן שוואַך. אויב די ארבעט, וואָס מיר טוען, איז א זיצגע, מוזן מיר זעהן צו ארבעטן מיט אונזערע מוסקולן דורך באזונדערע באוועגונגען אויף דער פֿרייער לופֿט: מאכן גימנאסטיק, שווימען, גיין אפֿולע שפאצירן. צופֿיל ארבעט שוואַכט אויך אָפֿ די מוסקולן.

ווי גייט די ארבעט אין מענשליכן גוף?

דער מענשליכער קערפֿער איז אזוי ווי א מאשין, וואָס געפֿינט זיך תמיד אין דער ארבעט. יעדע מאשין ווערט געטריבן פֿון א כוח. ווארעמקייט איז א גרויסער כוח, וואָס טרייבט אפֿולע מאשינעס. כל זמן א מענש לעבט, איז זיין גוף ווארעם, סיי ווינטער, סיי זומער. איר ווייסט געוויס, אז די ווארעמקייט קען מען אויסמעסטן מיט א טערמאָמעטער, און ביי א געזונטן מענשן איז די טעמפעראטור $36,5^{\circ}$ אָדער 37° C. כדי דער מענשליכער קערפֿער זאָל שטענדיג זיין ווארעם, מוז מען אים הייצן. דער מענשליכער גוף נויטיגט זיך אין הייצמאטעריאל, פונקט ווי יעדע מאשין. ער נויטיגט זיך אויך אין לופֿט, כדי די הייצונג זאָל זיין מעגליך. ער נויטיגט זיך אָבער אין לופֿט, וואָס האָט אין זיך גענוג ווערשטאָף. אָבער לופֿט און הייצמאטעריאל איז נאָך ווייניג פֿאַרן לעבן: ביז א געוויסן עלטער וואקסט און אנטוויקלט זיך דער מענשליכער גוף, ער דארף זיך אליין אויפֿבויען. שפעטער אפֿילו, בעת ער דערגרייכט שוין זיין פֿולן וואקס, שטעלט זיך אויך ניט אָפֿ די ארבעט פֿון בויען. די אָרגאנען ניצן זיך אָפֿ, און מען מוז שטענדיג אָפֿבויען דאָס פֿאַרניצטע, דערפֿאַר נויטיגט זיך דער מענש, צייט ער לעבט, אין בוי-

מאטעריאל, הייצמאטעריאל און אין לופט, וואָס האָט אין זיך גענוג זייערשמאָף. די לופט און די איבעריגע שמאָפן נעמט דער מענטש פֿון דער ארומיגער

וועלט. א מייל פֿארניצט ער, דאָס איבעריגע ארבעט ער איבער און לאָזט עס ווידער ארויס. די ארבעט איז פֿארטיילט צווישן פֿארשידענע אָרגאנען. די וויכטיגסטע זיינען די אָטעמאָרגאנען, די אָרגאנען פֿון פֿארדייאונג, די אָרגאנען פֿון בלוט-לוף און די אָרגאנען פֿון דער ארויסטילונג.



די פֿארדייאונג און די אָרגאנען פֿון דער פֿארדייאונג.

די וויכטיגסטע שפייז-שמאָפן.

אין דער מענשליכער שפייז מוזן זיך געפינען אלע נויטיגע בוי-און-הייצשמאָפן. דער מענטש ליכער נוף נויטיגט זיך, פונקט ווי די פֿלאנצן, אין וואסער. וואסער געפינט זיך אין בלוט און כמעט אין אלע שמאָפן פֿון דעם גוף. אָהן וואסער וואָלטן ניט געקענט פֿאָר-קומען די וויכטיגסטע פֿראַצעסן.

דער סקעלעט באשטייט פֿון קאלך און אנדערע מינעראלן, דערפֿאר נויטיגן מיר זיך אין פֿאר-שיידענע מינעראלשמאָפן. איינער

געפֿנטע ברוסט-הייל און בויכהייל. פֿון „דאמ. האנטיין, נאטורנעשיכטע דעם טירריכט“, פֿארלאג F. E. Schreiber אין מינכע און עסלינגען.

פֿון די וויכטיגסטע איז די געוואוינטליכע קאָכזאלץ. מיר מישן זי צו כמעט צו אלע אונזערע שפייזן.

מיר קענען זיך ניט באגיין אָהן אייווייַס.

אייווייַס געפֿינט זיך אין בלוט, אין די מוסקולן און אין דעם מאַרד. דאָס איז א ציהעדיגער שטאָף, וואָס ווערט לייכט פֿאָרגליווערט. ריינע אייווייַס זעהען מיר אין ווייסל פֿון אן איי. דער מענש געפֿינט אייווייַס אין אייער, אין פֿלייש, אין מילך, אין אייניגע גאָרטננרינסן (דערהויפט אין אַרבעס).

הייצשטאָפֿן זיינען פֿעטסן און קוילנהידראַטן.

פֿעטס געפֿינען מיר אין דער שמאלץ פֿון חיות, אין מילך (פוטער) אין פֿלאַנצנאייִלן. די זאָט פֿון אייניגע פֿלאַנצן זיינען זעהר רייך מיט אייל, למשל, ליינזאָמען, די זאָט פֿון דעם רייז (סעמעטשקעס), די פֿרוכט פֿון איילבויס (אַליווע) אין די וואַרעמע לענדער און די ניס פֿון א קאָקוספֿאלמע אין די הייסע לענדער (קאָקאָוואַר). די פֿרוכט פֿון קאָקאָאָבויס האָט אין זיך אויך פֿעטס, דערפֿאַר איז קאָקאָאָ זעטיג.

קוילנהידראַטן זיינען אויניע שטאָפֿן, וואָס האָבן אין זיך קוילנשטאָף, זייערשטאָף און וואַסערשטאָף. די וויכטיגסטע קוילנהידראַטן פֿאַרן מענשן זיינען קראַכמעל און צוקער. קראַכמעל געפֿינען מיר אין פֿלאַנצן, דערהויפט אין קארטאָפֿל און אין תבואה (מעל). צוקער נעמען מיר אויך פֿון פֿלאַנצן. רייך מיט צוקער זיינען ווייסע צוקערבוריקעס און צוקערראַר. צוקער געפֿינט זיך אויך אין פֿיל גאָרטננרינסן (למשל, אין מערן) און אין פֿרוכט (אין בערנעס).

מילך האַט אין זיך אלע נויטיגע שטאָפֿן: פֿעטס, וואָס שווימט אַרויף אויבן (שמאַנט, פוטער), אייווייַס, וואָס ווערט קענטיג, בעת מען פֿאַרזייערט די מילך און מען וואַרעמט עס אָן (קעז), אין מילך איז אויך דא צוקער. דערפֿאַר קען דער מענש לעבן נאָר מיט מילך אליין. מיר זעהען דאָס אויפֿן ביישפּיל פֿון קליינע קינדער און קראַנקע.

אויסערדעם באַנוצט נאָך דער מענש אפֿולע שטאָפֿן, וואָס האָבן ניט קיין קראַפֿט צו שפּייזן, אָבער זיי מאַכן דאָס עסן געשמאַקער, אפּעטיטליכער. דערצו געהערן פֿאַרשידענע געוויירצן: פֿעפֿער, צימרינג א. א. וו.

קאווע אין טיי האָבן אין זיך שטאָפֿן (קאפֿעין און טעין), וואָס טרייבן ניער די בלוט. אָפּטמאָל פֿרישן זיי אָפּ און דערמונטערן דעם מענשן, אָבער פֿאַר א מענשן מיט א שוואַכער האַרץ זיינען זיי שעדליך. אין בראַנפֿן, וויין און ביר געפֿינט זיך א באַזונדערער שטאָף אלקאָהאָל, וואָס ווירקט ווי א נישט אויף אונזער מאַרד און אויף אנדערע אונזערע אָרגאַנען. צוואַמען מיטן עסן קומען אָפּטמאָל אריין אין גוף פֿאַרשידענע שעדליכע

באקטעריעס. דערפֿאר מוז מען האלטן די שפייז אין דער גרעסטער זויבער-קייט. פֿליגן פֿארטראָגן אויף שפייז שמוץ און באקטעריעס, דערפֿאר מוז מען אלצדינג האלטן זוגעדעקט. פֿרוכט דארף מען עסן געשיילטע אָדער אָפּוואשן פֿארן עסן, ווייל זיי וואלגערן זיך אויף דער ערד און פֿיל מענשן האלטן זיי אין די הענט.

אין קולטורעלע לענדער טאָר מען ניט אָנרירן קיין געבעקס מיט די הענט, איידער מען קויפט עס. פֿארן עסן מוז מען אלעמאָל וואשן די הענט.


די ציינער.

דער מענש גרייט צו די שפייזשטאָפֿן צום עסן, אָבער אין אָרגאניזם ווערן זיי אינגאנצן איבערגעארבעט. די פֿארדייאונג קומט פֿאָר אין מויל, אין מאָגן און אין די געדעריס.

אין מויל ווערט דער ביסן צעריבן און צעקויט מיט די ציינער און מיט דער צונג. די צעקויטע שפייז צעמישט זיך מיט שפייזעכץ און ווערט אראפֿ-געשלונגען. דער מענש ווערט געבאָרן אָהן ציינער. דערפֿאר קען ער זיך די ערשטע צייט שפייזן נאָר מיט שיטערע שטאָפֿן. ביז זעקס יאָר וואקסן אויס צוואנציג ציינער, דאָס זיינען די מילכציינער. אויפֿן יובעטן יאָר הויבן זיי אָן ארויסצופֿאלן און פֿארבייטן זיך מיט שטענדיגע. אינגאנצן האָט א דערוואקסענער מענש צוויי און דרייסיג ציינער; פֿונפֿאַרנט אכט פֿלאציגע שניידציינער, פֿון די זייטן צו איינציגע עקציינער און צו פינף באקציינער. יעדער צאָן האָט א קרוינדל און א וואָרצל. די באקציינער האָבן ברייטע בערגלדיגע קרוינדלעך און גרויסע וואָרצלען. די קרוינדל איז ביי אלע ציינער באדעקט מיט א זעהר הארטן בליסטשענדיגן שטאָף, עמאַל. אין צאָן געפֿינט זיך א קאנאל, וואָס איז אָנגעפֿילט מיט צאָנווייכקייט; נערוון און דינע בלוט-אָדערן, וואָס ברענגען אריין אין צאָן בלוט. בעת די עמאל רייכט זיך אָפּ אָדער ווערט צעשפּאַלטן, ווערט אין צאָן א לעכל, וואָס קען דערגיין ביז צו דער צאָנווייכקייט אין קאנאל. דער צאָן ווערט דערפֿון קראנק און פֿאַר-דאָרבן. אפֿולע מענשן פֿארלירן פֿריה זייערע ציינער און קענען ניט גוט צעקויען קיין שפייז.

די ציינער מוז מען זעהר היטן. צווישן די ציינער און אויף זיי בלייבן שטיקלעך שפייז, זיי הויבן אָן צו פֿוילן, און צוליב זיי הויבט אויך אָן צו פֿוילן דער צאָן. די ציינער מוז מען וואָשן און פּוצן מיט א בערשטעלע. ווינאָר עס באווייזט זיך א קליינע לעכעלע, טאָר מען זי ניט פֿאַרלאָזן, מען מוז זיך ווענדן צו א צאָנדאָקטער, וואָס רייניגט אויס די לעכל און פֿאַר-בלאָמברט זי, דאָס הייסט, ער פֿאַרשטאָפט זי מיט א הארטן שטאָף, וואָס


פּוילט ניט אליין און לאָזט ניט צו, דער נאַן וואָל פּוילן. דערהויפּט איז וויכטיג צו רייניגן די ציינער פֿארן שלאָף, ווייל בידערנאכט, בעת דער



פֿון „פּראַט. האַנשטיין. נאַטורנעשיכטע דעם מירדיכס“, פּלג. F. F. Schreiber אין מינכען און עסלינגען.

מענש רוהט, פּוילן די ציינער גיכער, ווי בייטאַג, ווען די מויל באוועגט זיך, און די ברעקלעך, וואָס שטייען צו צו די ציינער, ווערן דערוויילע אָפּגעריבן.

די שפייטצוגילן.



פֿון „פּראַט. האַנשטיין, נאַטורנעשיכטע דעם מירדיכס“, פּלג. F. F. Schreiber אין מינכען און עסלינגען.


די מויל איז אינווייניג שמענדיג פּויכט פֿון שפייטכץ, וואָס גיסט זיך אריין אין מויל דורך לעכעלעך פֿון באזונדערע גילן, וואָס באשטייען פֿון אפּולע בלעזעלעך, ווי א בינטל ווייני-טרויבן. די גילן געפֿינען זיך אונטערן צונג, לעבן דעם אונטערשטן מוילביין און לעבן די אויערן. אמאָל ווערן זיי אנגעשוואָלן, דאן קען מען זיי דערטאפּן מיטן האַנט. ווען שמאָפֿן, וואָס האָבן אין זיך קראַכמעל, צעמישן זיך מיט שפייטכץ, ענדערן זיי זיך איבער, עס ווערט פֿון זיי צוקער; פֿארן מענשן איז דאָס וויכטיג דערפֿאר, ווייל צוקער צעגייט, און קראַכמעל ניט; דער גוף אָבער קען אויסנוצן נאָר די שמאָפֿן, וואָס צעגייען.

די שלינגהייל און דער וויישעט (עסרער).

אז מען קוקט זיך איין מיט אן אָפּענער מויל אין שפיגל, זעהט מען פֿונדהינטן אזוי ווי א קליינעם פֿארהאנג, דאָס איז דער קליינער צינגל, וואָס

טיילט אָפּ די מוילהייל פֿון דער שלינגהייל. אין שלינגהייל עפענען זיך דורך באזונדערע קאנאלן די אויערן צו דער נאָז; אויפֿאונטן נייען אראָפּ פֿון שלינגהייל צוויי קאנאלן: איינער פֿונפֿאַרנט, וואָס פֿאַרמאכט זיך בעת מיר שלינגען, מיט א דעקל, דאָס איז די לופֿטרער; דער צווייטער קאנאל געפֿינט זיך הינטן, דאָס איז דער וויישעט. ער באשטייט פֿון מוסקולן. דורך אים לאָזט זיך אראָפּ דער ביסן אין מאָגן.

דער מאָגן.



פֿון „פֿאַם. האַנשמײַן. נאַטורגעשיכטע דעם טיררייכטײַם“ פֿלג. F. F. Schreiber אין מינכען א ז עסלינגען.

דער מאָגן באשטייט פֿון שטארקע מוסקולן. ער האָט די פֿאַרמע פֿון א זאק און געפֿינט זיך אין בויכהייל אונטער דער ברוסטבויכשיידווענטל פֿונלינקס. אין מאָגן ווערט די שפייז דער־ווארעמט, נאָכאמאָל צעריבן צווישן די מוסקולן פֿון מאָגן און אויס־געמישט מיט מאָגנאפֿט, וואָס האָט די אייגנשאפֿט צו צעלאָזן אייווייס. אין מאָגנאפֿט צענייט פלייש, ווייסל פֿון אן איי, קעני. אין מאָגן בלייבט די שפייז עטליכע שעה. פֿאַרהאַנען לייכטע און שווערע שפייזן. א שימערע

איי צענייט גיכער, ווי א הארמע, געקאכטע פלייש גיכער ווי געבראָטענע א. א. וו. אז דער מאָגן פֿאַרענדיגט זיין ארבעט, ציהט ער זיך צוזאמען און די שפייז גייט אריבער אין די געדערן.

די געדערן און די בויכגילן.

די געדערן זיינען א זעהר לאנגער קאנאל, וואָס איז צונויפֿגעדרייט אין א קנול. דער קנול פֿאַרנעמט מער ווי א העלפט פֿון גאנצן בויכהייל. דער געדערימקאנאל באשטייט פֿון צוויי טיילן: א דינעם און א גראָבן. יעדער טייל צעטיילט זיך ווידער אין עטליכע טיילן, וואָס יעדערער פֿון זיי האָט זיין באזונדער נאָמען. אייך איז געוויס אויסגעקומען צו הערן וועגן דער בלינדער קישקע. דאָס איז א טייל פֿון דער גראָבער קישקע, וואָס געפֿינט זיך רעכטס

אין בויכהייל. זי איז פֿונאונטן אויסגעצויגן אזוי ווי א קעשענע מיט א שפיץ, וואָס רופֿט זיך דער וואָרעמאַפּוואָקס. די אנטצינדונג פֿון דעם אָפּוואָקס רופֿט ארויס א זעהר שווערע קראַנקייט.

דער דינער טייל פֿון קאנאל הייבט זיך אָן פֿון מאָגן און פֿאראייניגט זיך דורך באזונדערע רערן מיטן לעבער און מיט א גרויסן גיל, וואָס ליגט אונטערן מאָגן. דער לעבער געפֿינט זיך פֿונאויבן, רעכטס אין בויכהייל. פֿון גיל גיסט זיך אריין אין די נעדערים בויכשפייעכץ, און פֿון לעבער גיסט זיך אריין א גרינליכע פֿליסיקייט: גאל. אין גאלפענכער געפֿינט זיך א שטענדיגער זאפּאס גאל.

ביידע פֿליסיקייטן ווירקן אויף די שפיין אזוי: זיי צעלאָזן אייווייס, ארבעטן אויס צוקער פֿון קראַכמעל און צעלאָזן עס, צעקלאפּן די גרויסע פֿעטסטראָפּנס אויף גאָר קליינע; די פֿעטס ווערט אזוי ווי מולענעס. די שפיין ווערט שימער, לאנגזאם באוועגט זי זיך דורך דעם לאנגן געדרייטן קאנאל און ווערט ביסלעכווייז אריינגעצויגן דורך דער דינער הייטל פֿון די געדערים אין די דינסטע בלוטאָדערן, וואָס זיינען צעצווייגט אין דער הייטל. בעת מען רירט אן די קישקע פֿונאיינצווייג מיטן פֿינגער, פֿילט זיך אזוי ווי סאמעט. דאָס קומט דערפֿון, וואָס די אינווייניגסטע הייטל איז אויסגעצויגן אין טויזנטער קלייניקע זויגערלעך, וואָס מיט זיי זאפּט זי אריין די שפיין. די זויגערלעך זיינען דין ווי די דינסטע הערעלעך און זעהען זיך דיימליך גאָר אין מיקראַסקאָפּ.

ווינאָר די שפיין קומט אריין אין די אָדערן, טראָגט די בלוט פֿונאנדער די ברענאונוכוישטאַפֿן איבערן גאנצן גוף. הארטע, ניט צעגאנגענע, און דער-הויפט ניט קיין גויטיגע שטאַפֿן ווערן ארויסגעוואָרפֿן פֿון קערפּער דורך דער גלייכער קישקע.

דער גיין.

אָפּטמאָל ליידן מענשן פֿון א שעדליכן פאראזיט, וואָס פֿארקלייבט זיך אין די געדערים, אין דער דינער קישקע. דאָס איז א בלינדער ווייסער וואָרעם מיט א קליינעם קעפל, וואָס באשטייט פֿון אפֿולע פלאציגע גלידער און זעהט אויס, ווי א לאנגע און שמאַלע בענדל. מיט די פֿיר רונדע זויגערס אויפֿן קעפל זייגט ער זיך צו צו די געדערים, און מיטן גאנצן גוף זאפּט ער אין זיך אריין די שימערע שפייזשטאַפֿן. אין זיינע לעצטע הינטערשטע גלידער אנטוויקלען זיך טויזנטער קליינע אייעלעך. די גלידער טיילן זיך אָפּ און פֿאלן ארויס פֿון גוף צוזאמען מיט די אייער. וויאזוי אָבער קומט דער גיין אין מענשליכן גוף אריין? מיט מיסט און

מיט שמוץ פֿאלן אריין די אייער אין די שפייז פֿון א רינד. אין די געדערס פֿון רינד ווערט פֿון יעדער איי א בלאָז מיט עמליכע שמעכערס, מיט זיי באַרט זיך דורך דער בלאָז און אויסנאנג פֿון די געדערס, פֿאלט אריין אין אן אָדער, און דער בלוטשטראָם פֿארטראַגט אים אין א מוסקול. דאָ אנט-וויקלט ער זיך ווייטער. ער באקומט א קעפל מיט עמליכע גלדער, אָבער זיי בלייבן אין בלאָז. בעת דער מעגש עסט אזוינע פֿלייש (רויהע אָדער ווייניג צעקאָכטע) פֿאלן די בלאָזן אריין צו אים אין מאַגן. דער קעפל רוקט זיך ארויס פֿון בלאָז, און, לסוף, דערגרייכט דער נייץ אין די געדערס זיין פֿולע אנטוויקלונג.

אין פֿיש, דערהויפט אין הערינג, זיינען אויך דאָ גייצן, וואָס קענען זיך פֿארקלייבן צום מעגשן אין די געדערס.


עס זיינען דאָ זעהר פֿיל מינים ווערס פֿאראזיטן. זעהר געפֿערליכע ווערס טרעפֿן זיך אין חזירפֿלייש און אין די געדערס פֿון א הונט. אויב מען לאָזט א הונט לעקן דעם פנים און די הענט, און מען זעצט זיך נאָכ-דעם עסן מיט ניט קיין געוואשענע הענט, קענען אַסדי געפֿערליכע ווערס אריינקומען אין גוף.

אויפֿן ביישפֿיל מיטן נייץ, וואָס קומט אריין אין אונזער גוף דורך רינדענע פֿלייש, זעהט מען, ווי וויכטיג עס איז, מען זאָל בהמות האלטן רייז, דער-הויפט געבן זיי ריינע עסנס, ניט פֿאראומרייניגן די לאַנקעס, וואו זיי פֿיטערן זיך. אויסערדעם איז איינגעפֿירט אין די קולטורעלע לענדער, אז א דאָקטער קוקט איבער די פֿלייש פֿון יעדער געקוילעטער בהמה.

וועגן עטעמען און אַטעמאַרגאנען.

וועגן קוילנווערן גאָז אין דער ארויסגעטעמטער לופֿט. אָהן לופֿט קען א מעגש ניט לעבן ניט אין מינוט. סיי בייטאָג, ווען ער ארבעט און סיי ביידערנאכט, ווען ער רוהט, אלעמאָל עטעמט ער: ער ציהט אריין אין זיך לופֿט און לאָזט זי ווידער ארויס. די לופֿט, וואָס גייט ארויס פֿון מעגשן איז ווארעם, האָט אין זיך וואסערדאמף (גיט א הויך אויף א גלאָז אָדער א שפיגל) און האָט אין זיך קוילנווערן גאָז (גיט א בלאָז דורך א טרייבעלע אויף קלאַרע קאלכוואסער: עס וועט ווערן מוטנע). די אויס-געטעמטע לופֿט טויג שוין ניט פֿארן מעגשן. דערפֿאר מוז מען שמענדליג אָפֿפֿרישן די לופֿט אין די הייזער. עפֿנט די פֿענסטער אפֿילו אין א גרויסן פֿראַסט: שעדליכע לופֿט איז פֿאר אונזער געזונט געפֿערליכער, ווי קעלמ. דער קוילנווערער גאָז פֿון דער ארויסגעטעמטער לופֿט האָט זיך געשאַפֿן אין אונז: דער זייערשטאַף פֿון דער אריינגעטעמטער לופֿט האָט זיך פֿאר-

אייניגט מיט דעם קוילנשטאָף פֿון אינווערע אָרגאנען (פונקט אזוי פֿאראייניגט זיך דער זויערשטאָף מיט דעם קוילנשטאָף פֿון האַלץ, בעת מיר ציגן עס אָן). וויאזוי די פֿאראייניגונג קומט פֿאר אין מענשליכן גוף קענען מיר ניט זעהן; עס באקומען זיך אָבער דיזעלביגע רעזולטאטן: פֿון דעם קוילנשטאָף און דעם זויערשטאָף ווערט קוילנזויערער גאז, און עס אנטוויקלט זיך די נויטיגע ווארעם־קייט, כדי דאָס לעבן זאָל גיין אין מענשליכן אָרגאניזם. דאָסזעלביגע ביי אלע לעבעדיגע באשעפֿענישן. ביי גאנץ איינפֿאכע לעבעדיגע באשעפֿענישן, ווי למשל, ביי דעם רעננוואָרעם, גייט די לופֿט אריין אין גוף דורך דער גאנצער הויט. ביי די מער אנטוויקלטע באשעפֿענישן און ביי דעם מענשן גייט זי אויך אריין דורך דער הויט, אָבער דערצו איז נאָך דאָ אַ גאנצע סיסטעם פֿון באזונדערע אָרגאנען, וואָס נעמען אריין און לאָזן ארויס די לופֿט. צו זיי געהערן: די מויל, דער נאָז, די לופֿטרער און די לונגען.



אָטעמערער און לונגען.

פֿון „פראם. דאנשטיין, נאטורעשיכטע דעם טיררייכס“, פֿלג. F. F. Schreiber אין מינכען און ערלינגען.


דער נאָז און די לופטרער.

דער נאָז פֿאַראייניגט זיך דורך שמאַלע און געדרייטע קאנאלן מיטן שליינגהייל. די קאנאלן זיינען אויסגעלייגט מיט א דינער און פֿייכטער שליימהייטל מיט קליינע הערעלעך. אז די לופט גייט אריין אין נאָז, ווארעמט זי זיך אָן און פֿאַרלירט אפֿולע שטויב, וואָס בלייבט אויף די הערעלעך און אויף דער פֿייכטער הייטל. דערפֿאַר איז געזינטער צו עטעמען מיטן נאָז, איידער מיטן מויל. פֿון נאָז גייט די לופט אריין דורכן שליינגהייל אין לופטרער.

די לופטרער האָט אין די ווענטלעך האלבע רייפֿן פֿון כראָמסקע, דער-פֿאַר איז זי שמענדיג א פֿרייער וועג פֿאַר די לופט. איר אויבערשטער טייל, דער קעל, באשטייט פֿון עטליכע כראָמסקענע פלאטן. איינע פֿון זיי דעקט צו די לופטרער בעתן שליינגען, דער ביסן זאָל ניט אריין אין רער. (אויב דאָס טרעפֿט זיך, זאָגט מען „דער ביסן איז אריין אין לינקן קעל“.) דער קעל, דערהויפּט די קנייטשן פֿון זיין שליימהויט (די שטימבענדער) האָבן א גרויסן באטייט פֿאַרן מענשליכן קול. אויב די שטימבענדער זיינען קראַנק, ווערן מיר הייזערדיג.

די לונגען.

די אָטעמער צעצווייגט זיך אין צוויי רערן, בראַנכעס, א לינקע און א רעכטע.



בראַנכעס און בראַנכיאלן.

פֿון „פראַט. דאנשמיינ, נאטורגעשיכטע דעס מירדיכס“, פֿלג, F.F. Schreiber אין מינען און עסלינגען.

יעדע רער ווידער צעצווייגט זיך אויף קלענערע רערן. די קלענסטע רערן אָדער בראַנכיאלעס פֿאַרענדיגן זיך מיט די קלענסטע און דינסטע בלעזעלעך. די בלעזעלעך און די רערן זיינען באפֿלאַכטן מיט א געדיכטן נעץ פֿון בלוטאָדערן, וואָס זיינען דין, ווי האָר. די גאנצע מאסע בראַנכיאלעס און בלעזעלעך איז פֿון ביידע זייטן, פֿונלינגס און פֿונרעכטס, ארומגעכאפט, אזוי ווי מיט צוויי זעק, וואָס באשטייען פֿון א זעהר דינער פֿייכטער הייטל (די פלעוורע). דאָס זיינען די לונגען. די לונגען פֿילן אָן מיט זיך כמעט די גאנצע ברוסטהייל. די ברוסטהייל איז אויך אויסגעלייגט מיט א דינער שליימהייטל, אזוי אז די לונגען, בעת זיי באוועגן זיך, רייבן זיך ניט אָן אירע ווענטלעך.

ווי ווערט די בלוט גערייניגט אין די לונגען?

די לופט גייט אריין דורך דער לופטרער אין די בראַנכעס, פֿון זיי אין די בראַנכיאלעס און אין די לונגענבלעזעלעך. דורך די דינע היימעלעך פֿון די בלעזעלעך און פֿון די אָדערן גייט אריין דער זייערשטאַף פֿון דער אריינ-געעמעטער לופט אין די בלוט, און דער קוילנזייערער גאז פֿון דער בלוט גייט אריין אין די לונגענבלעזעלעך. אזוי קומט פֿאַר אן אויסבייט צווישן דער אריינגעעמעטער לופט און דער בלוט. די בלוט קומט אריין אין די לונגען באלאָדן מיט קוילנזייערן גאז, דערפֿאַר האָט זי א טונקלרויטע פֿאַרב, און בעת זי פֿאַרלאָזט די לונגען, איז זי רייך מיט זייערשטאַף און האָט א העלרויטע פֿאַרב. באַפֿרייענדיג זיך פֿון קוילנזייערן גאז, רייניגט זיך די בלוט. די לופט גייט ארויס פֿון די לונגען דורכן זעלבניגן וועג, און אויף איר אָרט גייט אריין פֿרישע לופט.

די אַטעמבאוועגונגען.

ביים עטעמען שפילט א ראלע דער גאנצער ברוסטקאסטן און דערהויפט די ווענטל, וואָס טיילט אָפּ די ברוסטהייל פֿון דער בויכהייל. אין רוהיגן צושטאנד איז די ווענטל אריינגעוועלכט אין ברוסטהייל; בעת אירע פֿעדים ציהען זיך צוזאמען, ווערט זי פֿלאַך און גיט א דריק די בויכ-אָרגאנען; די ברוסטהייל ווערט דערביי גרעסער, און די לופט אין איר שיטערער, דערפֿאַר גייט אריין א שטראָם פֿרישע לופט פֿונדערויסן; בעת די פֿעדים פֿון ווענטל ציהען זיך ווידער אויס, בייגט זי זיך ווידער אריין אין ברוסטהייל און גיט א דריק די לונגען; די בלעזעלעך דריקן זיך צוזאמען, און די לופט גייט ארויס. דערביי טרעפֿט זיך קיינמאָל גיט, אז עס זאָל ארויסגיין גאָר די לופט. א טייל פֿון איר בלייבט, דערהויפט אין די אויבערשטע שפיצן פֿון די לונגען.

וואָס ברייטער עס ווערט די ברוסטהייל, אלץ מער פֿרישע לופט קומט אריין אין די לונגען. בעת א מענש באוועגט זיך, באטייליגט זיך אין עטעמען דער גאנצער ברוסטקאסטן. די מוסקולן פֿון ברוסט ציהען זיך צוזאמען, און די ריפן הייבן זיך אויף, די ברוסטהייל פֿאַרברייטערט זיך, און עס קומט אין אים אריין אלץ מער פֿרישע לופט. דער מענש עטעמט דאן מיט א פֿולער ברוסט, און די לופט באגייט זיך אין אלע טיילן פֿון די לונגען.

ווי פֿאַרהיט מען די לונגען?

ארבעט און באוועגונג אויף דער פֿרייער לופט ווירקן זעהר גוט אויפֿן מענשליכן אָרגאניזם. זעהר געפֿערליך פֿאַר די לונגען איז שטויב; אויסער-

דעם, וואָס דער שטויב פֿארשטאַמט די בראַנכיאַלעס און די בלעזעלעך, ברענגט ער אָפֿט אַרײַן אין די לונגען די געפֿערליכע טובערקוליאָז באקטעריעס. זײ האָבן די פֿאַרמע פֿון גאַנץ קלײנע דינע שטעקעלעך און זײנען זעהר פֿאַר-שפּרײט; זעלטן ווער עס קען זיך אפּהײטן, אַז די באצילן זאָלן נײט אַרײַנד קומען אין זײן גוף, אָבער אין א שטאַרקן אָרגאַניזם אנטזױקלען זײ זיך נײט. נומע שפּײז, פֿרײשע לופֿט, די שטראַלן פֿון דער זון זײנען דער בעסטער מיטל געגן טובערקוליאָז. דערהױפּט איז די קראַנקײט פֿאַרשפּרײט אין די גרויסע שטעט, וואו די מענשן לעבן אין ענגשאַפֿט און אין א פֿאַרשטיקטער לופֿט. מענשן, וואָס טראָגן אין זיך די באצילן, שפּײען זײ אַרויס צוזאַמען מיט זײערע לײחות. דאָס אױסגעשפּײטע ווערט פֿאַרטריקנט, די באצילן הײבן זיך אױף אַינדערלופֿטן מיטן שטויב, דער שטויב פֿאַלט אױף פֿאַרשײדענע זאַכן, אָן וועלכע מיר רירן זיך שטענדיג אָן, מיר עטעמען אים אױך אַרײַן מיט דער לופֿט, און אױף אַזא אַופֿן קענען מיר זיך אַנשטעקן מיט טובערקוליאָז. אזױ ווי קײן מענש קען נײט זײן זיכער, אַז ער האָט נײט אין זיך קײן באצילן, טאָר קײנער נײט שפּײען אױף דער ערד. דאָס איז א גרויסער פֿאַרברעכן, וײל דורכדעם שטעלן מיר אין סכּנה אפֿולע מענשן.

אין קולטורעלע לענדער שטעלט מען שפּײקעסטלעך נײט נאָר אין די הײזער, נײערט אפֿילו אין די גאַסן און דערהױפּט אומעטום, וואו עס קומען און גײען אַרום מענשן. אין די שפּײקעסטלעך דאַרף אלעמאָל זײן וואסער, די באצילן זאָלן זיך נײט אױפּהײבן מיטן שטויב.

די גאַסן מוזן ווערן באַגאַסן עטליכע מאַל אין טאַג. מען מוז אױך זײן פֿאַרזיכטיג מיט לעפֿל, גאַפּלען, גלעזער; הײסע וואסער איז דער בעסטער מיטל; עסט נײט מיט קײן פֿרעמדן לעפֿל, אײדער איר האָט אים נײט גוט אָפּגעוואשן. דערהױפּט איז רײנליכקײט אלעמאָל דער בעסטער מיטל געגן אלע קראַנקײטן.

די צירקולאַציע פֿון דער בלוט און די אָרגאַנען פֿון דער צירקולאַציע.

די בלוט.


די בלוט האָט דעם גרעסטן באַטייט פֿאַרן מענשן. נײטאָ קײן אײן וײנקעלע פֿון מענשליכן גוף (אין די מוסקולן, אין די מאַרד, אין די בײנער), וואָס די בלוט זאָל צו אים נײט צוקומען; וואָרים אױב צו אײן גליד זאָל קײן בלוט נײט צוקומען, שטאַרבט ער אָפּ. די בלוט טראָגט פֿונאַנדער אײבערן נאַנצן גוף שפּײז און זײערשטאַף. די שפּײזשטאַפֿן נעמט די בלוט אַרײַן אין זיך פֿון די געדעריס, דעם זײערשטאַף — פֿון די לונגען. אין יעדן טײל פֿון קערפּער בלײבן די שטאַפֿן, וואָס זײנען פֿאַר אים גײטיג און

טיילן זיך אויס די, וואָס זיינען איבעריג אָדער שעדליך. די בלוט נעמט צוזאמען די שעדליכע שטאָפֿן און ברענגט זיי אין די אָרגאנען, וואָס דורך זיי קענען זיי ארויסגיין פֿון גוף. אזוי ברענגט די בלוט דעם קוילנוויערן גאז, וואָס איז שעדליך פֿאַרן אָרגאניזם, אין די לונגען, און די לונגען עמעמען אים ארויס; די איבעריגע שעדליכע שטאָפֿן ברענגט די בלוט צו די נירן און צו דער הויט, דורכוואנען זיי טיילן זיך אויס פֿון קערפער.

אז מען קוקט זיך איין אויף א טראָפֿן בלוט דורכן מיקראַסקאָפֿ, זעהט מען, אז די בלוט איז א געלבליכע פֿליסיקייט (סוראָועטקע אָדער סערום), וואָס אין איר שווימען ארום צווייערליי קייקעלעך: רויטע און ווייסע. דער נאָמען קייקעלעך איז ניט אינגאנצן צוגעפאסט, ווייל די רויטע זיינען ניכער פלאציגע קוכעלעך, איידער קייקעלעך. ווי קליין זיי זיינען, קען מען שוין פֿארשטיין פֿון דעם, וואָס אין איין טראָפֿן געפֿינען זיך מיליאָנען רויטע קייקעלעך.

די ווייסע קייקעלעך אָדער די לייקאָציטן זיינען עטוואָס גרעסער פֿאַר די רויטע. זיי האָבן אויך ניט קיין ריכטיגע פֿאַרמע פֿון א קייקעלעך: זיי בייטן זייער פֿאַרמע, אויסציהענדיג זיך אָדער ארויסלאָזנדיג שפיצן.

די רויטע קייקעלעך נעמען אריין אין זיך זייערשטאָפֿ פֿון די לונגען און געמען צונויף אין די אָרגאנען דעם קוילנוויערן גאז. דורך זיי קומט פֿאַר דער אויסבייט פֿון די גאזן. די לייקאָציטן שפּילן אויך א גרויסע ראָלע. זיי נעמען אריין אין זיך פֿארשידענע באקטעריעס, וואָס קומען אריין אין די בלוט. די באקטעריעס גייען אונטער, בעת זיי ווערן פֿארשלונגען פֿון די לייקאָציטן, און דער אָרגאניזם ווערט פֿארהיט פֿון א געפֿערליכער קראנקייט. אויף אזא אופן קומט פֿאַר א קאמף צווישן די לייקאָציטן און די באקטעריעס; ניט אלע-



בלוטקייקעלעך.

פֿון „מראם. דאנשמיין. נאטורגעשיכטע דעם טיר-
ריכטס“ פֿלג. F. F. Schreiber
אין מינכן און עסלינגען.

מאָל קענען די לייקאָציטן בייקומען די באקטעריעס, וואָס פֿארמערן זיך מוראדיג גיך.

וואָס מער בלוט דער מענש האָט, אלץ געזינטער פֿילט ער זיך. פֿאַרן מענשן איז זעהר געפֿערליך צו פֿארלירן בלוט. אין אָרגאניזם איז די בלוט אלעמאָל פֿליסיג, אויף דער לופֿט ווערט זי פֿארגליווערט; אויב עס מאכט

זיך א קליינע וואונד, און עס רינט בלומ, פארשטאפט די בלומ אליין די וואונד, ווערנדיג פארגליווערט. וואָס קעלטער די לופט איז, אלץ גיכער ווערט די בלומ פארגליווערט, דערפאר איז גוט צוצולייגן קאלטע וואסער בעת א בלומונג.

דורך אן אָפענע וואונד קענען אין די בלומ גיכער אריינקומען מיט שמוץ שעדליכע באקטעריעס, דערפאר דארף מען האַלטן א וואונד זעהר ריין און אָפט בייטן דעם באנדאזש.


דאָס האַרץ און די אַדערן. (די בלומגעפֿעס)

די בלומ געפֿינט זיך אין א שטענדיגער באוועגונג און שטעלט זיך ניט אָפּ אויף קיין איין סעקונדע. אז די בלומ שטעלט אָפּ איר לויף, קומט דער טויט.

די האַרץ איז דער אָרגאן, וואָס טרייבט די בלומ אָהנאנאויפֿהער. די האַרץ אליין געפֿינט זיך אויך אין א שטענדיגער באוועגונג: זי ציהט זיך צוזאמען און ציהט זיך ווידער אויס.

די בלומ צעניסט זיך פֿון האַרצן איבערן גאנצן קערפֿער דורך באוונדערע רערן, בלומאַדערן, וואָס זעהען זיך דורך ערטערווייז דורך דער הויט.

די אַדערן, וואָס טראָגן ארויס די בלומ פֿון האַרצן, הייסן אַרמעריעס. די בלומ פֿליסט דורך זיי, ווי א גיכער שטראָם. זיי האָבן דערפֿאר זעהר שטארקע און עלאסטישע ווענטלעך; די בלומ באוועגט זיך פֿאַרויס, פֿונ־אנדערשפארנדיג זייערע ווענטלעך. דעם לויף (דעם פֿולם) פֿון דער בלומ אין די אַרמעריעס קען מען דערפֿילן דורך דער הויט. טאפט אָן דעם פֿולם, צודריקנדיג דעם שלאָג־אָדער פֿון האנט לעבן גרויסן פֿינגער. אז מען שניידט איבער אן אַרמעריע, פֿליסט די בלומ ארויס ווי פֿון א פֿאַנטאן, און ס'איז זעהר שווער זי אָפּצוהאלטן.



פֿון „פראם. דאנשמיינ, נאטורגעשיכטע דעם טיררייכס“, פֿלג. F. F. Schreiber אין מינען און עסלינגען. 10

די אַדערן, וואָס ברענגען די בלומ צום האַרצן, רופֿט מען ווענעס. דער בלומשטראָם איז אין זיי שמילער; זייערע ווענטלעך זייגען

ניט אזוי עלאסמיש. בעת מען שניידט איבער א ווענע, קען מען צודריקן אירע ווענטלעך און גיכער פֿארהאלטן די בלוט, איידער בעת מען שניידט איבער אן ארטעריע.


די ארטעריעס פֿאראייניגן זיך מיט די ווענעס דורך זעהר דינע אָדערן, וואָס מען רופֿט האָראָדערן; אין מענשליכן גוף זיינען דאָ זעהר פֿיל האָראָדערן. זייערע דינסטע צווייגעלעך דרינגען אריין אין אלע גלידער. פֿון א קלאפ אָדער א שטאָך צערייסן זיך אָפֿט ביי אונז די האָראָדערן, אָבער זיי וואקסן זיך גיך ווידער צוזאמען.

בעת די הארץ ציהט זיך צוזאמען, גיסט זיך די בלוט פֿון איר ארויס און צעגיסט זיך איבערן קערפער; ווען זי ציהט זיך ווידער צוזאמען, פֿליסט די בלוט אין איר ווידער אריין. ביי א געוונטן דערוואקסענעם מענשן ציהט זיך די הארץ צוזאמען זיבעציגאכציג מאל אין א מינוט, ביי א קינד ביז ניינציג מאל. בעת מיר באוועגן זיך האסטיג, אָדער בעת מיר זיינען אויפֿ־ גערעגט פֿון שרעק, פֿרייד אָדער פֿארדרום, באוועגט זיך די הארץ גיכער; די באוועגונג קענען מיר דייטליך פֿילן, בעת מיר לייגן צו די האנט צו דער ברוסט.

די הארץ באשטייט פֿון א זעהר שטארקן מוסקול. עס געפֿינט זיך אין ברוסט־הייל צווישן די לונגען. איר פֿארמע איז עגליך צו א קאָנוס, דער שפיץ איז פֿונאונטן, ער איז געווענדט עטוואָס אויפֿלינקס. די הארץ איז ביי יעדן מענשן אומגעפֿער אזוי גרויס, ווי זיין פֿויסט. זי באשטייט פֿון פֿיר טיילן: די לינקע און די רעכטע פֿאָרהארץ (פֿאָרקאמער); די לינקע און די רעכטע הארצקאמער. די רעכטע און די לינקע העלפֿטן זיינען לחלוטין אָפּגע־ טיילט איינע פֿון דער אנדערער. צווישן דער לינקע פֿאָרהארץ און דער לינקער הארצקאמער געפֿינט זיך אן עפֿענונג; דאָסעלביגע צווישן דער רעכטער פֿאָרהארץ און דער רעכטער הארצקאמער. די עפֿענונג פֿארמאכט זיך דורך א באוועגליכע קלאפע, וואָס עפֿנט זיך, בעת זי באקומט א שטויס פֿונאויבן, און פֿארמאכט זיך, בעת זי באקומט א שטויס פֿונאונטן.

די צירקולאציע פֿון בלוט.

פֿון די לונגען גיסט זיך אריין די בלוט דורך די לונגענווענע אין די לינקע פֿאָרהארץ; ווינאָר די בלוט גיסט זיך אהין אריין, ציהט זיך די פֿאָר־ הארץ צוזאמען, די קלאפע עפֿנט זיך, ווייל די בלוט גיט איר א שטויס פֿונאויבן, און די בלוט גיסט זיך אריין אין די לינקע הארצקאמער; ווינאָר די בלוט גיסט זיך אריין אהין, פֿארקירצט זיך די לינקע הארצקאמער, די קלאפע פֿארמאכט זיך, ווייל זי באקומט א שטויס פֿונאונטן. די בלוט קען



די צירקולאציע פֿון בלוט.

פֿון „פראט. דאנשטיין, נאטורגעשיכטע דעס טירוייכס“, פֿלג. F. F. Schreiber אין מינבען און עסלינגען.

זיך ניט אומקערן אין פֿאַרהארץ און גיסט זיך אריין אין דעם גרויסן שלאָג-
אָדער (אָרטע). דער שלאָגאָדער האָט אויך קלאפעס, וואָס עפֿענען זיך
אין דער ריכטונג פֿון האַרצן און פֿאַרמאכן זיך אין דער ריכטונג צום האַרצן,
דערפֿאַר קען זיך די בלוט ניט אומקערן צוריק אין די לינקע האַרצקאמער.
די אָרטע צעצוווינגט זיך אויף אפֿולע קלענערע שלאָגאָדערן (ארטעריעס);
מיר ווייסן שוין, אז זייערע ווענטלעך זיינען זעהר שטאַרק און עלאסטיש.
די בלוט פֿליסט דורך זיי שטראָמיג. זיי צעצוווינגן זיך אין די אינווייניגסטע
טיילן פֿון גוף. אין די ערטער, וואו זיי גייען דורך פֿונאויבן (אין האנט, אין
די שלייפֿן) קען מען פֿילן, ווי די בלוט פולסירט. וואָס ווייטער פֿון האַרצן
ווערן די אָדערן אלץ קלענער, דער שטראָם אלס שטילער, ביסלעכווייז גייען
די ארטעריעס איבער אין די דינע האָראָדערן, וואָס דרינגען אריין אין די
מאַרד, אין די מוסקולן און אין די ביינער; דערביי קומט פֿאָר די דערנערונג
און די הייצונג פֿון קערפֿער; דורך די דינע הייטלעך גייען דורך די שפייד-
שטאָפֿן און דער וויערשטאָף, עס אנטוויקלט זיך וואַרעמקייט, און עס שאפֿן
זיך פֿאַרשיידענע אפֿפֿאלשטאָפֿן; קוילנוויערער גאז און אנדערע. פֿליסנדיג
איבער די האָראָדערן, ווערט די בלוט איבערגעפֿילט מיט אוויגע שטאָפֿן.
די האָראָדערן גייען ביסלעכווייז איבער אין גרעסערע אָדערן, אין די ווענעס;
דאָ איז דער שטראָם אפֿולע שטילער, איידער אין די ארטעריעס. פֿון אלע
קלענערע ווענעס קלייבט זיך די בלוט צוזאַמען אין צוויי גרויסע; פֿון די
אויבערשטע טיילן פֿון גוף אין דער אויבערשטער פוסטער ווענע, און פֿון
די אונטערשטע טיילן פֿון גוף אין דער אונטערשטער פוסטער ווענע. די
גרויסע ווענעס האָבן אויך קלאפעס, וואָס עפֿענען זיך אין דער ריכטונג
צום האַרצן און פֿאַרמאכן זיך אין דער ריכטונג פֿון האַרצן. די ווענעס
ברענגען די בלוט צו דער רעכטער פֿאַרהארץ; ווינאָר די בלוט גיסט זיך אהין
אריין, ציהט זיך די רעכטע פֿאַרהארץ צוזאַמען, די קלאפע עפֿנט זיך, און
די בלוט גיסט זיך אריין אין די רעכטע האַרצקאמער; ווינאָר די בלוט קומט
אריין אהין, ציהט זיך צונויף די האַרצקאמער, די קלאפע פֿאַרמאכט זיך,
און די בלוט גיסט זיך אריין דורך דער לונגענארטעריע אין די לונגען; דאָרטן
צעניסט זיך דער בלוטשטראָם איבער די דינסטע האָראָדערן, וואָס פֿלעכטן
ארום די בלעזעלעך. דאָ קומט אויך פֿאָר אן אויסבייט; דער קוילנוויערער
גאז גייט אריין אין די בלעזעלעך, און די וויערשטאָף אין די בלוט. די
לונגענווענע ברענגט אריין די אָפֿגערייניגטע בלוט ווידער אין די לינקע
פֿאַרהארץ, און די בלוטצירקולאַציע הייבט זיך אן פֿונדאָסניי. אזוי קומט פֿאָר
די צירקולאַציע פֿון דער בלוט.


ביי געוויסע קראַנקייטן ווערט די רצירקולאַציע געשטערט, זי קומט פֿאָר
גיכער אָדער לאַנגזאַמער, אָט לויט דעם סימן דערקענט דער דאָקטער, וון

עם האלט מיטן קראנקן. (איר האָט געוויס באַמערקט, ווי דער דאָקטער טאַפּט דעם פּולס ביי אַ קראַנקן.)

די אַרויסטײלונג און די אָרנאַנען פֿון דער אַרויסטײלונג.

די נירן.

די אָפּפּאַלשטאַפּן, וואָס די בלוט נעמט צוזאַמען בעת איר צירקולאַציע אין פֿאַרשיידענע טײלן פֿון גוף, זײַנען שעדליך און מוזן באַזײטיגט ווערן. די פֿלײסיגע שטאַפּן ברענגט די בלוט אין די נירן. די נירן האָבן די פֿאַרמע פֿון צוויי גרויסע בעבלעך. זיי געפֿינען זיך אין הינטערשטן טײל פֿון בױכהײל אין בײדע זײטן פֿון רוקנזײל. אַרמערעס ברענגען אַרײן די בלוט אין די גראָבע מוסקולדיגע האַראָדערן; דורך די דינע הײטלעך פֿון די האַראָדערן זײַען זיך דורך די שײטערע אָפּפּאַלשטאַפּן, די אַורין, אין דעם אַינווײניגסטן טײל פֿון די נירן, אין די נירנבעכערס. די בלוט פֿלײסט אַרויס צוריק דורך אַ ווענע שױן אַן אָפּגערייניגטע און לױפֿט ווײטער איר וועג; די אַורין גיסט זיך אַרויס פֿון די נירן דורך באַזונדערע אַוריןערן אין אַוריןפּענכער, וואָס געפֿינט זיך אין אונטערשטן טײל פֿון בױכהײל, און גײט אַרויס פֿון קערפּער.



די ניר.

פֿון „פּראַקטישע האַנשטײן, נאַטורגעשײכטע דעם טײרויכס“, פּרױ. F. F. Schreiber אין מינכען און עסלינגען.

די הויט.

די נירן קענען ניט באַפֿרײען דעם גוף פֿון אַלע אָפּפּאַלשטאַפּן; אַ גרויסע טײל פֿון דער אַרבעט פֿירט אױס די הויט, וואָס האָט דעם גרעסטן באַטייט פֿאַרן מענשן, זי באַשטייט פֿון דעריי שיכטן: פֿונאַויבן די האַרנשיכט, וואָס שײלט זיך אָפּ בױסלעכווייז און ווערט שטענדיג פֿאַרביטן מיט פֿרישע. אױף די הענט און אױף די פֿיס ווערט זי פֿון רײבן און דריקן זעהר האַרט (מאַזאַלעס אױף די הענט און היגעראַויגן אױף די פֿיס פֿון ענגע שיך). בעת עס מאַכט זיך אױפֿן הויט אַ בלאַז (אױב מען פֿאַרברענט אָדער מען בריהט אָפּ די הויט), קלײבט זיך אָן אונטער דער האַרנהױט וואַסער און עס שטײט אָפּ. אױף די ליפּן, אײנס נאָך און אױף די אױנגלעפּלען גײט די האַרנהױט אײבער אין אַ דינער שלײמהײטל. אונטער דער האַרנהױט געפֿינט זיך די לעדערהױט, און אונטער איר אַ

שיכט שמאלין. די ווייכע שמאלצשיכט איז ניט ביי אלע מענשן גלייך, ביי מאַגערע מענשן איז זי גאָר שוואַך אנטוויקלט, ביי דיקע זעהר שטארק. די שמאלץ ווארעמט און שיצט דעם גוף, ווייל זי שוואכט אָפּ די ווירקונג פֿון א דרוק אָדער א קלאפּ אויף די אינערליכע אָרגאנען.

זעהר וויכטיג איז די לעדערהויט, ווייל אין איר געפֿינען זיך די שווייס־גילן און די פֿעטסגילן, די האַרוואַרצלען און די פֿילקישעלעך פֿון די פֿילנערווי. אלע גילן עפֿענען זיך דורך קליינע לעכעלעך, פֿאָרן, וואָס געפֿינען זיך אין האַרנשיכט. דורך די פֿאָרן גייט אויך אריין זויערשטאָף, און ס'גייט ארויס קיילבויערער גאז. אַטאזוי העלפֿט די הויט די לונגען.

זעהר א גרויסן באטייט האָבן די שווייסגילן, ווייל דורך זיי באפֿרייט זיך דער גוף פֿון שעדליכע אַפֿפֿאלשטאָפֿן, פֿון שווייס. די שווייסגילן זיינען לענגליכע טרייבעלעך, פֿונאויבן געדרייט, ווי א קאָרקנציחהער, פֿונאונטן צונויפֿ־געוויקלטע אין א קניילכל. צום קניילכל קומען צו האַראָדערן. די בלוט פֿליסט דורך די האַראָדערן, זיינען זיך אָפּ אין קניילכעלע די שיטערע אָפֿ־פֿאלשטאָפֿן, די שווייס, און טיילן זיך אויס פֿון גוף דורך די רערן און די פֿאָרן. דער מענש שוויצט שמענדיג, אָבער דער שווייס איז ניט קענטיג, ווייל ער ווערט גלייך אויסגעדעמפֿט. בעת מיר באוועגן זיך האסטיג אָדער מיר ארבעטן, באוועגט זיך די בלוט אויך גיכער, די פֿארברענונג קומט פֿאָר לעבעדיגער, עס באקומען זיך מער אַפֿפֿאלשטאָפֿן, דער שווייס באווייזט ניט אויסגעדעמפֿט צו ווערן און ער שפארט ארויס אין גרויסע טראָפֿנט אויף דער הויט.

זומער שוויצן מיר מער, ווי ווינטער. זומער, בעת די לופֿט איז ווארעם, ציהען זיך פֿונאנדער די בלוטאָדערן פֿון דער הויט, און אין זיי פֿליסט אריין מער בלוט, דערביי שוויצן זיך אויס מער אַפֿפֿאלשטאָפֿן. ווינטער, בעת די לופֿט איז קאלט, ציהען זיך צוזאמען די אָדערן פֿון דער הויט, און אין זיי קומט אריין ווייניגער בלוט, דערפֿאר טיילט זיך אויס ווייניגער שווייס.

פֿון די פֿעטסגילן טיילט זיך אויס פֿעטס, וואָס די הויט ווערט מיט איר שמענדיג באשמירט, דערפֿון איז זי ווייך, און אדאנק דעם לאָזט זי ניט דורך קיין וואסער. די פֿעטסגילן ווייזן אויס ווי לענגליכע זעקעלעך. דערהויפֿט זיינען דאָ פֿיל פֿעטסגילן ארום די האַר, זיי עפֿענען זיך טאקע אין דער גריבל, וואָס דער האַר זיצט אין איר מיט זיין וואַרצל. דערפֿאר זיינען די האַר אַפֿטמאָל פֿעט.

יעדער האַר האָט א לענגליכן וואַרצל, וואָס זעהט אויס ווי א ציבעלע. צום וואַרצל קומען צו די בלוטאָדערן, וואָס שפֿיין אים. דער אונטערשטער טייל פֿון דעם האַר איז א לעבעדיגער, ער וואקסט און אנטוויקלט זיך. דער־פֿאר וואקסן די האַר ווידער, בעת מען שערט זיי אָפּ; אויב מען רייסט אָבער

ארויס דעם וואָרצל, קען שוין דער האָר ניט אָפּוואַקסן. די האָר וואַרעמען און שיצן די הויט. דערהויפּט זיינען זיי וויכטיג אויפֿן קאָפּ, ווייל זיי שיצן דעם צארטן מאַרד.

נאָכדעם, זױ מיר האָבן זיך נעהענטער באַקענט מיט דער הויט, פֿאַר- שטייען מיר שוין, פֿאַרוואָס איר באַמייט איז אזוי גרויס פֿאַרן מענשן. אויב אַ מענש פֿאַרלירט אַ דריטל פֿון זײַן הויט (פֿאַרברענט אָדער אָפּגעבריהט), שטאַרבט ער.

ווי פֿאַרהיט מען די הויט?

די שווייס מוז אַרויסגיין פֿון גוף, אָבער פֿון דער שווייס און פֿון דער פֿעטס ווערט די הויט שמוציג. די פֿאַרן ווערן פֿאַרשטאַמט, און דער אָרגאַניזם קען זיך ניט באַפֿרייען פֿון די שעדליכע אָפּפֿאַלשטאַפֿן; אויסער- דעם שאַפֿט זיך פֿון שמוץ אַ גוטע מַתְּיָה פֿאַר אלערליי שעדליכע באַקטעריעס; דערפֿאַר איז אזוי וויכטיג אָפֿט צו וואַשן דעם גאַנצן קערפֿער מיט וואַסער און מיט זײַף. אונזער וועש רירט שטענדיג אָן די הויט, זאַפט אַריין אין זיך די שווייס און די פֿעטס, אין די וועש פֿאַרהאַלטן זיך אויך די גאַזן, וואָס גייען אַרויס פֿון דעם גוף דורך די פֿאַרן פֿון דער הויט, דערפֿאַר מוז מען אָפֿט בייטן די וועש. גוט איז, אויב מען האָט די מעגליכקייט צו טראָגן צווייערליי וועש: ביימאַגיגע און ביינאַכטיגע. ביינאַכט לופֿטערט זיך אויס די וועש, וואָס מען טראָגט ביימאַג, און בייטאַג לופֿטערט זיך אויס די וועש, וואָס מען טראָגט ביידערנאַפֿט.

דערהויפּט איז געזונט צו טראָגן בגדים פֿון ווייכע און לופֿטיגע שטאַפֿן, זיי זאָלן ניט פֿאַרהאַלטן קיין שווייס און קיין גאַזן, זיי זאָלן גיכער קענען אויסגעדעמפֿט ווערן.

מיר זײַסן, אז די אינווייניגסטע וואַרעמקייט פֿון מענשליכן גוף ווענדט זיך פֿון דער אינווייניגסטער הייצונג, און אז די וואַרעמקייט איז אַ שטענדיגע סיי ווינטער, סיי זומער. פֿונדעסטוועגן קען זיך דער גוף שטאַרק אָפּקילן, אויב די לופֿט אַרום אים איז זעהר קאַלט. די תּוֹת האָבן אַ האָריגן צודעק, וואָס שיצט זיי פֿון קעלט. דער מענש שאַפֿט זיך אַליין אַ צודעק. ווינטער מוזן מיר טראָגן אזויגע קליידער, וואָס לאָזן ניט אַרויס די וואַרעמקייט פֿון גוף; לופֿט לאָזט ניט דורך קיין וואַרעמקייט, דערפֿאַר טוט מען אָן בגדים מיט וואַטע, פּומער, און פֿון וואָלענע שטאַפֿן. צווישן די פֿעדים פֿון די וואָלענע שטאַפֿן, אין די וואַטע און אין פּומער איז דאָ פֿיל לופֿט. אָט זי לאָזט דאָס ניט דורך די וואַרעמקייט.

אָפֿטמאָל ווערט דער מענש קראַנק, אויב דער גוף קילט זיך שטאַרק

אָפּ. מען פֿאַרקילט זיך. מען קען אָבער דעם גוף צוגעוויינען צו קעלט, ער זאָל זיך נישט פֿאַרקילן, דאָס הייסט פֿאַרהאַרטעווען דעם גוף. מען דער־ גרייכט דאָס, אויב מען וואַשט זיך מיט קאַלטע וואַסער, אויב מען פֿאַר־ ברענגט אַפֿולע צייט אויף דער פֿרישער לופֿט, אויב מען טראָגט נישט קיין שווערע און קיין צו וואַרעמע קליידער.

די נערוונסיסמעס און די אָרגאַנען פֿון די אויסערליכע חושים.


דער מאַרד און די נערוון.

אַלע אַונערע באַוועגונגען, געפֿילן און געדאַנקען ווענדן זיך אָן דעם מאַרד. מיר ווייסן שוין, אז דער מאַרד באַשטייט פֿון קאָפּמאַרד און רוקב־ מאַרד, זיי זיינען ענג פֿאַרבונדן צווישן זיך. פֿון מאַרד גייען אָפּ נערוון, לאַנגע ווייסע פֿערס, וואָס צעצווייגן זיך אין אַלע אָרגאַנען, דערהויפּט אין די מוסקולן. מיר האָבן צווייערליי נערוון: באַוועגנערון און געפֿילנערון. אַפֿולע באַוועגונגען ווענדן זיך אָן אַונער ווילן. מיר קענען אויספֿירן די אָדער יענע באַוועגונג מיט דער האַנט און קענען זי נישט אויס־ פֿירן. דאָסגלייכן מיט די פֿיס, מיטן מויל און אוי ווייטער. דאָס זיינען באַוואַוסטזיניגע באַוועגונגען; אויסערדעם קומען פֿאַר אין אַונער גוף באַוועגונגען, וואָס ווענדן זיך נישט אן אַונער ווילן: די באַוועגונגען פֿון האַרץ, פֿון די לונגען, פֿון מאָגן און פֿון די געדערס און נאָך אַפֿולע אַנדערע; דאָס זיינען אַומבאַוואַוסטזיניגע באַוועגונגען. ביידערליי באַ־ וועגונגען ווענדן זיך פֿון די באַוועגנערון, וואָס גיבן איבער דעם רייץ אָדער דעם באַפֿעל פֿון מאַרד צו אָטדעס אָרגאַן, וואָס פֿירט אויס די באַוועגונג. אויב דער נערוו הערט אויף איבערצוגעבן דעם באַפֿעל, הערט אויף דער אָיבר זיך צו באַוועגן. דאָס טרעפֿט זיך, אויב דער נערוו אָדער דער מאַרד ווערן קראַנק. די געפֿילנערון האָבן אן אַנדער אַרבעט: זיי גיבן איבער די רייצן פֿון דער אויסערליכער וועלט צום מאַרד; אַדאַנק זיי פֿילן מיר אַ שטויס, אַ דריק און בכלל יעדן ווייטאג. די געפֿילנערון ענדיגן זיך מיט באַזונדערע אַפּאַראַטן, וואָס זיינען ספּעציעל צוגעפּאַסט דערצו, זיי זאָלן קענען אויפֿנעמען פֿאַרשיידענע רייצן; אויב אַפּאַראַטן זיינען די אויגן, די אויערן און אַנדערע. אויב די געפֿילנערון הערן אויף איבערצוגעבן די דרויסנדיגע רייצן, פֿאַר־ מאַכט זיך פֿאַרן מעגשן די דרויסנדיגע וועלט. ער הערט זי אויף צו פֿילן.

דער קאָפּמאַרד (מוח).

דער קאָפּמאַרד באַשטייט פֿון אַ זעהר ווייכן, צאַרטן שטאַף, פֿונאַויבן איז ער גרוי, אינווייניג ווייס. ער באַשטייט פֿון דריי קענטיגע טיילן: דער

גרויסער מארך, וואָס באשטייט פֿון צוויי העלפֿטן, א רעכטער און א לינקער; פֿון דעם קליינעם מארך און דעם לענגליכן מארך, וואָס פֿאראייניגט זיך דורך דער לאַך אין הינטערביין מיט דער רוקנמארך פֿון רוקנזויל.
 און דעם קאָפּמארך גייען אָפּ צוועלף פּאָר נערוון, דאָס זיינען געפֿיל-נערוון און אַבאווענגערון. איין פּאָר גייט צו די אויגן, דאָס זיינען די זעה-



פֿון „פראַם. דאנשטיין, נאטורגעשיכטע דעם טיררייכס“, פֿלג. F. F. Schreiber אין מינֿען און עסלינגען.

נערוון, נאָך א פּאָר גייען צו די אויערן, דאָס זיינען די הערנערוון, א פּאָר צום נאָז, דאָס זיינען שמעקנערוון, א פּאָר צום צונג דאָס זיינען שטעמנערוון, און נאָך אנדערע.

דער גרויסער קאָפּמארך איז אין גרויסע טיפּע קנייטשן, וואָס גייען אין אלע ריכטונגען; דער קליינער מארך איז אויך געקנייטשט, אָבער די קנייטשן גייען אין פאראלעלע שורות. יעדער טייל האָט זיין ארבעט. אזוי למשל, ווענדן זיך אָן דעם לענגליכן מארך די באוועגונגען פֿון הארצן און פֿון די לונגען. אויב דער לענגליכער מארך ווערט געשעריגט, שטארבט דער מענש. אָן דעם גרויסן מארך ווענדן זיך כמעט אלע אונזערע געפֿילן, אונזער גאנצער

באוואוסמיניגער לעבן, אונזער שכל; אויב דער קאָפּמארך ווערט קראַנק, נייט דער מעגש אַראָפּ פֿוניגנען.

דער רוקנמארך.

דער רוקנמארך באשטייט אויך פֿון דערזעלביגער צארטער מאסע, ווי דער קאָפּמארך, די מאסע איז פֿונאויבן ווייס און אינווייניג גרוי; פֿון רוקנ-מארך גייען אָפּ גערוון אין ביידע זייטן, און זיי צעצווייגן זיך איבערן גאנצן גוף. אָן רוקנמארך ווענדן זיך אפֿולע באוועגונגען פֿון אונזערע אינווייניגסטע אָרגאנען. אויסערדעם איז דער רוקנמארך אזוי ווי א פֿארמיטלער צווישן דעם קאָפּמארך און די אָרגאנען, וואָס זיינען מיט אים גומא נישט פֿארבונדן. אזוי נישט איבער דער רוקנמארך אלע באפֿעלן פֿון דעם גרויסן מאַרך צו די פֿיס, און זיי באוועגן זיך לויטן באפֿעל פֿון קאָפּמארך. דאָסגלייכן נישט איבער דער רוקנמארך אלע רייצן פֿון די אָרגאנען צום קאָפּמארך. אויב דער רוקנמארך ווערט קראַנק, רייסט זיך איבער די באציהונג צווישן די אָרגאנען און דעם גרויסן קאָפּמארך. די פֿיס באוועגן זיך נישט, זיי ווערן פֿאראלזירט. ווי מען זאָל דאן נישט רייצן די גלידער, פֿילן מיר דערביי קיין שום זאך נישט.

די אויסערליכע חושים.

דער מעגש דערקענט די וועלט מיט זיינע אויסערליכע חושים. די וויכטיגסטע פֿון זיי זיינען: די ראייה, דער חוש השמיעה, דער חוש הריח, דער חוש הטעם, דער חוש המישוש און דער מוסקולגעפֿיל. יעדער חוש האָט זיין אָרגאן אָדער אפּאראט, וואָס איז פֿארבונדן מיטן מאַרך דורך באַזונדערע גערוון. די גערוון פֿון יעדערן חוש גיבן איבער דעם מאַרך נאָר געוויסע רייצן. דער זעהנער ווערט גערייצט דורך ליכטיקייט, דער הערנער דורך קלאַנגען, דער שמעקנער דורך גאון, דער טעמנער דורך פֿליסיקייטן, דער טאפּנער ווערט גערייצט דורך אָנרירן פֿארשיידענע זאכן, דער מוסקולנער דורך די אנשמערענגונג פֿון די מוסקולן.

די אויגן.

די אויגן, דאָס איז דער אפּאראט פֿון זעהן. זיי געפֿינען זיך אין באַ-זונדערע פֿארטיפֿונגען פֿון שאַרבן, וואו זיי זיינען גוט געשיצט. די פֿאַר-טיפֿונגען (אויגנהיילן) זיינען אויסגעבעט מיט שמאלץ, דערפֿאַר רייבן זיך די אויגן נישט אָן די ביינערנע ווענטלעך, בעת זיי באוועגן זיך. די באוועגונגען

זיינען מעגליך, ווייל די אויגן זיינען פֿארבונדן מיט זעהר עלאסטישע מוסקולן. די אויגן זיינען גוט געשיצט פֿון שווייס, שטויב און צו שטארקע באלויכטונג. אלע שוצמיטלען צוזאמען רופֿט מען אָן אין אלטעגליכן לעבן מיט איין נאָמען „ברעמען“. ברעמען רופֿט מען אָן די האָר, אויפֿן שמערן איבער די אויגן, וואָס לאָזן ניט צו צו די אויגן קיין שווייס; ברעמען הייסן אויך די הויט־דעקלעך, וואָס פֿארמאכן די אויגן, בעת דער מענש רוהט, אָדער בעת די שוין איז צו שטארק און בלענדט די אויגן; ברעמען רופֿט מען אויך די הערעלעך אויף די ברענעס פֿון די דעקלעך, וואָס שיצן די אויגן פֿון שטויב. יעדער פֿון די אָנגערופֿענע שוצמיטלען מוז האָבן זיין באזונדערן נאָמען. לאמיר זיי דערוויילע אנרופֿן אזוי: שמערנברעמען, אויגנברעמען (וויעס) (די האָר אויפֿן שמערן און אויף די דעקלעך) און אויגנדעקלעך (לעפלען). די אויגנדעקלעך זיינען באצויגן פֿונאונטן מיט א שלימינער הייטל, זיי זאָלן ניט רייבן די אויגן.

אין אויבערשטן אויסערליכן ווינקל פֿון יעדער אויג געפֿינט זיך א טרערנגיל, (זי באשטייט פֿון בלעזעלעך, ווי טרויבן) וואָס פֿון איר גיסן זיך ארויס איינציגע טראָפֿנס; געבנדיג זא פֿינטל מיטן אויג, צעווישן מיר ניט ווילנדיג דעם טראָפֿן איבערן גאנצן אויג. אזוי וואשט זיך די אויג שמענדיג אפ, און דער־פֿאר איז זי קלאָר. די טרערן קלייבן זיך צוזאמען אין אינווייניגסטן אונטערשטן ווינקל פֿון אויג און גיסן זיך אריין דורך באזונדערע טרערנקאנאלן אין נאָז. נאָר דאן, בעת די טרערן גיסן זיך אין א גרויסער מאָס, גיסן זיי זיך אריבער איבער די ברעמען (דער מענש וויינט). די אויג נופא, (דער אוינגעפל), איז באדעקט מיט דריי הייטלעך: די אויסערליכע, די ווייסל, איז הארט און ווייס, ווי מילך. פֿונפֿאַרנט אין רעכטן מיטן איז זי אויסגעבויגן און דורכזיכטיג, אָטדער טייל אירער הייסט די האָרנהייטל. זי איז אזוי ווי א רונדער פֿענסטערל אין דער ניט דורכזיכטיגער ווייסל. אונטער דער ווייסל געפֿינט זי די אָדערהייטל (געפֿעהייטל), אין איר צעצווייגן זיך אפֿולע האָראָדערן, זי איז טונקל, כמעט שוואַרץ. דורך דעם פֿענסטערל (דורך די האָרנהייטל) זעהען מיר נאָר א טייל פֿון איר, א רעדעלע, וואָס רופֿט זיך אָן די רענג־בויגנהייטל. איר פֿארב איז ניט ביי אלע מענשן גלייך (שוואַרץ, בריוו, גרוי, בלוי). אינמיטן אנטקעגן פֿענסטערל האָט זי א רונדע לאָך, וואָס זעהט אויס, ווי א שוואַרצער פינטל אין דעם פֿארביגן רעדעלע, זי הייסט שוואַרצ־פינטל אָדער שוואַרצאפֿל.

אונטערן געפֿעהייטל געפֿינט זיך די נעצהייטל. אין איר צעצווייגט זיך דער זעהנערן. די נעצהייטל זעהט זיך ניט דורכן פֿענסטערל. דער זעהנערן גייט פֿון דעם קאָפּמארך און קומט אריין אין אויג פֿונתניטן דורך די ווייסל און דורך דער געפֿעהייטל.

הינטערן רעגנבויעגהייטל, אנטקעגן זעהלאך, ליגט א הארטע דורכ־זיכטיגע לינו (קרישטאָלנלאָז). צווישן דער לינו און דער אויסגעבויעגענער האָרנהייטל געפינט זיך א קלאָרע וואסערדיגע פֿליסיקייט; דער גאנצער עפל הינטערן לינו איז אנגעפֿילט מיט א דורכזיכטיגער גלאָזיגער מאסע, מיט דעם גלאָזקערפער.

דער זעהגערוו ווערט גערייזט דורך ליכטיקייט. די שטראלן גייען דורך די וואסערפֿליסיקייט, דורך די לינו, דורך דעם גלאָזקערפער און דער־גייען צום נערוו אין געצהייטל. דורכגייענדיג דורך אַמדי אלע דורכזיכטיגע קערפער, דערהויפט דורך דער לינו, ברעכן זיך די שטראלן איבער, ד. ה. זיי ביישן זייער ריכטונג, און אויפֿן געצהייטל באקומט זיך דער אָפֿבילד פֿון דעם חפֿץ, וואָס מיר קוקן אויף אים. דאָס רייזט דעם נערוו, דער רייז גיט זיך איבער דעם מאַרק, און מיר זעהען, די לינו שפילט א גרויסע ראָלע ביים זעהן, זי קען זיך אויסבייגן (זיך שטארק וועלכן) און זיך צוזאמענציהען (פלאציגער ווערן). דורך א פלאציגע לינו זעהען זיך גוט ווייטע זאכן, דורך א געוועלכטן — נאָענטע. ביי מענשן מיט א גוטער ראייה פאסט זיך צו אויף אזא אופֿן די לינו הן צו נאָענטע און הן צו ווייטע זאכן.

אויף דער עלטער פֿארלירט די לינו די פעדיקייט זיך צו וועלכן, זי בלייבט שטענדיג פלאציג, דערפֿאר איז א עלטערן מענשן שווער צו זעהן קליינע נאָענטע זאכן, ער טוט אָן ברילן מיט אויסגעבויעגענע גלעזער, וואָס ווירקן ווי א געוועלכטע לינו.



פֿארקערט ביי אנדערע מענשן, פֿארלירט די לינו די פעדיקייט פלאציג צו ווערן. זיי זעהען נאָר נאָענטע זאכן, זיי זיינען קורצזיכטיג. יענע זיינען געווען ווייטזיכטיג. כדי צו זעהן ווייטער, טוען זיי אָן ברילן מיט אריינגעבויעגענע גלעזער, וואָס ווירקן, ווי א פלאציגע לינו.

ס'טרעפט זיך, אז מענשן ווערן געבאָרן קורצזיכטיגע; אנדערע ווערן קורצזיכטיג פֿון לייגענע אָדער פֿון ארבעטן מיט קליינע זאכן ביי א שוואכער באליכטונג, אָדער פֿון דער שלעכטער געוואוינהייט צו האלטן איינגעבויענע דעם קאָפּ צו נאענט צום בוך, צום העפט אָדער צו אנדערע זאכן.

די אויערן.

די אויערן, דאָס איז אן אפאראט אויפֿצונעמען קלאנגען. דער הערנערוו ווערט גערייזט נאָר דורך א קלאנג. דער אויער באשטייט פֿון דער אויערמושל, פֿון דעם געבויעגענעם ביינערנעם אויערקאנאל, וואָס איז פֿארמאכט פֿון דער אינווייניגסטער זייט מיט דער בייגעוודיגער פּויקהייטל. דאָס איז דער אויסערליכער אויער. די הויט פֿון געהערקאנאל לאזט ארויס

פֿון זיך א געלן פֿעטס, מיט אים ווערט אויסגעשמירט די פּויקהייטל. הינטערן פּויקהייטל געפֿינט זיך דער מיטלסטער אויער. פֿון אים גייט א באַזונדערער קאנאל (די טרומייטרער) צום שלינגהייל. דורך דער רער גייט אריין אין פּויקהייל לופט, דערפֿאר איז די פּויקהייטל אנגעצויגן, ווייל די



פֿון „פראַם. האַנשמיי, נאַטורנעשיכטע דעם טיררייכס“, פֿון F. F. Schreiber אין מינכען אין עסלינגען.

לופט דריקט אויף איר פֿונדרייסן און פֿון אינווייניג. דער מיטלשטער אויער טיילט זיך אָפּ מיט צוויי פֿאַרצויגענע פֿענסטערלעך פֿון אינווייניגסטן אויער (דעם לאַבירינט). אין מיטלשטען אויער געפֿינט זיך אוי ווי א בריקעלע צווישן דעם אויסערליכן און אינווייניגסטן אויער. דער בריק באַשטייט פֿון דריי פֿאַראייניגטע ביינדעלעך: דעם האַמערל, דעם אמבוס און דעם רייטרינג. דער האַמערל איז אנגעשפּאַרט אָן פּויקהייטל, און דער רייטרינג איז אַרייַנגעשפּאַרט אין פֿענסטערל פֿון אינווייניגסטן אויער.

אין אינווייניגסטן אויער געפֿינען זיך עטליכע קאנאלן: דריי אויסנע-
בויגענע (ווי בויגנס), און איינער, ווי א שנעקנהייזעלע. אין דעם קאנאל
צעצווייגט זיך דער הערנער, וואָס גייט אריין פֿון דעם גרויסן קאָפּמארך.
דער אינווייניגסטער אויער איז אנגעפֿילט מיט א פֿליסיקייט.
יעדער קלאנג קומט פֿאַר דערפֿון, וואָס די באוועגונגען פֿון פֿאַרשיידענע
זאכן אָדער זייער צוזאמענשטויס רופֿן ארויס א ציטער אָדער א באוועגונג
פֿון דער לופֿט. די באוועגונג פֿאַרשפּרייט זיך אין אלע זייטן. ציטערנדיג
אָדער טרייסלענדיג זיך, גיט די לופֿט א שטויס די פּויקהייטל. דער שטויס
גיט זיך איבער די ביינדעלעך, דער רייטרינג גיט א שטויס די הייטל פֿון
אינווייניגסטן פֿענסטערל, ער דריקט זיך אריין אין לאַבירינט, די פֿליסיקייט
הייבט זיך אָן צו באוועגן, דאָס רייצט דעם גערוו, דער רייץ גיט זיך איבער
דעם גרויסן מאַרך — און מיר הערן א קלאנג.

די אפאראטן פֿון די איבעריגע חושים.

די צונג, דער נאָז און די הויט זיינען אפאראטן אויפֿצונעמען פֿאַר-
שיידענע רייזן.

די צונג איז דער אָרגאַן פֿון חוש הטעם, ער ווערט גערייצט דורך
פֿליסיקייטן. זאכן, וואָס צעגליען גיט אין מויל, האָבן קיין טעם גיט. די
טעמנערון צעצווייגן זיך אין באזונדערע בראָדעווקעס, וואָס זעהען זיך דייט-
ליך פֿונדזיגן אויף דער צונג.

דער שמעקנער צעצווייגט זיך אויף די דינסטע פֿעדימלעך אין אויבערשמן
טויל פֿון די נאָזהייטן. זיי ווערן גערייצט נאָר דורך גאון, בעת דער נאָז
איז פֿייכט און די לופֿט באוועגט זיך.

אין דער הויט געפֿינען זיך אפאראטן אויפֿצונעמען טאפּרייזן. די
טאפּנערון צעצווייגן זיך אין באזונדערע לענגליכע פֿילקישעלעך, וואָס געפֿינען
זיך אין דער לעדערהויט. דורך זיי פֿילן מיר אויך די טעמפּעראַטור פֿון
פֿאַרשיידענע זאכן. וואָס מער אזוינע קישעלעך זיינען פֿאַרהאַנגען אין א
וואָסער גיט איז טייל פֿון אונזער הויט, אלץ פֿילבארער איז דער אָרט. זעהר
פֿילכאַר זיינען די שפיצן פֿון די פינגער און דער שפיץ פֿון דער צונג.

דאָקטער דזשענער און דער שכל פֿון שמעלן פּאָקן.

פּאָקן איז א שרעקליכע קראַנקייט, וואָס טרעפט זיך איצטער זעהר
זעלטן. איר ווייסט דאָך געוויס, אז מען פֿאַרהיט זיך פֿון דער קראַנקייט
דערמיט, וואָס מען לאָזט זיך שמעלן פּאָקן. קליינע קינדער שמעלט מען

פאָקן אויפֿן ערשטן יאָר פֿון זייער לעבן. שפעטער שטעלט מען ווידער פאָקן אומגעפער אלע 6—7 יאָר. אין וואָס דאָס פאָקנשטעלן באשטייט, ווייטט איר, קען זיין, אליין, מען האָט אייך דאָך געוויס עטליכע מאָל שוין גע- שטעלט פאָקן. מען מאכט אויף דעם אויבערשטן טייל פֿון דער האנט א קרייץ און מען לאָזט אריין א טראָפֿן פֿליסיקייט, וואָס רופֿט זיך אן לימפע. די לימפע נעמט מען פֿון א פאָקנוואונד ביי א קאלב. קיה און קעלבער ווערן אויך קראנק אויף פאָקן. די קראנקייט ווערט ארויסגערופֿן דורך מיקראָס- קאָפּישע באשעפֿענישן. אריינלאָזנדיג אונטער דער הויט דורך א קרייץ דעם טראָפֿן פֿליסיקייט פֿון א פאָקנוואונד, לאָזן מיר אריין דעם באציל פֿון דער קראנקייט. צערווייט מאכן מיר דעם מענשן קראנק. די האנט ווערט אָנגעשוואַלן, אָפּטמאָל הייבט זיך אויף די טעמפּעראַטור, דער מענש ווערט קראנק. דאָס געדויערט אָבער ניט לאנג. באלד ווערט דער מענש ווידער געוונט. איצט איז ער אָבער כמעט ווי פֿארויכערט פֿון דער שרעקליכער קראנקייט אויף פֿינף-זעקס יאָר און, קען זיין, אז אויפֿן גאנצן לעבן. איידער מען האָט דעם מיטל געפֿונען, פֿלעגן טויזנטער מענשן אויס- שטארבן פֿון דער שרעקליכער קראנקייט, איצט איז זי שוין א זעלטענע דער- שיינונג ביי אונז.

געפֿונען דעם מיטל האָט אן ענגלישער דאָקטער עדוארד דזשענער, וואָס איז געבאָרן געוואָרן אין 1749 יאָר אין געשטאָרבן אין 1823. ער האָט זיך זעהר שטארק אינטערעסירט מיט דער קראנקייט, וואָס פֿון איר האָבן אין זיין צייט געליטן אזויפֿיל מענשן. ער האָט באמערקט, אז די פֿרויען, וואָס פֿלעגן מעלקן קיה, קראנקע אויף פאָקן, פֿלעגן זיך אננעמען פֿון זיי און אויך קראנק ווערן. זיי פֿלעגן אָבער גרינג אריבערטראָגן די קראנקייט, און נאָך מערקווירדיגער, זיי פֿלעגן זיך שוין ניט אננעמען פֿון קראנקע מענשן. דזשענערן האָט דאָס ארויפֿגעבראכט אויף אזעלכע גע- דאנקען; ווייזט אויס, אז אויב מען האָט שוין איין מאָל די קראנקייט אריבערגעטראָגן, נעמט מען זיך שוין נאָכאמאָל ניט אָן. דער אָרגאניזם געוואוינט זיך אין צו דער שעריכער באקטעריע, און בעת זי פֿאלט אריין א צווייטן מאָל אין אים, קען זי שוין ניט זיין שעדליך. ווייטער האָט דזשענער באמערקט, אז די קיהישע פאָקן זיינען ניט אזוי שטארק געפֿערליך פֿארן לעבן. אין זיין גרויסער פראקטיק האָט ער זיך איבערצייגט, אז אלע קראנקע, וואָס האָבן זיך געהאט אָנגענומען פֿון א קיה, זיינען געוונט געוואָרן. אויב אזוי, האָט ער געטראכט, וואָלט עס לוינען, אז די מענשן זאָלן ווערן קראנק אויף קיהישע פאָקן און דערמיט זיך פֿארהיטן פֿון אמתע. ער האָט געפרובט אנשמעקן מיט קיהישע פאָקן געוונטע מענשן; זיי האָבן לייכט אריבער- געטראָגן די קראנקייט און זיך דערנאָך שוין מער ניט אנגענומען, הגם זיי

האָבן געלעבט צווישן מענשן, וואָס זיינען קראַנק געווען אויף פּאָקן. דזשענער
האַט באשריבן זיינע עקספערימענטן. אינאָנהייב האָבן זיך אפּולע מענשן
באצויגן מיט אומצוטרוי און שרעק צו דזשענערס מיטל. אָבער די גוטע
רעזולטאטן, וואָס דער מיטל האָט געגעבן, האָבן אלעמען איבערגעצייגט,
אז ער איז גערעכט. פֿון ענגלאַנד האָט זיך דאָס פּאָקנשטעלן פֿארשפּרייט
איבער אלע איבעריגע לענדער. איצטער האָט שוין קיינער ניט מורא
פֿארן פּאָקן שטעלן. די מאמעס ברענגען שוין אליין צום דאָקטער זייערע
קליינע קינדער, ער זאָל זיי שטעלן פּאָקן.